

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תבשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על-פי מרשם רופא בלבד

רינבוקTM 15 מ"ג

רינבוקTM 30 מ"ג

רינבוקTM 45 מ"ג

טבליות לשחרור ממושך

המרכיב הפעיל וכמותו:

כל טבילה לשחרור ממושך מכילה אופדסיטיניב (כחמיידרט) 15 מ"ג Upadacitinib (as hemihydrate) 15mg

כל טבילה לשחרור ממושך מכילה אופדסיטיניב (כחמיידרט) 30 מ"ג Upadacitinib (as hemihydrate) 30mg

כל טבילה לשחרור ממושך מכילה אופדסיטיניב (כחמיידרט) 45 מ"ג Upadacitinib (as hemihydrate) 45mg

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספת, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

בנוסף לעalon, לתכשיר רינבוק קיים 'כרטיס' מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעלייך לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול ברינבוק ולפער על פיו. יש לעיין ב'כרטיס' מידע בטיחותי למטופל' ובעalon לצריכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במקרה הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

רינבוק מיועד לטיפול ב:

- דלקת מפרקים שగונית (Rheumatoid Arthritis) ביןונית עד חמורה במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת בטיפול קודם בתרופה אנטירואומטית אחת או יותר מקבוצת DMARDs או שהטיפול היה בלתי נסבל עבורים. ניתן להשתמש ברינבוק לטיפול ייחד או בשילוב עם מתוטרקסאט (methotrexate).
- דלקת מפרקים ספחתית (Psoriatic Arthritis) במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת בטיפול קודם בתרופה אנטירואומטית אחת או יותר מקבוצת DMARDs או שהטיפול היה בלתי נסבל עבורים. ניתן להשתמש ברינבוק לטיפול ייחד או בשילוב עם מתוטרקסאט (methotrexate).
- דלקת חוליות מקשחת (Ankylosing Spondylitis) במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת לטיפול מקובל.
- דלקת עור אтопית (Atopic Dermatitis) ביןונית עד חמורה במבוגרים ובמתבגרים בגילאי 12 ומעלה אשר מועמדים לטיפול סיסטמי.
- קוליטיס כיבית (Ulcerative Colitis) ביןונית עד חמורה במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת, אובדן תגובה או אי סבילות לטיפול קונבנציונלי או ביולוגי קודם.

- מחלת קרוון (Crohn's disease) ביןונית עד חמורה במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת, אובדן תגובה או אי סבילות לטיפול קווננציאוני או ביולוגי קודם.

קבוצה רפואיית: מדכאי מערכת חיסון סלקטיביים, מעכבי גיאנוס קינאזו.

ריבובוק פועל על ידי הפחחת הפעולות של אנזים בגוף הנקרא "גיאנוס קינאזו" אשר מוריד דלקת.

דלקת מפרקים שגרונית

ריבובוק משמש לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית במבוגרים. דלקת מפרקים שגרונית זהה למחלות המפרקים מודלקיים. אם אתה סובל מדלקת מפרקים שגרונית פעילה ביןונית עד חמורה, יתכן ותחילת תקבל תרופות אחרות, אשר אחת מהן תהיה כבל הנראה מתוירקסטט. אם תרופות אלו לא השפיעו באופן מספק, תקבל ריבובוק עם או ללא מתוירקסטט לטיפול בדלקת המפרקים השגרונית שלך.

ריבובוק יכול לעזור בהפחחת כאב, נזקנות ונפיחות במפרקים שלך, להפחית עייפות, ויכול להאט את הנזק לעצם ולסחוט במפרקים שלך. השפעות אלו יכולות להקל על הפעולות היומם-יומית הרגילה שלך ובכך לשפר את איכות חייך.

דלקת מפרקים ספרחנית

ריבובוק משמש לטיפול בדלקת מפרקים ספרחנית במבוגרים. דלקת מפרקים ספרחנית הינה מחלת הגורמת למפרקים מודלקיים ופסוריואזיס. אם אתה סובל מדלקת מפרקים ספרחנית פעילה, יתכן ותחליה תקבל תרופות אחרות. אם תרופות אלו לא השפיעו באופן מספק, תקבל ריבובוק עם או ללא מתוירקסטט לטיפול בדלקת המפרקים הספרחנית שלך.

ריבובוק יכול לעזור בהפחחת כאב, נזקנות ונפיחות במפרקים שלך ומסביבם, כאב ונזקנות בעמוד השדרה, נגעים ספרחניים בעור ועייפות ויכול להאט את הנזק לעצם ולסחוט במפרקים שלך. השפעות אלו יכולות להקל על הפעולות היומם-יומית הרגילה שלך ובכך לשפר את איכות חייך.

דלקת חוליות מקשחת

ריבובוק משמש לטיפול בדלקת חוליות מקשחת במבוגרים. דלקת חוליות מקשחת היא מחלת הגורמת בעיקר לדלקת בעמוד השדרה. אם אתה סובל מדלקת חוליות מקשחת פעילה, יתכן ותחליה תקבל תרופות אחרות. אם תרופות אלו לא השפיעו באופן מספק, תקבל ריבובוק לטיפול בדלקת החוליות המקשחת שלך.

ריבובוק יכול לעזור בהפחחת כאביגב, נזקנות ודלקת בעמוד השדרה. השפעות אלו יכולות להקל על הפעולות היומם-יומית שלך ובכך לשפר את איכות חייך.

דלקת עור אטופית

ריבובוק משמש לטיפול בדלקת עור אטופית ביןונית עד חמורה במבוגרים ובמתבגרים בגילאי 12 ומעלה. ריבובוק ניתן לשימוש עם תרופות למריחה על העור שניתנות לדלקת עור אטופית או טיפול יחיד.

נטילת ריבובוק יכולה לשפר את מצב העור, להפחית גרד והתקחוויות. ריבובוק יכול לסייע בשיפור תסמינים של כאב, חרדה ודיכאון אשר יכולים להופיע בחולמים עם דלקת עור אטופית. ריבובוק יכול גם לטיען בשיפור הפרעות שינה ואיכות החיים הכלולות.

קוליטיס כיבית

קוליטיס כיבית זו מחלת דלקתית של המעי הגס. ריבוק משמש לטיפול במוגרים הסובלים מколоיטיס כיבית אשר היגבו בצורה לא מספקת או טיפול קודם לא היה נסבל עבורים.

ריבוק יכול לעזור בהפחחת סימנים וטסמים של המחלת הכלולים דימום צואתי, כאב בטני, דחיפות ותכיפות הליכה לשירותים. השפעות אלו יכולות לאפשר קיום שגרת חיים תקין והקלת בתישיות.

מחלת קרונה

מחלת קרונה זו מחלת דלקתית העוללה לערב כל חלק במערכת העיכול, אך בדרך כלל משפיעה על מעי. ריבוק משמש לטיפול במוגרים הסובלים ממחלה קרונה אשר היגבו בצורה לא מספקת או טיפול קודם לא היה נסבל עבורים.

ריבוק יכול לעזור בהפחחת סימנים וטסמים של המחלת הכלולים דחיפות ותכיפות הליכה לשירותים, כאב בטני ודלקת של רירית המעי שלך. השפעות אלו יכולות לאפשר קיום שגרת חיים תקין והקלת בתישיות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאופדסיטינייב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6)
- יש לך זיהום חריף (כגון דלקת ריאות או זיהום עור חידקי)
- יש לך שחפת פעילה (TB)
- יש לך בעיות כבד חמורות
- הינך בהריון (ראי סעיף "הריון, הנקה ופריות")

ażorot miyachdot haengutot leshimush batrufah

לפני הטיפול ובמהלך הטיפול ברינובק ספר לרופא אם:

- יש לך זיהום או אם אתה מפתח זיהומים לעתים תכופות. ספר לרופא שלך אם אתה מפתח תסמינים כגון חום, פצעים, הרגשת עייפות גדולה יותר מרגריל או בעיות דנטליות, מאחר שלאלה יכולים להיות סימנים לזיהום. רינובק יכול להפחית את יכולת הגוף להילחם בזיהומים ועלול להחמיר זיהום קיים או להגבר את הסיכון להתקפות זיהום חדש. אם אתה סובל מסוכרת או בן 65 ומעלה, אתה עלול להיות בסיכון מוגבר להתקפות זיהומים.

- סבלת משחפת או שהיה ברגע קרוב עם מישחו חולה שחפת. הרופא שלך יבצע בדיקה לשחפת לפני התחלת הטיפול ברינובק וייתכן שיחזור על הבדיקה בזמן הטיפול
- סבלת מזיהום הרפס זוסטר (שלבket חוגרת), כיון שרינובק יכול לאפשר לזרום לחזור. ספר לרופא שלך אם יש לך פריחה כואבת על העור עם שלפוחיות, כיון שלאלו יכולים להיות סימנים לשלבket חוגרת
- הייתה לך אי פעם דלקת כבד (הפטיטיס) מסוג B או C
- קיבלת לאחרונה או שאתה עתיד לקבל חיסון – זאת כיון שהחיסונים חיים אינם מומלצים בזמן השימוש ברינובק
- יש לך סרטן או סבלת מסרטן בעבר, מעשן או עישנת בעבר, מאחר שהרופא ידוע עימך אם רינובק מתאים עבורך.
- סרטן עור שאינו מלנומה נצפה במטופלים הנוטלים רינובק. הרופא עשוי להמליץ לך על בדיקות עור סדיות במהלך רינובק. אם במהלך הטיפול מתחממים נגעי עור חדשים או אם המראה של נגעים קיימים משתנה, ספר לרופא. יש לך או היי לך בעיות לב, מאחר שהרופא ידוע עימך אם רינובק מתאים עבורך.
- החבד שלך אינו מתפרק כמו שצricht
- היו לך בעבר קרישי דם בוורידי הרגליים (פקקת ורידים עמוקים) או בריאות (תשחיף ריאתי) או שאתה בעל סיכון מוגבר לפתח קרישי דם מסווג זה (לדוגמה: אם עברת ניתוח נרחב לאחרונה, אם אתה משתמש באמצעי מנעה הורМОנוליים/בטיפול הורמונולי חלופי, אם זההה הפרעה בקרישת דם אצלך או אצל בני משפחה קרובים). הרופא ידוע עימך אם רינובק מתאים עבורך.

- ספר לרופא שלך, אם אתה מפתח קוצר נשימה פתאומי או קושי בנשימה, כאב בחזה או כאב בגב העליון, נפיחות ברגל או ביד, כאב ברגל, או רגשות, או אודם או שינוי צבע ברגל או ביד, כיון שלאלו יכולים להיות סימנים לקרישי דם בוורידים
- יש לך בעיות כלilioot
- יש לך כאב בטן בלתי מוסבר, יש או הייתה לך דלקת סעיף (דיברטיקוליטיס, דלקת כואבת של כיסים קטנים בדופן המעי שלך) או כיבים בקיבה או במעי, או הינך נוטל תרופות נגדות דלקת לא סטרואידיות.

- אם אתה חווה אחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות, פנה מיד לרופא שלך :
- תסמנים כגון פריחה (סרפדת), קשיים בנשימה או נפיחות של השפתיים, הלשון או הגרון, יתכן אתה חווה תגובה אלרגית. חלק מהאנשים שנטלו רינבוק חוות תגובות אלרגיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמנים במהלך הטיפול עם רינבוק, הפסיק ליטול רינבוק ונעה לקבלת עזרה רפואיית דחופה באופן מיידי
 - כאבי בטן עזים, במיוחד המלווים בחום, בחילות והקאות

בדיקות ומעקב
צטריך לבצע בדיקות דם לפני התחלת הטיפול ברינבוק או בזמן נטילת התרופה. זאת כדי לבדוק אם קיימת ספירת תא דם אדומיים נמוכה (אנמייה), ספירת תא דם לבנים נמוכה (נוירוטרופניה או לימפופניה), רמת שומנים גבוהה בדם (コレsterol) או רמות גבוהות של אנזימי CBD. הבדיקות הן כדי לוודא שהטיפול ברינבוק אינו גורם לביעות.

קשיים
קיימים שימוש גבוה יותר של זיהומים בקרב חולמים בגילאי 65 ומעלה. ספר לרופא שלך ברגע שאתה מבחין בסימנים או בתסמינים של זיהום.

מטופלים בגילאי 65 ומעלה עלולים להיות בסיכון מוגבר לזיהומים, לביעות לב כולל התקף לב וסוגי סרטן מסוימים. הרופא ידוע עימך אם רינבוק מתאים עבורך.

ילדים וمتתבגרים
רינבוק לא מומלץ לשימוש ילדים מתחת לגיל 12 או במתתבגרים השוקלים פחות מ-30 ק"ג הסובלים מדלקת עור אтопית, מכיוון שהוא לא נבדק בחולמים אלו. רינבוק לא מומלץ לשימוש ילדים ובמתתבגרים מתחת לגיל 18 עם דלקת מפרקים שగונית, דלקת מפרקים ספחיתית, דלקת חוליות מקשחת, קוליטיס כיבית, או מחלת קרוחן זאת מכיוון שהוא לא נבדק בקבוצת גיל זו.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לך תרופה אחרת כול תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. זאת מכיוון שתרופות מסוימות יכולות להפחית את יעילות הטיפול ברינבוק או עלולות להגבר את הסיכון לתופעות לואוי.

- תרופות לטיפול בזכיהומים פטרייתיים (כגון איטראקונזול, פוסאקוונזול או וורייקונזול)
- תרופות לטיפול בזכיהומים חידקיים (כגון קליריטומיצין)
- תרופות לטיפול בתסモンת קוושינג (כגון קטוקונזול)
- תרופות לטיפול בשחפת (כגון ריפאמפייצין)
- תרופות לטיפול בפרכוסים או התקפים (כגון פניטואין)
- תרופות המשפיעות על מערכת החיסון שלך (כגון אזאתיופרין, 6-מרקפטופורין, ציקלוספורין וטאקרולימוס)
- תרופות העולות להעלות את הסיכון להתקנות (פרפרוציה) במערכת העיכול או לדלקת סעיף (דיברטיקוליטיס) כמו תרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות (לרובה משמשות לטיפול בכאב ו/או מצב דלקת של שרירים או המפרקים), ו/או אופיאטים (משמשים לטיפול בכאים עזים), ו/או קורטיקוסטרואידים (לרובה משמשים לטיפול במצב דלקת)
- תרופות לטיפול בסוכרת או אם יש לך סוכרת. הרופא שלך עשוי להחליט אם אתה זקוק לפחות מהתרופה נגד סוכרת בזמן נטילת אופדייטיניב (upadacitinib).

אם אתה לוקח את אחת מהתרופות מהרשימה מעלה או שאין בטוח, ספר לרופא או לרוקח שלך לפני נטילת רינבוק.

הריון, הנקה ופוריות
הריון
אין להשתמש ברינבוק בזמן הריון.

הנקה

אם את מניקה או מתכנת להניק, דברי עם הרופא שלך לפני לكيחת תרופה זו. אין להשתמש ברינבווק בזמן הנקה כיון שלא ידוע אם תרופה זו עוברת לחלב אם. את והרופא שלך תחליטו אם תניקי או תשתמיší בrinboek. אל תעשי את שנייהם.

מניעת הריון

אם את אישה בגיל הפוריות, עליך להשתמש באמצעות מניעה יעילים כדי להימנע מהריון בזמן נטילת רינבווק ולמשך 4 שבועות לפחות לאחר מנת רינבווק האחזרונה שלך. אם הרית בפרק זמן זה, עליך לפנות מיד לרופא שלך.

אם הילדה שלך קיבלה לראשונה את המחזור החודשי בזמן נטילת רינבווק, עליך לעדכו את הרופא.

נהיגה ושימוש במכונות

לринבווק אין השפעה או השפעה מוגבלת על יכולת נהוג ולהשתמש במכונות.

3. כיצד השתמש בתרופה ?

יש להשתמש בתבשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתבשיר.

המיןון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

דלקת מפרקים שגורנית, דלקת מפרקים ספחתית או דלקת חוליות מקשחת

המיןון המקבול בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם אחת ביום.

דלקת עור אטופית

מבערים :

המיןון המקבול בדרך כלל הוא 15 מ"ג או 30 מ"ג פעם אחת ביום, כפי שנרשם על ידי הרופא שלך. הרופא עשוי להחליט אם להעלות או להוריד את המיןון שלך בהתאם לפעולות התרופה בגוף.

קשיישים :

אם אתה בן 65 ומעלה, המיןון המקבול בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם אחת ביום.

מתבגרים (גילאי 12-17) השוקלים לפחות 30 ק"ג:

המיןון המקבול בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם אחת ביום.

קוליטיס כיבית

המיןון המקבול בדרך כלל הוא 45 מ"ג פעם ביום במשך 8 שבועות. הרופא שלך עשוי להחליט להאריך את המיןון ההתחלתי של 45 מ"ג לפחות 8 שבועות נוספים (סה"כ 16 שבועות). לאחר מכן המיןון המקבול בדרך כלל הוא 15 מ"ג או 30 מ"ג פעם ביום טיפול ארוך טווח. הרופא עשוי להחליט להעלות או להוריד את המיןון בהתאם לאופן שאתה מגיב לתרופה.

קשיישים :

אם אתה בן 65 ומעלה, המיןון המקבול בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם ביום טיפול ארוך טווח.

הרופא עשוי להחליט להוריד את המינון אם יש לך בעיות בצלות, או שנרשמו לך תרופות מסוימות אחרות.

מחלת קרונה

המינון המקובל בדרך כלל הוא 45 מ"ג פעמיים ביום במשך 12 שבועות. לאחר מכן המינון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג או 30 מ"ג פעמיים ביום לטיפול ארוך טווח. הרופא עשוי להחליט להוריד את המינון בהתאם לאופן שבו אתה מגיב לתרופה.

קשיישים :

אם אתה בן 65 ומעלה, המינון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעמיים ביום לטיפול ארוך טווח.
הרופא עשוי להחליט להוריד את המינון אם יש לך בעיות בצלות, או שנרשמו לך תרופות מסוימות אחרות.

אין לעבר על המנה המומלצת

צורת הנטילה

- יש לבולע את הטבילה בשלמותה עם מים. אין לחצות, לכתוש, ללעוס או לשבור את הטבילה לפני הבליעה כיונן זהה יכול לשנות את כמות התרופה הנכנת ל גופך
- כדי לעזור לך לזכור ליקחת רינבוק, קח אותו כל יום באותו הזמן
- ניתן לחתך את הטבilioות עם או ללא מזון
- הימנע ממזון או משקה המכילים אשלוליות בזמן שאתה נוטל (או מטופל ב) רינבוק שכן אלו עלולים להגדיל את הסיכון להופעות תופעות לוואי, על ידי הגדלת כמות התרופה בגוףך

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר עליך לפנות לרופא שלך. ייתכן שתהוויה מספר תופעות לוואי המפורטו בסעיף 4.
אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיען של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול התרופה

- אם פספסת מנת אחת, קח אותה מיד כשנזכרת
- אם שכחת את המנה שלך במשך يوم שלם, דלג על המנה שהפסדת ורק רק מנת אחת כרגיל ביום לאחר מכן
- אין לחתך מנת כפולה כדי לפצות על טבילה שנשכחה

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אל תפסיק לחתך רינבוק אלא אם הרופא שלך הורה לך להפסיק לחתך אותו.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זוקק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה זו, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברינבוק עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשות תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מכך אף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות

דבר עם הרופא שלך או פנה מיד לקבלת עזרה רפואיית אם אתה חווה סימנים כלשהם של:

- **זיהום** כגון שלבכת חוגרת או פריחה כאבת על העור עם שלפוחיות (הרפס זוסטר) - תופעות לוואי שכיחות

- **זיהום בריאות (דלקת ריאות)**, אשר יכול לגרום לקוצר נשימה, חום ושיעול עם ליחה - **תופעות לוואי שכיחות (common)** מתחזק 100
- **זיהום בדם (ספסיס)** - **תופעות לוואי שאינו שכיחות (uncommon)** - **תופעות שכיחות (common)** מתחזק 1,000
- **תגובה אלרגית (לחץ בחזה, צפופים, נפיחות של השפטאים, הלשון או הגרון, סרפתה)** - **תופעות לוואי שאינו שכיחות (uncommon)** - **תופעות שכיחות (common)** מתחזק 1,000

תופעות לוואי אחרות
דבר עם הרופא שלו אם הבחנת באחת מתופעות הלוואי הבאות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) - תופעות שכיחות (common)

- **זיהומיים בגרון ובאף**
- **אקנה**

תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שכיחות (common)

- **סרطن עור שאינו מלנומה**
- **شعיל**
- **חום**
- **פצעי קור (הרפס סימפלקס)**
- **בחילה**
- **עליה ברמת אנזים אשר נקרא קראטין קינאז, הנראית בבדיקות דם**
- **ספרית תאדי דם לבנים נמוכה, הנראית בבדיקות דם**
- **עליה ברמות כולסטרול (סוג של שומן בדם) כפי שנראה בבדיקות דם**
- **עליה ברמות אנזימי הכבד, הנראית בבדיקות דם (סימן לביעות כבד)**
- **עליה במשקל**
- **דלקת (נפיחות) של זקיקי השיער**
- **שפעת**
- **אנמיה**
- **כאבים בבטן**
- **עיפויות (תחרושת עיפויות בלתי רגילה וחולשה)**
- **כאב ראש**
- **סרפתה (אורטיקירה)**
- **זיהום בדרכי השתן**
- **פריחה**

תופעות לוואי שאינו שכיחות (uncommon) - תופעות שכיחות (uncommon)

- **פטרת הפה (כתמים לבנים בפה)**
- **עליה ברמות טריגליקרידים (סוג של שומן) בדם כפי שנראה בבדיקות דלקת הסעיף (דיברטיקוליטיס, התפתחות דלקת כואבת בכיסים קטנים שנוצרים בדופן המעי שלו)**
- **ניקוב במערכת העיכול (חור במעי)**

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מטופעות הלואין מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צוינה בעלון, عليك להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקורי לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטוחה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלתם. אל תגרום להקה לא הוראה מפורשת מהרופא אין להשתמש בתרופה אחרית תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה החיצונית והבליסטר.
- תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש עברו רינבוק 15 מ'ג ורינבוק 30 מ'ג יש לאחסן בטמפרטורה עד 30°C
- עברו רינבוק 45 מ'ג אין תנאים מיוחדים. מומלץ לשמר בטמפרטורת החדר.
- יש לאחסן בבליסטר המקורי כדי להגן מלחות אין להשליך תרופות כלשהן דרך הבוב או האשפה הביתית. שאל את הרוקח שלך כיצד להשליך תרופות אשר אין משתמש בהן יותר. אמצעים אלו יעזרו לשמר על הסביבה

6. מידע נוסף

מה מכיל רינבוק

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם :

- רינבוק 15 מ'ג טבליות לשחרור ממושך
- ליבת הטבליה : microcrystalline cellulose, mannitol, hypromellose, tartaric acid (powdered), magnesium stearate, silica colloidal anhydrous/ colloidal silicon dioxide

ציפוי הפילם :

polyvinyl alcohol, macrogol/polyethylene glycol, talc, titanium dioxide (E171), black iron oxide (E172)/ferrosoferric oxide, iron oxide red (E172)

רינבוק 30 מ'ג טבליות לשחרור ממושך

- ליבת הטבליה : microcrystalline cellulose, mannitol, hypromellose, tartaric acid (powdered), magnesium stearate, silica colloidal anhydrous/ colloidal silicon dioxide

ציפוי הפילם :

polyvinyl alcohol, macrogol/ polyethylene glycol, talc, titanium dioxide (E171), iron oxide red (E172).

ריבוק 45 מ"ג טבליות לשחרור ממושך

- **ליבת הטבילה:**

microcrystalline cellulose,mannitol,hypromellose,tartaric acid (powdered),magnesium stearate,silica colloidal anhydrous/colloidal silicon dioxide

- **ציפוי הפלים:**

polyvinyl alcohol,macrogol/polyethylene glycol,titanium dioxide (E171),talc,iron oxide yellow (E172),iron oxide red (E172).

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה

ריבוק 15 מ"ג טבליות לשחרור ממושך

ריבוק 15 מ"ג טבליות לשחרור ממושך הין סגולות, מוארכות, קמורות משני הצדדים, מודפסות על צד אחד עם'a15'.

הטבליות מסופקות בבליסטרים באזיות המכילות 28 או 98 טבליות לשחרור ממושך ובמארז של 84 המכיל 3 קופסאות, כל אחת מכילה 28 טבליות לשחרור ממושך.
כל בליסטר המציג את ימי השבוע מכיל 7 טבליות.

ריבוק 30 מ"ג טבליות לשחרור ממושך

ריבוק 30 מ"ג טבליות לשחרור ממושך הין אדומות, מוארכות, קמורות משני הצדדים, מודפסות על צד אחד עם'a30'.

הטבליות מסופקות בבליסטרים באזיות המכילות 28 או 98 טבליות לשחרור ממושך.
כל בליסטר המציג את ימי השבוע מכיל 7 טבליות.

ריבוק 45 מ"ג טבליות לשחרור ממושך

ריבוק 45 מ"ג טבליות לשחרור ממושך הין צהובות עד צהובות מנוקדות, מוארכות, קמורות משני הצדדים, מודפסות על צד אחד עם'a45'.

הטבליות מסופקות בבליסטרים באזיות המכילות 28 טבליות לשחרור ממושך.
כל בליסטר המציג את ימי השבוע מכיל 7 טבליות.

יתכן ולא כל גודלי האזיות מסווקים.

- **בעל הרישום וכתובתו:** אבויו ביופארמה בע"מ, רח' החרש 4, הוד השרון, ישראל
- **שם הייצור וכתובתו:** אבויו דויטשלנד גי.אמ.בי.אייז' אנד קו. קי.ג.ג, קנוולשטרסה, 67061, לודוויגספון, גרמניה
- נערך בדצמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות
- **מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**
ריבוק 15 מ"ג טבליות לשחרור ממושך 164-29-36194
ריבוק 30 מ"ג טבליות לשחרור ממושך 168-69-37036
ריבוק 45 מ"ג טבליות לשחרור ממושך 172-42-37344

שם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.