

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

أوچمنتين 250 ملغ أقراص

أقراص مطالية.

يحتوي كل قرص على: 250 ملغ أموكسيسيلين (على شكل تريهيدرات)

amoxicillin (as trihydrate)

125 ملغ حمض كلافلانيك (على شكل ملح البوتاسيوم)

clavulanic acid (as potassium salt)

لائحة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر، انظر الفقرة 2 - "معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء" والفقرة 6 - "معلومات إضافية".

إن أنت تقرأ النشرة بمعنى حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل أوچمنتين لدى الكبار والأطفال لعلاج التلوثات التالية:

- تلوثات في الجيوب الأنفية
- تلوث في الأذن الوسطى
- التهاب شديد في الحنجرة
- تلوثات في المسالك البولية
- تلوثات في الجلد وفي الأنسجة الرخوة بما في ذلك التلوثات في الأسنان.

أوچمنتين عبارة عن مضاد حيوي الذي يعمل بواسطة إبادة الجراثيم المسببة للتلوثات. فهو يحتوي على دوائين مختلفين يسميان أموكسيسيلين وحمض كلافلانيك. ينتمي أموكسيسيلين لفصيلة الأدوية المسماة "پينيسيلينات" التي يمكن أن يتوقف عملها أحياناً (تصبح غير فعالة). إن المركب الفعال الآخر (حمض كلافلانيك) يمنع حدوث هذا الأمر.

الفصيلة العلاجية

أموكسيسيلين: مضاد حيوي من فصيلة الپينيسيلينات.

حمض كلافلانيك: مثبطات الإنزيم بيتا - لاكتاماز.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) لـ أموكسيسيلين، لحمض كلافلانيك، لپينيسيلين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6)
 - حدث لديك ذات مرة رد فعل تحسسي خطير لأي مضاد حيوي آخر. ذلك قد يشمل طفح في الجلد أو إنتفاخ الوجه أو الحنجرة
 - حدث لديك ذات مرة مشاكل في الكبد أو برقان (إصفرار الجلد) عند تناولك لمضاد حيوي.
- ← لا تتناول أوچمنتين إذا إنطبق عليك واحد مما ذكر. إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أوچمنتين.

تحذيرات خاصة تتعلق بـاستعمال الدواء

تحذث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أوجمانتين إذا:

- وُجد لديك مرض القبلة
- كنت تناقي علاجاً جراء مشاكل في الكبد أو الكلى
- كنت لا تتبول بشكل سليم.

إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كان ينطبق عليك واحد مما ذكر، تحذث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أوجمانتين.
في حالات معينة، من الجائز أن يفحص الطبيب نوع الجرثومة المسببة للتلوث لديك. وفقاً للنتائج، من الجائز أن يعطى لك أوجمانتين من عيار آخر أو دواء آخر.

حالات يتوجب عليك الإنتباه إليها

قد يؤدي أوجمانتين إلى تفاقم حالات معينة موجودة، أو أن يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة. هذه تشمل ردود فعل تحسسية، إحتلالات (تشنجات) وإلتهاب الأمعاء الغليظة. عليك الإنتباه لأعراض معينة خلال فترة تناولك له أوجمانتين، لتقليل خطورة حدوث أية مشاكل. انظر 'حالات يتوجب عليك الإنتباه إليها' في الفقرة 4.

فحوص الدم والبول

أعلم الطبيب بأنك تتناول أوجمانتين وذلك إذا كنت تجتاز فحوص الدم (مثل فحوص تقييم حالة خلايا الدم الحمراء أو فحوص لوظائف الكبد) أو فحوص بول (لفحص نسب الجلوكوز). وذلك لأن أوجمانتين يمكن أن يؤثر على نتائج فحوص من هذا النوع.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، إذا تناولت مؤخراً أو إذا كان من الجائز أن تتناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية، أدوية نباتية وإضافات غذائية، إحكِ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

• إذا كنت تتناول ألوپورينول (يستخدم لعلاج النقرس) مع أوجمانتين، فهناك إحتمال أكبر بأن تعاني من رد فعل تحسسي جلدي.

• إذا كنت تتناول پروبينيسيد (يستخدم لعلاج النقرس)، فمن الجائز أن يقرر الطبيب ملائمة الجرعة الدوائية من أوجمانتين.

• إذا تم تناول أدوية تثبط تخثر الدم (مثل وارفارين أو أسينوكومارول) مع أوجمانتين، فمن الجائز أن يتطلب الأمر إجراء فحوص دم إضافية.

• يمكن أن يؤثر أوجمانتين على طريقة عمل ميتوتريكسات (دواء يستعمل لعلاج السرطان أو الأمراض الروماتيزمية).

• قد يؤثر أوجمانتين على طريقة عمل ميكوفينولات موفيتيل (دواء يستعمل لمنع رفض الأعضاء المزروعة).

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضع، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل، توجهي إلى الطبيب أو الصيدلي لнациٍ
إستشارة قبل تناول هذا الدواء.

السيافقة وإستعمال الماكنات

يمكن أن يسبب أوجمانتين أعراضًا جانبية حيث أن هذه الأعراض قد تجعلك غير قادر على السيافقة. لا تُنْهَى أو تشغّل الماكنات إلا إذا كنت تشعر بشكل جيد.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي أوجمانتين 250 ملغ أقراص على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول (23 ملغ) صوديوم في القرص ولذا يعتبر خالٍ من الصوديوم.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب دائمًا. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بشأن الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

الكبار والأطفال الذين يزنون 40 كيلو وأكثر

الجرعة الدوائية الاعتيادية هي عادة:

- قرص 1 ثلث مرات في اليوم.

الأطفال الذين يزنون أقل من 40 كيلو

يوصى بعلاج الأطفال بعمر 6 سنوات وما دون ذلك بواسطة معلق أو چمنتين عن طريق الفم. لا يوصى بإستعمال أقراص أو چمنتين.

متعالجون لديهم مشاكل في الكلى والكبد

- إذا وجدت لديك مشاكل في الكلى فمن الجائز أن يتم تغيير الجرعة الدوائية. فمن الجائز أن يختار الطبيب عيار آخر أو دواء آخر.
- إذا وجدت لديك مشاكل في الكبد فمن الجائز أن تحتاج إلى إجراء فحوص دم بتوتر أكبر وذلك لفحص وظائف كبدك. لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

كيفية تناول أو چمنتين

- يجب التناول مع وجبة الطعام.
- يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل مع كأس من الماء.
- لا تتوفر معلومات بخصوص السحق، الشطر والمضغ.
- يجب توزيع الجرعات الدوائية بشكل متساوٍ خلال اليوم، بفواصل زمني قدره 4 ساعات على الأقل. لا تتناول جرعتي دواء خلال ساعة واحدة.
- لا يجوز تناول أو چمنتين لمدة تزيد عن أسبوعين. عليك العودة لمراجعة الطبيب، إذا ما زلت تشعر بسوء.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

إذا تناولت بالخطأ أكثر مما ينبغي من أو چمنتين، فإن العلامات قد تشمل إنزعاج في البطن (غثيان، تقيؤ أو إسهال) أو إختلالات. راجع الطبيب بأسرع ما يمكن. وخذ معك علبة الدواء لتريها للطبيب.

إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول أو چمنتين

- إذا نسيت تناول جرعة دوائية، فتناولها لحظة تذكرك بذلك.
 - لا تتناول الجرعة الدوائية التالية أبكر مما ينبغي، بل انتظر 4 ساعات تقريباً قبل تناول الجرعة الدوائية التالية.
- لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتغويض عن الجرعة الدوائية المناسبة.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول أو چمنتين

حتى ولو شعرت بشكل أفضل، عليك مواصلة تناول أو چمنتين إلى إنتهاء العلاج. كل جرعة دوائية من الجرعات الدوائية هي مهمة من أجلك للمساعدة على محاربة التلوث. إذا بقيت بعض الجراثيم على قيد الحياة، فيمكنها أن تسبب عودة التلوث.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.
ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أوچمنتين قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز إلا تعانى أيًّا منها. الأعراض الجانبية المذكورة لاحقًا من شأنها أن تحدث عند إستعمال هذا الدواء.

حالات يتوجب عليك الانتباه إليها:

ردود فعل تحسسية:

- طفح جلدي
 - التهاب الأوعية الدموية (*vasculitis*) الذي من شأنه أن يبدو كبقع حمراء أو بنفسجية بارزة على الجلد، لكنه قد يؤثر على مناطق أخرى من الجسم
 - سخونة، ألم في المفاصل، إنفراخ الغدد في الرقبة، في الإبط أو في منفج الرجلين
 - إنفراخ، أحياناً في الوجه أو الحنجرة (وزمة وعائية)، الذي يؤدي لصعوبات في التنفس
 - إنهايار
 - آلام في الصدر مرتبطة برد فعل تحسسي من شأنها أن تكون أعراضًا لإحتشاء عضلة القلب الذي يتم تشسيطه جراء الحساسية (متلازمة كونس - *Kounis syndrome*).
 - راجع الطبيب فوراً إذا قاسست من إحدى تلك الأعراض. توقف عن تناول أدوية مسكنة.

التهاب الأمعاء الغليظة

التهاب الأمعاء الغليظة إلى إسهال مائي الذي يترافق عادةً بدم ومخاط، وإلى ألم في البطن وأو سخونة.

(DIES) متلازمة الالتهاب المعوي القولوني (التهاب في الأمعاء) الناجمة عن الأدوية

DIES خاصية لدى أطفال تلقوا أمومكسيسيلين/حمض كلافولانيك. يعتبر ذلك نوع معين لرد فعل تحسسي والذى يتراافق بعرض رئيسى من التقيؤات مراراً وتكراراً (4-1 ساعات بعد إعطاء الدواء). أعراض إضافية يمكن أن تشمل ألم في البطن، ارهاق (ميل للنوم)، إسهال وإنخفاض ضغط الدم.

(acute pancreatitis) الإلتهاب حاد في البنكرياس

إذا وجدت لديك ألم شديدة ومستمرة في منطقة البطن فإن ذلك قد يكون علامة لإلتهاب حاد في البنكرياس.
رجاء الطبيب بأسرع ما يمكن لتقديم إرشادات وذلك إذا كنت تقassi من تلك الأعراض.

أعراض جانبية وفق شيوعها:

أعراض جانبية شائعة جداً

قد تظهر هذه لدى أكثر من 1 من كل 10 أشخاص:

- إسهال (لدى الكبار).

أعراض جانبية شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص:

٠٠٠ فطر (المبيضات - تلوث فطري في المهبل، الفم أو ثنياً الجلد)

- ٠ غثيان، خاصة عند تناول جرعة دوائية مرتفعة

← إذا ظهر غثيان، تناول أو حمّنتين مع وجبة الـ

- ١٢٦

١٢٦

- إسهال (لدى الأطفال).

أعراض جانبية غير شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 100 شخص:

- طفح جلدي، حكة
- طفح بارز وحاك (شري)
- مشاكل هضمية
- دوار
- صداع.

أعراض جانبية غير شائعة التي قد تظهر في فحوص دمك:

- إرتفاع في إنزيمات الكبد.

أعراض جانبية نادرة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 1,000 شخص:

- طفح جلدي، الذي من شأنه أن يشمل حويصلات (التي تبدو مثل بقع داكنة في المركز محاطة بمنطقة شاحبة، مع حلقة داكنة حول الأطراف - حمامي متعددة الأشكال *erythema multiforme*).
→ إذا لاحظت إحدى تلك الأعراض راجع الطبيب عاجلاً.

أعراض جانبية نادرة التي قد تظهر في فحوص دمك:

- فلة عدد الخلايا التي تشارك في تخثر الدم
- فلة عدد خلايا الدم البيضاء.

أعراض جانبية شيوخها غير معروفة (لا يمكن معرفة الشيوع من المعطيات المتوفرة)

- ردود فعل تحسسية (أنظر أعلاه)
- التهاب الأمعاء الغليظة (أنظر أعلاه)
- متلازمة الإلتهاب المعاوي القولوني (التهاب في الأمعاء) الناجمة عن الأدوية (DIES) (أنظر أعلاه)
- التهاب حاد في البنكرياس (*acute pancreatitis*) (أنظر أعلاه)
- التهاب الغشاء المحيط بالدماغ والجبل الشوكي (التهاب السحايا العقیم)
- ردود فعل جلدية خطيرة:
 - طفح منتشر مع حويصلات وتقرش للجلد، خاصة حول الفم، الأنف، العينين والأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنس - جونسون)، وعرض أكثر خطورة، الذي يؤدي إلى تقرش واسع للجلد (أكثر من 30% من مساحة سطح الجسم - إخلال البشرة الناشر السمي)
 - طفح جلدي أحمر منتشر يترافق بحويصلات صغيرة تحتوي على قيح (*bullous exfoliative dermatitis*)
 - طفح أحمر حرشفي يترافق ببنتوءات تحت الجلد وحويصلات (*exanthematous pustulosis*)
 - أعراض شبيهة بالإنفلونزا تترافق بطفح، سخونة، إنفاس في الغدد ونتائج شاذة في فحوص الدم (يشمل إرتفاع في كمية خلايا الدم البيضاء [كثرة الحمضات] وإنزيمات الكبد) (رد فعل للدواء الذي يشمل كثرة الحمضات وأعراض جهازية [*DRESS*])
 - طفح يتمثل بحويصلات تتوضع حول قشرة للجرح المنتمل في المركز أو شبه عقد اللؤلؤ (مرض IgA الخطى).

→ راجع الطبيب فوراً إذا قاسيت من إحدى تلك الأعراض.

- التهاب الكبد (*hepatitis*)
- يرقان، الذي ينجم عن إرتفاع في البيليروبين في الدم (مادة تُنتج في الكبد) الذي قد يؤدي إلى إصفرار الجلد وإصفرار بياض العين

- التهاب أنابيب الكلية
- إطالة زمن تخثر الدم
- فرط نشاط (hyperactivity)
- إختلالات (لدى أشخاص يتناولون جرعات دوائية مرتفعة من أوچمنتين أو لديهم مشاكل في الكلية)
- لسان أسود يبدو مليء بالشعر.

أعراض جانبية التي قد تظهر في فحوص دمك أو بولك:

- إنخفاض شديد في عدد خلايا الدم البيضاء
- إنخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (قفر الدم الإنhalali)
- بلورات في البول التي تؤدي إلى تضرر الكلى بشكل خطير.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبية

بالإمكان التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفیح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال وأو الرضع، وذلك لنقاذي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.
- يجب إستعمال الأقراص المزودة بعلاف الألومنيوم خلال 30 يوماً من فتح الغلاف.
- خزن في العلبة الأصلية للحماية من الرطوبة.
- لا يجوز إستعمال الأقراص إذا كانت متشقة أو معطوبة.
- لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في القمامنة المنزلية. إستشر الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية ليست قيد الإستعمال. تساعد هذه الخطوات في الحفاظ على البيئة.

(6) معلومات إضافية

- على ماذا يحتوي أوچمنتين:
يحتوي الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً على -
نواة القرص -

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate (Type A), magnesium stearate and colloidal anhydrous silica.

- الطلاء -

Hypromellose (5 cps, 15 cps), titanium dioxide (E171), macrogol (4000, 6000) and dimeticone.

- **كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:**
أوچمنتین 250 ملغ أقراص مطلية لونها ما بين الأبيض والأوف وايت، بيضاء اللون، مطبوع عليها "AUGMENTIN" على جانب واحد.
هي معبأة ضمن علب على شكل لوبيات (بليستر) داخل أغفلة من الألومنيوم، ضمن علبة كرتون. يحتوي الغلاف على كيس ماص للرطوبة. يجب حفظ الكيس الماخص للرطوبة داخل الغلاف ولا يجوز أكله. تحتوي كل علبة كرتون على 10 أو 20 قرصاً.
من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.
- **صاحب الإمتياز:** چلاکسوسمیٹکلائين (إسرائيل) م.ض، شارع بازل 25، بيتتح تكفا.
- **المنتج:** چلاکسوسمیٹکلائين تريدينج سيرفيسيس ليميتد، دبلن، إيرلندا.
- تم إعدادها في آب 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 026-26-25047
- من أجل سهولة وتهجين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.
- العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK.
- © 2023 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

Aug Tab 250 PT v9A