

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (騰クシリット) התשמ"ג – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

סינגוליר 4 מ"ג

טבליות לעיסוה לילדים הגן

כל טבליה לעיסוה מכילה:

Montelukast (as sodium) 4 mg
モンテלוקסט (כסודיום) 4 מ"ג

סינגוליר 4 מ"ג

גרנולות לקטנטנים

כל שקיק של גרנולות מכיל:

Montelukast (as sodium) 4 mg
モンテלوكסט (כסודיום) 4 מ"ג

סינגוליר 10 מ"ג

טבליות

כל טבליה מכילה:

Montelukast (as sodium) 10 mg
モンテלוקסט (כסודיום) 10 מ"ג

סינגוליר 5 מ"ג

טבליות לעיסוה

כל טבליה לעיסוה מכילה:

Montelukast (as sodium) 5 mg
モンテルوكスト (כסודיום) 5 מ"ג

לרשימה של חומרים בלתי פעילים, ראה סעיף 6.

קרא בעין עלון זה עד סופו בטרם תשתחש בתרופה.

- עלון זה מכיל מידע תמציתי על סינגוליר. אם יש לך שאלות נוספות, שאל את הרופא או הרווחך שלך.
- תרופה זו נרשמה לטיפול עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה כי מצבם הרופאי דומה לשלה.

מהו המידע החשוב ביותר שעלי' לדעת בנוגע לסינגוליר?

- **בעיות נפשיות חמורות** קרו אצל אנשים שנותלים סינגוליר או אפילו לאחר הפסקת הטיפול. הדבר יכול לקרות אצל אנשים עם או ללא היסטוריה של בעיות נפשיות. הפסיק ליטול סינגוליר וספר מיד לרופא שלך אם יש לך או לילדך שינויים חריגים בהתנהגות או בחשיבה, כולל כל אחד מהתסמינים הבאים:
אי שקט (אגיטציה), כולל התנהגות אגרסיבית או עינוי, הפרעות קשב, חלומות רעים או מוחשיים, דיכאון, חוסר התמצאות (בלבול), תחושת חרדה, רגונות, היזות (ראיה או שמיעה של דברים שלא קיימים), ליקוי בזיכרון, תסמיינים טורדיים-כפיפיים, חוסר מנוחה, הליכה מתור שינה, גmagom, מחשבות ופעולות אובדניות (כולל התאבדות), רעד, נדודי שינה, תנעויות שרירים בלתי נשכחות.

1. מהו סינגוליר ולמה הוא משמש?

סינגוליר מותווה למינעה ולטיפול כרוני באסתמה, לרבות מניעה של תסמייני המחלת ביום ובלילה, לטיפול בחולי אסתמה הרגשים לאספירין ולמניעת היצרות דרכי הנשימה עקב מאיץ גופני בחולמים מבוגרים וילדים בגילאי 12 חודשים ומעלה. סינגוליר מותווה להקלת הקלה בתסמיינים של נזלת אלרגית עונתית במוגרים ובילדים מעל גיל שנתיים.

קובוצה טיפולית: סינגוליר הינו אנטוגוניסט סלקטיבי של הרצפטור לליוקוטריינים.

סינגוליר פועל על ידי חסימת קולטנים בדרכי הנשימה לחומרם בשם ליאוקוטריינים, הגורמים להיצרות דרכי הנשימה ולනפיחות בדרכי הנשימה. ליאוקוטריינים גורמים גם לתסמיינים אלרגיים.

מהי אסתמה?

אסתמה הינה מחלת ריאות כרונית. לא ניתן לרפא אותה – רק לשלוט בה.
מאפיינים של אסתמה כוללים:

- היצרות של דרכי הנשימה המקשה על הנשימה. היצרות זו מחמירה ומשתפרת בתגובה למספר מצבים.
- דרכי נשימה מודלקות; קלומר, דופן דרכי הנשימה מתנפחת.
- דרכי נשימה רגישות המגיבות לדברים רבים, כגון עשן סיגריות, פולן או אויר קר.

תסמיינים של אסתמה כוללים:

שיעול, צפצופים ולחץ בחזה. לא לכל האנשים עם אסתמה יש צפצופים. לחלקם, שיעול עשוי להיות התסמין היחיד של האסתמה. התסמיינים מתרחשים לרוב במהלך הלילה או לאחר פעילות גופנית.

מהי אסתמה הנגרמת כתוצאה מפעולות גופניות?

אסתמה הנגרמת על ידי פעילות גופנית, המכונה בדיקן רב יותר התקכווצות של הסימפונות (ברונכוקונסטריקציה) הנגרמת על ידי מאיץ (EIB) מתרחשת כאשר פעילות גופנית מעוררת תסמיינים של אסתמה.

מהי נזלת אלרגית עונתית?

- נזלת אלרגית עונתית (המכונה גם קדחת השחת) מופעלת על ידי אלרגנים חיצוניים כגון אבקנים הנישאים באוויר שמקורם בעצים, מדשאות ושבבים.
- התסמיינים היומיים והלילהים של נזלת אלרגית עונתית לרוב יכללו:

- אף סתומים, נזול, מגרד
- התעטשות
- עיניים דומות, נפוחות, אדומות, מגרדות

2. לפני Nutzung סינגוליר

2.1 אל טיפול סינגוליר אם:

אתה רגיש (אלרגי) למונטולוקסט או לכל אחד מהמרכיבים האחרים של סינגוליר (לרשיימת המרכיבים הבלתי פיעלים, ראה סעיף 6.1).

2.2 אזהרות מיוחדות בוגר לשימוש בסינגוליר לפני התחלת השימוש בסינגוליר ספר לרופא:

- אם אתה אלרגי לאספירין.
- אם יש לך או היה לך בעבר בעיות נפשיות.

ازהרות נוספות:

- אם תסמיini האסתמה שלך או של יליך מחייבים, עליך ליצור קשר עם הרופא שלך באופן מיידי.
- התcsiיר אינו מיועד לטיפול בהתקפים חדים של אסתמה; במקרים אלו, יש לעקוב אחר ההוראות שניתן לך הרופא שלך למצבים אלו. דאג לתמיד לשאtet עמך את משאיי התרופות שהרופא הורה לך לטול בעת התקף חד.

2.3 אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות

אם הינך נוטל או נתלת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי תזונה, עליך להודיע על כן לרופא או לרוקח.

תרופות מסוימות עשויות להשפיע על הפעולה של סינגוליר, או שסינגוליר עשוי להשפיע על אופן פעולתן של התרופות האחרות שלך.

אם יש לך אסתמה ואספירין מחמיר את תסמיini האסתמה שלך, המשך להימנע מנטילת אספירין או תרופות אחרות הנΚראות נוגדי-דלקת לא סטרואידים (NSAIDs) בזמן Nutzung סינגוליר.

עליך לידע את הרופא שלך במיוחד אם אתה נוטל: תכשירים נגד אסתמה כגון מרחיבי סימפונות וסטרואידים הנחוצים בשאיפה או דרך הפה.

2.4 Nutzung סינגוליר עם מדוז ושתיה

ניתן לטול סינגוליר עם או בלי אוכל.

2.5 הריאן והנקה

לפני Nutzung סינגוליר, ספרי לרופא שלך אם:

- הינך בהריון או מתכוננת להיכנס בהריון. דברי עם הרופא שלך אם הינך בהריון או מתכוננת להיכנס בהריון, מכיוון שסינגוליר עשוי לא להתאים לך.
- הינך מניקה או מתכוננת להניקה. לא ידוע האם סינגוליר עבר לחלב האם שלך. דברי עם הרופא שלך בנוגע לדרכו הטובה ביותר להאכיל את התינוק שלך בזמן Nutzung סינגוליר.

2.6 שימוש בילדים

הבטיחות והיעילות טיפול בילדים עם אסתמה מתחת לגיל 12 חודשים, לא בסוסה.

2.7 מידע חשוב בחלוקת המרכיבים של סינגוליר

סינגוליר 10 מ"ג טבליות מצופות מכלות לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שלך שיש לך אי-סבלות לסוכרים מסוימים, צור קשר עם הרופא שלך לפני Nutzung תרופה זו (ראה סעיף 6).

לפני Nutzung סינגוליר 4 מ"ג טבליות לעלייה וסינגוליר 5 מ"ג טבליות לעלייה, ספר לרופא שלך אם יש לך פנילקטונוריה. סינגוליר טבליות לעלייה מכלות אספרטים, אשר הינו מקור לפנילאלין (ראה סעיף 6). הוא עלול להזיק לילדים עם פנילקטונוריה. אם יליך יש פנילקטונוריה (הפרעה גנטית תורשתית נדירה של חילוף החומרים) עליך לקחת בחשבון כי כל טבליה לעלייה של סינגוליר 4 מ"ג וכל טבליה לעלייה של סינגוליר 5 מ"ג מכילה פנילאלין (שווה ערך ל- 0.674 מ"ג ו- 0.842 מ"ג פנילאלין בכל טבליה לעלייה בהתאם בהתאם).

3. איך משתמש בסינגוליר?

תמיד יש לטול סינגוליר בדיק כפי שאמר לך הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בוגר למינן ואופן הטיפול.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל הוא:

מבוגרים ומתבגרים מעל גיל 15 שנים לטיפול באסתמה /או בנזלת אלרגית עונתית: טבליה אחת של 10 מ"ג פעם ביום.
ילדים מגיל 6 עד 14 שנים לטיפול באסתמה /או בנזלת אלרגית עונתית: טבליה לעלייה אחת של 5 מ"ג פעם ביום.

ילדים מגיל 2 עד 5 שנים לטיפול באסתטמה /או בנזלת אלרגית עונתית: טבילה לעיסוה אחת של 4 מ"ג פעמיים ביום או שקייק אחד של 4 מ"ג גרנולות למtanן דרך הפה פעמיים ביום. ילדים בגילאי 12 חודשים עד שנתיים לטיפול באסתטמה: שקייק אחד של 4 מ"ג גרנולות למtanן דרך הפה פעמיים ביום. אין לעבור על המנה המומלצת.

יש ליטול סינגולרי פעמיים ביום עם או בלי אוכל, לפי הוראות הרופא. לטיפול באסתטמה, יש לקחת סינגולרי פעמיים ביום, בעבר. לטיפול בנזלת אלרגית עונתית, יש לקחת סינגולרי פעמיים ביום לפי הוראות הרופא. DAG תמיד כי התרופות שלך בשאיפה להתקף אסתטמה אקטוא תהיינה בהישג יד. אין לקחת מנה נוספת של סינגולרי בתוך פחותות מ-24 שעות מהמנה הקודמת. סינגולרי טבליות לעיסוה אין מיועדות לילדים מתחת לגיל שנתיים.

אופן השימוש:

סינגולרי 10 מ"ג טבליות

אין ללעוס! יש לבלווע את הטבילה עם מעט מים, ללא קשר לארכות.

סינגולרי 4 מ"ג ו- 5 מ"ג טבליות לעיסוה

יש ללעוס את הטבילה לפנוי בעלייה, ללא קשר לארכות.

סינגולרי 4 מ"ג גרנולות לקטנטנים

אין לפתח את השקייק עד לזמן השימוש.

ניתן לתה סינגולרי 4 מ"ג גרנולות לקטנטנים:

- ישירות להפה;

• מומס בכפיית אחת (5 מ"ל) של פורמוללה לתינוקות קרה או בטמפרטורת החדר או בחלב אם;

• מעורבב עם כף מזון רך קר או בטמפרטורת החדר (לדוגמה: רסק תפוחים, אורז או גלידה).

ערverb את כל תכולת סינגולרי 4 מ"ג גרנולות לקטנטנים לתוך כף המזון הרך הקר או בטמפרטורת החדר, או כפיית אחת של פורמוללה לתינוקות קרה או בטמפרטורת החדר או בחלב אם, תוך שימוש לב שכל המנה מעורבבת במזון, בפורמוללה לתינוקות, או בחלב האם.

יש לוודא שהילד קיבל את הCPF המכילה סינגולרי 4 מ"ג גרנולות לקטנטנים מעורבבת במזון, בפורמוללה לתינוקות, או בחלב האם במלואה מיידית (בתוך 15 דקות).

חשוב: אין לשמר סינגולרי 4 מ"ג גרנולות לקטנטנים המעורבבות במזון, בפורמוללה לתינוקות, או בחלב האם לשימוש במועד מאוחר יותר.

סינגולרי 4 מ"ג גרנולות לקטנטנים אין מיועדות לבני צעירים, מלבד פורמוללה לתינוקות או חלב אם. אולם, ילדי יכול לשחות נזלים לאחר בליעת סינגולרי 4 מ"ג גרנולות לקטנטנים.

אם נטלה יתר סינגולרי מכפי שהיא הייתה צריכה

אם נטלה מנת יתר או אם בטעות בעל יلد מן התרופה, פנה מיד לחדר רפואי מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. אין לגרום להקה לא הוראה ממופרשת מרופא!

אם שכחת ליטול סינגולרי

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן שנקבע, אין ליטול את המנה שנשכחה מיד כשנזכרת. יש להמשיך בלוח זמני הנטילה הרגיל כפי שהורה לרופא המתפל. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.

עלך להשלים את הטיפול במלואו כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך או במצב בריאותו של יולדך, או אם אתה או יולדך חוותם התקף אסתטמה, אין להפסיק את הטיפול בתרופה או לשנות את מועד נתילתה ללא התיעצשות עם הרופא. יש להמנע, במידת האפשר, מגע עם גורמים העולמים לגרום להתקף אסתטמה, כגון עישון, קרדית האבק, עובש, אבקנים, בעלי חיים, שינויי במצג האוויר, חסיפה לאוויר קר. אם יש לך אסתטמה ואספירין מחמיר את תסמיini האסתטמה שלך, המשך להימנע מנטילת אספירין או תרופות אחרות הנקראות נוגדי דלקת לא סטרואידים (NSAIDs) בעת נטילת סינגולרי.

אין ליטול תרופות בחוושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות כלשהן בנוגע לשימוש בתרופה, שאל את הרופא שלך או הרוקח.

4. תופעות לוואי אפשריות

כמו כל התרופות, סינגולרי עשוי לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי, יתכן ולא תסבול מכך יותר מההן.

סינגולרי עשוי לגרום לתופעות לוואי חמורות, כולל:

- בעיות נשיות חמורות (ראה "מהו המידע החשוב ביותר שעלי' לדעת בנוגע לסינגולרי?" בתחילת עליון זה).

- עליה בתאי דם לבנים מסויימים (אוזינופילים) ותיתכן דלקת של כל הגוף (אוסטוקוליטיס רב מערכת).
- דבר זה יכול לקרות באנשים עם אסתמה שנוטלים סינגוליר. הדבר קורה לעיתים באנשים שנוטלים גם תרופה סטרואידית דרך הפה שמוספקת או שהמנה שלה מופחתת.
- **התיעץ עם הרופא ש郎 מיד אם אתה מפתח אחד או יותר מהתסמינים הבאים:**
תחושה של מחטים וסיכות או חוסר תחושה בזרועות או ברגליים, מחלת דמיית שפעת, פריחה, דלקת חריפה (כאב ונפיחות) בסינוסים (סינוסיטיס).

תופעות הלואין השכיחות ביותר של סינגוליר כוללות:

- דיזום בדרכי הנשימה העליונות
- חום
- כאב ראש
- כאב גרון
- שיעול
- כאב בטן
- שלשול
- כאבים או דיזום באוזניים
- שפעת
- נזלת
- דיזום בסינו

בנוסף, דוחו גם תופעות הלואין הבאות:

- תגבות אלרגיות [כולל התנפחות של הפנים, השפטים, הלשון, /או הגרון (אשר עשויים לגרום לקשי בנשימה או בבליעה), סרפדת, פריחה, גרד].
- סחרחות, נמנום, ישנוויות, פרכוים.
- שניים בראשיה, התנפחות או אודם בתוך העין או מסביבתה.
- דפיקות לב (קצב לב לא סדר)
- דימום מהאף; גודש באף, נפיחות (דלקת) של הריאות
- צרבת, שלשול, כאב בטן, קשי עיכול, בחילה, הקאה, כאבי שיניים
- תסמים של בעיות בכבד הכלולים בחילה, הקאה, עייפות, צחבה של העור והעיניים), שתן כהה, תסמים דמיי שפעת, אובדן תיאבן, וכאב בטן.
- דוחו תגבות עוריות חמורות (תסמות סטיבנס-ג'ונסון/نمך אפידרמלי רעלני / אריתמה מולטיפורמה), התסמים כוללים שלפוחיות, פריחה, עור קששי ומגרד; גושים אדומים רכים מתחת לעור, לרובה על השוקיים (אריתמה נודוזום), חבורות.
- הפרעות שרירים ושלד ורकמת חיבור: כאבי מפרקים, כאבי שרירים והתקচיות שרירים חולשה/עייפות, נפיחות.
- נתיה מוגברת לדימומיים, ספירת נמכה של טסיות דם, עלייה באנזימי כבד, מספר מוגבר של תא דם לבנים בשתן (פיוריה).
- הרבתת לילה דוחה ילדים.

אם הופעה תופעת לואין, אם אחת מתופעות הלואין מחייבת או אם אתה מבחין בכל תופעת לואין שלא צינה בעлон, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לואין למשרד הבריאות באמצעות קישור "דיווח על תופעות לואין עקב טיפול רפואי" שמנצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדיווח על תופעות לואין, או ע"י כניסה ל קישורו: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. כיצד לאחסן סינגוליר?

מנع הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אין להשתמש בסינגוליר לאחר תאריך התפוגה (exp. date) אשר מצוי על הארזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש המצוי.

תנאי אחסנה:
סינגוליר 4 מ"ג גראולות לקטנטנים: יש לאחסן באזירה המקורית כדי להגן מפני אור ולחות. אין לאחסן מעל 25°C. לאחר הפתיחה יש להשתמש תוך 15 דקות.
סינגוליר 4 מ"ג טבליות ללעיסה: יש לאחסן באזירה המקורית על מנת להגן מפני אור ולחות. יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
סינגוליר 5 מ"ג טבליות ללעיסה: יש לאחסן באזירה המקורית על מנת להגן מפני מאור ולחות. יש לאחסן מתחת ל- 30°C.
סינגוליר 10 מ"ג טבליות: יש לאחסן באזירה המקורית על מנת להגן מפני מאור ולחות. יש לאחסן מתחת ל- 30°C.

6. מידע נוסף 6.1 מה סינגוליר מכיל?

החומר הפעיל הוא מונטולוקסט (cosaDiom).

המרכיבים האחרים הם:

כל טבליה מצופה של 10 מ"ג מכילה את החומרים הבלתי פעילים הבאים:

Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, hydroxypropyl cellulose, and magnesium stearate.

הציפוי מורכב מ:

Hydroxypropyl methylcellulose, hydroxypropyl cellulose, titanium dioxide, yellow ferric oxide, carnauba wax and red ferric oxide.

כל טבליה לליישה של 4 מ"ג ו- 5 מ"ג מכילה את החומרים הבלתי פעילים הבאים:

Mannitol, microcrystalline cellulose, hydroxypropyl cellulose, croscarmellose sodium, artificial cherry flavor, magnesium stearate, aspartame, and red ferric oxide.

כל שקיק של 4 מ"ג גרנולות למטען דרך הפה מכיל את החומרים הבלתי פעילים הבאים:

Mannitol, hydroxypropyl cellulose, and magnesium stearate.

שים לב כי הטבליות המצויפות של 10 מ"ג מכילות לקטוז. כל טבליה של סינגוליר 10 מ"ג מכילה 3.89 מ"ג של לקטוז מונוהידרט.

שים לב כי הטבליות לליישה של 4 מ"ג ו- 5 מ"ג מכילות אספרטום, אשר הינו מקור לפנילאלanine.

כל טבליה לליישה של 4 מ"ג מכילה 0.674 מ"ג פנילאלanine וכל טבליה לליישה של 5 מ"ג מכילה 0.842 מ"ג פנילאלanine.

6.2 כיצד נראה סינגוליר ותכולת הארץזה

סינגוליר 4 מ"ג גרנולות לקטנטנים הין גרנולות מוצקות הומוגניות הזרמות בחופשיות, לבנות, מחוספסות, ללא נוכחות חלקיקים חייצניים.

סינגוליר 4 מ"ג טבליות לליישה ליד' הגן הין טבליות ורודות, אובליאות, קמרות משנה צדיהן, עם סינגוליר מוטבע בצדן האחוד ו- MSD 711 בצדן השני.

סינגוליר 5 מ"ג טבליות לליישה הין טבליות ורודות, עגולות, קמרות משנה צדיהן עם סינגוליר מוטבע בצדן האחוד ו- MSD 275 בצדן השני.

סינגוליר 10 מ"ג טבליות הין טבליות מצופות בצביע בעז', בצורת ריבוע מעוגל, עם סינגוליר מוטבע בצדן האחוד ו- MSD 117 בצדן השני.

גודלי הארץזה:

סינגוליר 4 מ"ג גרנולות לקטנטנים: 7, 10, 28, 30 שקיקים בארץיה.

סינגוליר 4 מ"ג טבליות לליישה ליד' הגן: 7, 10, 28, 30 טבליות לליישה בארץיה.

סינגוליר 5 מ"ג טבליות לליישה: 7, 10, 28, 30 טבליות לליישה בארץיה.

סינגוליר 10 מ"ג טבליות: 7, 10, 28, 30 טבליות בארץיה.

יתכן ולא כל גודלי הארץזה משווים.

בעל הרישום וכתובתו:

אורגןון פארמה ישראל בע"מ, עתיר ידע 1, כפר סבא

ឯ្យן: אורגןון LLC, ניו ג'רזי ארה"ב

נערכ באוגוסט 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

130.14.30912

סינגוליר 4 מ"ג גרנולות לקטנטנים:

121.67.30155

סינגוליר 4 מ"ג טבליות לליישה ליד' הגן:

109.90.29316

סינגוליר 5 מ"ג טבליות לליישה:

109.91.29317

סינגוליר 10 מ"ג טבליות:

שם הפשטות ולהקלת הקרייה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.