



עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים (תקשיים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

דיבן טబליות בשחרור ממושך

כל טבליה מכילה:

בופרופין הידרוכלוריד 150 מ"ג
(Bupropion hydrochloride 150 mg)

לרשימת החומרים הבלתי פעיליים ואלרגניים בתכשיר ראה סעיף 6 – " מידע נוסף".
קרא בעיון את העalon עד סוף בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על
התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה
לך כי מצבם הרפואי דומה.
התרופה אינה מיועדת לאנשים מתחת לגיל 18 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

דיבן מותווית לשימוש בהפסקת עישון בשילוב עם תוכנית תמייכה כוללת להפסקת עישון.
היעילות של דיבן תהיה מוגברת אם אתה מחויב באופן מלא לוטור על העישון. היועץ ברופא
או ברוקח בקשר לטיפולים ותמייקה נוספת שייעזרו לך להפסיק.

קבוצה Terapeutic:

תרופות נגדות דיכאון אחרות (other antidepressants)

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לבופרופין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה
(מפורט בסעיף 6).
- אתה לוקחת תרופות אחרות כלשהן המכילות בופרופין (כגון וולבטרין XR לטיפול
בדיכאון)
- יש לך בעיה רפואית הגורמת להתקפים (פרקוטיסם), כגון אפילפסיה, או אם יש לך
היסטוריה של התקפים
- יש לך או הייתה לך בעבר הפרעת אכילה (לדוגמא בולימיה או אנורקסיה נרבה)
- יש לך בעיות כבד חמורות, כגון שחמתת
- יש לך גידול במוח
- אתה בדרכך כל שטיין כבד זהה עתה הפסקת לשותות אלכוהול, או שבכוננתך להפסיק
לשחות בזמן שאתה לוקח דיבן

- הפסיקת לאחרונה לקחת תרופות הרגעה או תרופות לטיפול בחרדה (במיוחד במקרים דומים או תרופות דומות), או אם אתה מתכוון להפסיק לקחת אותן בזמן שאתה לוקח זיבן
 - יש לך הפרעה דו-קוטבית (תנדות קיצונית במצב הרוח), לאחר שזיבן עלולה להביא לאפיודה של מחלת זו
 - אתה לוקח תרופות לטיפול בדיcano או במחלה הפרקיןסן הנקראות מעכבי מונאמי אוקסידאז (MAOIs), או אם לקחת אותן במשך 14 ימים האחרוניים. פרק זמן זה עשוי להיות קצר יותר מאשר סוגי מסוימים של MAOIs – הרופא ייעץ לך בנוגע.
- ← אם אחד מלאה חל עלייך, שוחח מיד עם הרופא ואל תיקח זיבן.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרפופה
שוחח עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בזיבן, היית שמצבים מסוימים מעלים את הסבירות שהיהו לך תופעות לוואי (ראה גם סעיף 4).

תסמונת ברוגדה

אם יש לך מצב הנקרא **تسمונת ברוגדה** (تسمונת תורשתית נדירה המשפיעה על קצב הלב) או אם דום לב או מוות פתאומי אירעו במשפחה.

ילדים ומתבגרים

זיבן אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

מבוגרים

התקפים (פרכוסים)

נמצא כי זיבן עלולה לגרום להתקפים (פרכוסים) בכ-1 מתוך 1,000 אנשים (ראה גם 'אינטראקטיות/תגובה בין תרופה/טיפול' בהמשך סעיף זה וסעיף 4, תופעות לוואי, למידע נוספת). הסבירות להתקפים גבוהה יותר אם:

- אתה שותה הרבה אלכוהול באופן קבוע
- יש לך סוכרת גבוהה אתה משתמש באינסולין או בטבליות
- הייתה לך פגיעה ראש חמורה או היסטוריה של חבלת ראש

אם אחד מלאה חל עלייך, אל תיקח זיבן אלא אם כן הסכמתם עם הרופא על כך שיש סיבה משמעותית לקחת אותה.

אם יש לך התקף (פרכוס) במהלך הטיפול:

← הפסיק לקחת זיבן ואל תמשיך בטיפול. פנה לרופא.

אתה עלול להיות בסיכון גבוה יותר לתופעות לוואי אם:

- יש לך בעיות בכלייה או בכבד
- גילך מעל 65

במקרים אלו תצטרכן לקחת מינון נמוך יותר (ראה סעיף 3) ולהיבדק בקביעות בזמן שאתה לוקח זיבן.

אם היו לך בעיות נפשיות

מספר אנשים שנטלו זיבן חוו הziות או אשליות – מוחשבות שווה (ראייה, שמיעה או אמונה בדברים שאינם קיימים), מוחשבות מבולבלות או תנודות קיצונית במצב הרוח. תופעות אלו סבירות יותר בקרב אנשים שהיו להם בעיות נפשיות לפני כן.

אם אתה מרגיש מודока או אובדן

אנשים מסוימים עושים מודוכים כאשר הם מנסים להפסיק לעשן; לעיתים רחוקות מאוד הם עלולים לחשوب על ביצוע התאבדות או שנסו להתאבד. תסמים אלו השפיעו על אנשים שלקחו זיבן, בעיקר בשבועות הראשונים של הטיפול.

אם אתה מרגיש מודока או חושב על התאבדות:

← **צור קשר עם הרופא או גש לבית החולים באfon מיד.**

אם אתה לוקח תרופות לדיכאון

השימוש בתרופות אלה יחד עם זיבן עלול להוביל לתסומנות סרוטוני, מצב שיכול לסכן חיים (ראה 'אינטראקציות/תגובה בין תרופתיות' בסעיף זה)

לחץ דם גבוה ודיבן

מספר אנשים שלקחו זיבן פיתחו לחץ דם גבוה המצריך טיפול. אם כבר יש לך לחץ דם גבוה, הוא עלול להחמיר. הסיבות לכך גבוהה יותר אם אתה משתמש גם **בבדיקות ניקוטין** כדי לסייע לך להפסיק לעשן.

← **לחץ הדם שלך יבדק לפני שתיקח זיבן ובמהלך הטיפול, ביחיד אם כבר יש לך לחץ דם גבוה.** אם אתה משתמש גם בבדיקות ניקוטין, לחץ הדם שלך צריך להיבדק כל שבוע. אם לחץ הדם שלך יעלה, יתכן שתצטרך להפסיק לקחת זיבן.

אינטראקציות/תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקח, אם לקחת לאחרונה או יתכן שתיקח תרופות אחרות **ככל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

אתה עלול להיות בסיכון גבוה מהרגיל להתקפי פרוכוסים אם אתה לוקח:

- **טרופות לטיפול בדיכאון או בעיות אחרות בתחום בריאות הנפש** (ראה בנוספ' 'אין להשתמש בתרופת אם' בתחילת סעיף 2)
- **טאופילין לטיפול באסתמה או מחלת ריאות**
- **טרמדול, משכך כאבים חזק**
- **טרופות נגד מלריה**
- **מריצים או תרופות אחרות לשיליטה במשקל או בתיאבון**
- **סטרואידים** (פרט לקרמים וחליבים לביעות עיניים ועור)
- **אנטיביוטיקות הנקראות קוינולוגים**
- **סוגים מסוימים של אנטי היסטמינים** המשמשים בעיקר לטיפול באלהיות, אשר יכולים לגרום לשינויות
- **טרופות לטיפול בסוכרת.**

← אם אתה לוקח תרופות כלשהן מרשימה זו, שוחח עם הרופא מיד בטרם תיקח זיבן (ראה סעיף 3, אנשים מסוימים צריכים לנקחת מינון נמוך יותר).

תרופות מסוימות יכולות להשפיע על אופן הפעולה של זיבן או להעלות את השכיחות לתופעות לוואי:

- **תרופות לדיכאון** (כגון דזיפראמין, אימיפראמין, פארוקסטין, ציטלופרム, אסציטלופרム, ונלפקסין) או **לביעות אחרות בתחום בריאות הנפש** (כגון ריספרידון, תיוריידזין). זיבן יכולה להגיב עם תרופות מסוימות המשמשות לטיפול בדיכאון ואתה עלול לחותות שונות במצב הנפשי (לדוגמא אי שקט, היזות, תרדמת), והשפעות אחרות כגון חום גוף מעל 38°C, עלייה בקצב הלב, לחץ דם לא יציב, רפלקסים מוגזמים, נוקשות שרירים, חוסר קוורדיינציה /או תס敏ים של מערכת העיכול (לדוגמא בחילה, הקאה, שלשלול).
- **תרופות למחלת הפרקינסון** (כגון לבודופה, אמאנטאידין או אורפננדرين)
- **קארבאמאזפין, פניטואין או אלפרואט**, לטיפול באפילפסיה או בבעיות נפשיות מסוימות
- **תרופות מסוימות המשמשות לטיפול בסרטן** (כגון ציקלופוספאמיד, איפוספאמיד)
- **קלופידוגREL**, המשמשת בעיקר לטיפול במחלת לב או שחץ
- **חוסמי בטא מסוימים** (כגון מטופרולול), המשמשים בעיקר לטיפול בחץ דם גבוה
- **תרופות מסוימות להפרעות בקצב הלב** (כגון פרופאפנון, פלקאייניד)
- **ריטונאביר או אפברידין**, לטיפול בדיזומ VIIH.

← אם אתה לוקח תרופות כלשהן מרשימה זו, בדוק עם הרופא. הרופא ישקול את היתרונות והסיכוןים עבורך בלקיחת זיבן, או עשוי להחליט לשנות את המינון של התרפיה אחרת שאתה לוקח.

זיבן עלולה להפחית יעילות של תרופות אחרות

- אם אתה לוקח טאמוקסיפין המשמשת לטיפול בסרטן השד

← אם זה חל עלייך, ספר לרופא. יתכן שהיא צריכה לשנות לטיפול אחר להפסקת עישון.

- אם אתה לוקח דיגוקסין לטיפול בלב

← אם זה חל עלייך, ספר לרופא. הרופא עשוי לשקל את התאמת המינון של דיגוקסין.

יתכן שהיא צריכה להפחית את המינון של תרופות מסוימות כאשר אתה מפסיק לעשן
כשאתה מעשן, הכימיקלים הנספגים בגוף יכולים לפגוע ביעילות של תרופות מסוימות.
כשאתה מפסיק לעשן, יתכן שהיא צריכה להפחית את המינון של תרופות אלו; אחרת, אתה עלול לחותות תופעות לוואי.

אם אתה לוקח תרופות אחרות, שוחח עם הרופא אם אתה מבחין בתס敏ים חדשים שאתה חושב כי הם עשויים להיות תופעות לוואי.

שימוש בתרפיה ומזון
ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרפיה?".

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול
חלק מהאנשימים מוצאים שהם רגשים יותר לאלכוהול כאשר הם נוטלים זיבן. יתכן שהרופא ימליץ לך לא לשות אלכוהול בזמן נטילת זיבן, או לנסות לשנות מעט כל האפשר. אם אתה נהוג לשנות כמויות גדולות של אלכוהול, אל תפסיק בפתאומיות, היית זהה עלול להגדיל את הסיכון שתחווה התקף פרטוסים.

השפעה על בדיקות שתן
זיבן עלולה לפגוע בתוצאות של בדיקות שתן מסוימות לציהוי תרופות אחרות. אם עלייך לעבור בדיקת שתן, ספר לרופא או לבית החולים שאתה לוקח זיבן.

הירין והנקה
אל תיקח זיבן אם אתה בהירין, חושבת שיתacen שאתה בהירין או מתכוננת להרות. היועצי ברופא או ברוקח לפני קייחת תרופה זו.
חלק מהמחקרנים, אך לא כולם, דיווחו על עלייה בסיכון למומים מולדמים, במיוחד מומי לב, בתינוקות שאימהותיהם נטלו זיבן. לא ידוע אם הם עקב השימוש בזיבן.

המרכיבים של זיבן יכולים לעורר לחלב אם. היועצי ברופא או ברוקח לפני קייחת זיבן.

נהייה ושימוש במכוונות
כמה מתופעות הלואאי של זיבן, כגון תחושת סחרחות או הרגשה שעומדים להתעלף, עלולות להשפיע על הריכוז ושיקול הדעת שלך.
אם אתה מושפע ממנה, אל תנהג או תעשייל מכוונות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקביל בדרך כלל הוא:

זמן נטילת זיבן	יום 1 עד 6	יום 7	הтирוץ
• יש להתחיל לנקה זיבן כאשר אתה עדין מעשן.	קח טבליה אחת (150 מ"ג), פעמיים ביום.		רצוי מודע להמשיכך נטילת זיבן
• יש לקבוע תאריך יעד להפסקת עישון, רצוי מאוד במהלך השבוע השני לנטילת התרופה.	יש להעלות את המינון לטבליה אחת, פעמיים ביום, בהפרש של לפחות 8 שעות ביןיהן, ולא בסמוך בזמן השינה.		לעישן בזמן נטילת זיבן

<p>המשך לקחת טבליה אחת, פעמיים ביום.</p> <p>הפסיק לעשן בשבוע זה, בתאריך היעד שלו להפסקת העישון.</p>	שבוע 2
<p>יש להמשיך לקחת טבליה אחת, פעמיים ביום עד ל-9 שבועות.</p> <p>אם אין מסוגל להפסיק לעשן לאחר 7 שבועות, הרופא ייעץ לך להפסיק לתקחת זיבן.</p> <p>יתכן שייעוץ לך להפסיק לתקחת זיבן בהדרגה, לאחר 9-7 שבועות.</p>	שבועות 3 עד 9

אנשים מסוימים צריכים לתקחת מינון נמוך יותר להיות יש להם סיכוי גבוה יותר לפתח תופעות לוואי.

- אם גילך מעל 65
 - אם יש לך מחלת כבד או כלות
 - אם אתה בסיכון גבוה יותר להתקפים (ראה 'ażhorot miyachdot haengutot leshimush betharufah v'anterakzitot/tgavot bein terufatiot basuf' 2)
- המונה המקסימלית המקובלת עבורך היא **טבליה אחת של 150 מ"ג** פעם אחת ביום.
- אין לעבור על המונה המומלצת.**

כיצד לתקחת את הטබליות יש לתקחת טබליות זיבן בהפרש של לפחות 8 שעות בין מנתה למנה. אל תיקח טבליית זיבן בסמוך לזמן השינה – היא עלולה לגרום לקשיים בשינה.

ניתן לתקחת זיבן עם או ללא מזון.

בלע את טබליות זיבן בשלמותן. אין ללעום, לכטוש או לחצוט אותן – אם תעשה זאת, התרופה תשחרר לתוך גופך מהר מדי. הדבר יגביר את הסיכון שייהו לך תופעות לוואי, כולל התקפים.

אם נטלה בטיעות מינון גבוה יותר אם נטלה יותר מדי טබליות, יתכן שתעללה הסבירות להתקף (פרכוים) או תופעות לוואי אחרות.

אם נטלה מנתה יתר או אם בטיעות בלע לצד מן התרופה ← אל תתעכב, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיעוד, קח את המונה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
אין ליטול מנתה כפולה כדי לפצצת על המונה שנשכחה.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

יתכן שתצטרכך לתקחת זיבן לפחות 7 שבועות כדי להשיג את השפעתה המלאה.

אין להפסיק לקחת דיבן ללא התיעצות עם הרופא טרם ההחלטה. יתכן שתצטרכך להפחית את המינון שלך בצורה הדרגתית.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה **בכל פעע** שהן נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם הנר זkok להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, **היוועץ ברופא או ברוקח.**

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בדיבן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשיימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות התקפים (פרוכוסים)

כ-1 מכל 1,000 אנשים הנוטלים דיבן נמצא בסיכון להתקף.
תסמינים של התקף כוללים עוויתות, ובדרכן כלל אובדן הכרה. יתכןשמי שחוויה התקף יהיה מבולבל לאחריו, ואולי לא יזכור את מה שקרה.
הסבירות להתקפים גבוהה יותר אם אתה לוקח יותר מד' דיבן, אם אתה לוקח תרופות נוספות,
או אם אתה נמצא בסיכון גבוהה מהרגיל להתקפים (ראה סעיף 2).
← **אם יש לך התקף**, דוחה לרופא לאחר שתתאושש. אל תייח יותר דיבן.

תגובהות אלרגיות

לעתים נדירות (בשיעור של עד 1 מכל 1,000) אנשים עלולים לפתח תגובה אלרגית חמורה לדיבן. סימנים של תגובה אלרגית כוללים:

- פריחה בעור (כולל פריחה מוגדרת וגבושאית). פריחות עור מסוימות עלולות להצריך טיפול בבית החולים, במיוחד אם אתה סובל בנוסף גם מכאב בפה או בעיניים
 - צפצופים בלתי רגילים או קשיי נשימה
 - עפupyים, שפטים או לשון נפוחים
 - כאבים בשירים או במפרקים
 - התמוטטות או אובדן הכרה
- ← **אם יש לך סימנים כלשהם של תגובה אלרגית, צור קשר עם רופא מיד. אל תייח טיפולות נוספות.**

פריחה ערית של לוופו (זאבת) או החמרה של תסמיini לוופו

שיעור לא ידועה – לא ניתן להעריך את שכיחות התופעה מהמידע הקיים על אנשים הולכים דיבן.

לוופו הינה הפרעה במערכת החיסון המשפיעה על העור ואיברים אחרים.

← אם אתה חווה התלקחות של לופוס, פריחה עורית או נגעים (ביחוד באזורים החשופים לשמש) במהלך השימוש בזיבן, צור קשר עם הרופא מיד, לאחר מכן יש להפסיק את הטיפול.

פוסטולוזיס תפרחתית מפושתת חריפה (Acute Generalised Exanthematous Pustulosis - AGEP)

שכיחות לא ידועה – לא ניתן לומר שכיחות התופעה מהמידע הקיים על אנשים הלוקחים זיבן.

התסמינים של AGEP כוללים פריחה עם פצעוניים/שלפוחיות מלאי מוגלה.

← אם יש לך פריחה עם פצעוניים/שלפוחיות מלאי מוגלה, צור קשר עם הרופא מיד, לאחר מכן יש להפסיק את הטיפול.

תופעות לוואי נספנות

תופעות לוואי שכיחות מואוד

אליה עלולות להופיע ב- **יותר מ 1 מכל 10** אנשים:

- קשיים בשינה (ודא כי אין לך זיבן בסמוך בזמן השינה).

תופעות לוואי שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 10** אנשים:

- הרגשת דיכאון (ראה גם אזהרות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה' בסעיף 2)
- תחושת חרדה או אי שקט
- קשיי ריכוז
- תחושת רעדר
- כאב ראש
- בחילה, הקאה
- כאב או פפרעות אחרות בגוף (כגון עצירות), שינויים בטעם המזון, יובש בפה
- חום, סחרחות, הזעה, פריחה בעור (לעתים בשל תגובה אלרגית), גרד.

תופעות לוואי שאין שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 100** אנשים:

- צלצולים באוזניים, הפרעות בראייה
- עלייה בלחץ הדם (לעתים חמורה), הסמקה
- אובדן תיאנון (אנורקסיה)
- תחושת חולשה
- כאב בחזה
- תחושת בלבול
- דופק מהיר.

תופעות לוואי נדירות

אליה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 1,000** אנשים:

- התקפים (ראה תחילת סעיף זה)
- עוינות, נוקשות שרירים, תנעות לא רצניות, בעיות בהליכה או בקואורדינציה (אטקסיה)
- דפיקות לב
- עילפון, תחושת עילפון כאשר אתה נעמד בפתאומיות, משומ שלחץ הדם שלך יורדת
- תחושת רגונות או עיינות; חלומות מוזרים (כולל סיוטים)
- אובדן זיכרון
- עקצוץ או חוסר תחושה
- תגבות אלרגיות חמורות; פריחה המלאוה בכאבי מפרקים ושרירים (ראה תחילת סעיף זה)
- השטנה מרובה או פחותה מהרגיל
- פריחות חמורות בעור העולות להופיע בפה ובחלק גוף אחרים ויכולות להיות מסכנות חיים
- החמרה של פסורייזיס (כתמים מעובדים של עור אדום)
- הצהבה של העור או של הלובן בעיניים (צ habitats), עליה באזימי הכבד, דלקת כבד
- שינויים ברמות הסוכר בدم
- תחושה של ניתוק מהמציאות או מוזרות (דה-פרטונליזציה); ראייה או שמיעה של דברים אשר אינם קיימים (הzioniות).

תופעות לוואי נדירות מאוד

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10,000 אנשים:

- חוסר מנוחה, תוקפנות
- תחושה של דברים אשר אינם נוכנים או אמונה שווה (אשליות); חסדיות יתר (פרניהם)
- אי שליטה במתן שני (בריחת שני, דליפת שני).

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה

תופעות לוואי אחרות הופיעו בקרב מספר קטן של אנשים, אך שכיחותן המדויקת אינה ידועה:

- מחשבות על פגיעה עצמית או מחשבות אובדן בזמן לקיחת זיבן או מיד לאחר הפסיקת הטיפול (ראה סעיף 2 'לפני השימוש בתרופה'). אם יש לך מחשבות כאלו, **צור קשר עם הרופא או גש לבית החולים באופן מיידי.**

- אובדן קשר עם המציאות ופגיעה בכושר השיפוט וביכולת לחשב בצורה צלולה (פסיכזה);
تسمינים אחרים יכולים לכלול הזיות ו/או אשליות
- תחושה פתאומית של פחד עז (התקף חרדה)

גמגום

- ירידה במספר תאי הדם האדומים (אנמיה), ירידה במספר תאי הדם הלבנים (לויוקופניה)
וירידה במספר טסיות הדם (תרומבוציטופניה)
- ירידה ברמת הנתרן בדם (היפונתרמיה)

- שינויים במצב הנפשי (לדוגמה אי שקט, היזות, תרדמת), והשפעות אחרות כגון גוף מעל 38°C , עליה בקצב הלב, לחץ דם לא יציב ורפלקסים מגזימים, נוקשות שרירים, חוסר קואורדינציה ו/או תסמים של מערכת העיכול (לדוגמה בחילה, הקאה, שלשול), בעת

לקיחת זיבן יחד עם תרופות אחרות לטיפול בדיכאון (כגון פארוקסטין, ציטלופרם, אסציטילופרם, פלאואוקסטין וונלפקסן).

תופעות של הפסקת עישון

אנשים המפסיקים לעשן מושפעים לעיתים קרובות מהగמילה מניקוטין. הדבר יכול להופיע גםanganhim הלוקחים זיבן. סימני גמילה מניקוטין כוללים:

- קשיי שינה
 - רעד או חזעה
 - תחושת חרדה, אי שקט או דיכאון, לעיתים יחד עם מחשבות אובדן.
- דבר עם הרופא אם יש לך חששות כלשהם בנוגע להרגשתך.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לבדוק על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (לואאי המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>)

5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזקה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- אין לאחסן מעל 25°C.
- יש לאחסן באזקה המקורי.
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביתית. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- בנוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
ליבת הטבלייה:

Microcrystalline cellulose, hypromellose 2910, cysteine hydrochloride monohydrate, magnesium stearate.

ציפוי הטבלייה:

Hypromellose 2910, titanium dioxide, macrogol 400 ,carnauba wax.

דיב:

Iron oxide black, hypromellose.

- **כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה:**
טבליות זיבן 150 מ"ג הן טבליות לבנות, מצופות, קמורות משני הצדדים, עגולות עם הדפס "CH7 GX" המופיע על צד אחד. הטבליות ארוחות בבליסטרים (מגשיות), באזינות קרטון המכילות 10, 30, 60 או 100 טבליות.
יתכן שלא כל גדיי האזינות ישוווקו.
- **בעל הרישום:** גלקסוסמייטקלין (ישראל) בע"מ, רח' בל 25, פתח תקווה.
- **יצרן:** גלקסו וולקאם S.A., בורגס, ספרד.
- **מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות:** 118-33-29919.
- **לשם הפשתות ולהקלת הקראיה,** עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בדצמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכינותו של קבוצת החברות של GSK.
© 2023 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.

Zyb PT v13