

اللوميا

## محلول للحقن في محقنة جاهزة للاستعمال

المادة الفعالة وكميتها:

تحتوي كل محقنة جاهزة للاستعمال على 100 ملг تيلدراكيزوماب (tildrakizumab 100 mg) في 1 مل.

المواد غير الفعالة ومُسَبِّبات الحساسية: انظر الفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه لآخرين. لأنه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

### 1. لم أعد هذا الدواء؟

إلوانيا معد لعلاج صدفية الطبقات (psoriasis plaque)، لدى البالغين الذين لديهم مرض بدرجة معتدلة حتى خطيرة والذين على وشك اجتياز علاج جهازي (مجموعي) أو علاج بالضوء.

المجموعة العلاجية:

مثبطات جهاز المناعة، مثبطات إنترلوكين.

يعمل إلوانيا عبر إعاقة نشاط بروتين يدعى IL-23، وهو مادة في الجسم تشارك في ردود الفعل الالتهابية والمناعية العادي وتتوارد بمستويات عالية في أمراض مثل الصدفية.

سيفيدك استعمال إلوانيا في التخلص من الآفات الجلدية وتقليل أعراضها.

### 2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجحية) لتيلدراكيزوماب أو لأي من المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر الفصل 6).
- كانت لديك عدوى ذات أهمية وفق رأي الطبيب، مثل: مرض السل النشط، وهو مرض معدي، يؤثر تحديداً في الرئتين.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء  
قبل بدء العلاج بإلوانيا أخبر الطبيب إذا:

- كانت لديك ردود فعل تحسسية مع أعراض مثل ضغط في الصدر، صفير، تورم الوجه، الشفتين أو الحنجرة، توقف عن حقن إلوانيا وتوجه إلى الطبيب حالاً.
- كانت لديك عدوى حالياً أو إذا كنت تعاني من حالات عدوى على الأمد الطويل أو حالات عدوى متكررة.
- حصلت مؤخراً على لقاح أو تخطط للحصول على لقاح.

في حال لم تكن متأكداً فيما إذا كانت إحدى هذه الحالات تتطبيق عليك تحدث مع الطبيب، الصيدلي أو الممرضة قبل استعمال إلوانيا.

انتبه إلى حالات العدوى وردود الفعل التحسسية

قد يسبب إلوانيا أعراضًا جانبية خطيرة، تشمل على حالات عدوى وردود فعل تحسسية. عليك الانتباه بشكل خاص إلى علامات تشير إلى هذه الحالات خلال استعمال إلوانيا.

توقف عن استعمال إلوانيا وأبلغ الطبيب أو توجه فوراً للطبيبي مساعدة طبية إذا ظهرت لديك علامات تدل على عدوى خطيرة محتملة أو رد فعل تحسسي (انظر الفصل 4، الأعراض الجانبية خطيرة).

الأطفال والمرأهقون

لم يثبت بعد أمان ونجاعة إلوانيا لدى الأطفال والمرأهقين دون سن 18 عاماً، لهذا لا يوصى باستعمال إلوانيا لدى الأطفال والمرأهقين.

**التفاعلات/ ردود الفعل بين الأدوية**  
إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تأخذ لقاحات ومثبّطات جهاز المناعة (أدوية تؤثر في جهاز المناعة).

عليك تجنب تلقي بعض أنواع اللقاح (اللقاحات الحية) أثناء استعمال إلوميلا. لا تتوفر معطيات حول استعمال إلوميلا ولقاحات حية بالتزامن.

**الحمل، الرضاع والخصوصية**  
يفضل الامتناع عن استعمال إلوميلا خلال الحمل. إن تأثيرات هذا الدواء على النساء الحوامل ليست معروفة.

إذا كنت امرأة قادرة على الحمل، يوصى لك بتجنب الحمل، وعليك استعمال وسائل منع حمل ناجعة خلال العلاج بإلوميلا ولمدة 17 أسبوعا على الأقل بعد العلاج.

إذا كنت حاملاً أو مريضة، تظنين أنك حامل، أو تخططين للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

**السيادة واستعمال الماكينات**  
لا يؤثر العلاج بإلوميلا أو أنه يؤثر قليلاً جدًا في قدرتك على السيادة وتشغيل الماكينات.

### **3. كيف تستعمل الدواء؟**

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. إلوميلا معد للاستعمال وفق توصية ومراقبة طبيب خبير بتشخيص الصدفية وعلاجها. الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط.

كل محقنة معدة للاستعمال لمرة واحدة فقط.

الجرعة الاعتيادية من إلوميلا غالبا هي 100 ملغ بحقنة تحت الجلد في الأسبوعين 0 و 4، وكل 12 أسبوعا بعد ذلك.

يحدد الطبيب الوقت الذي يتبعين عليك فيه تناول إلوميلا.  
بعد أن تحصل على إرشاد ملائم حول تقنية الحقن تحت الجلد، يمكنك حقن إلوميلا بنفسك إذا حدد الطبيب أن هذه الخطوة ملائمة.

للحصول على تعليمات حول حقن إلوميلا حقنا ذاتيا، راجع "تعليمات الاستعمال" في نهاية هذه النشرة.

تحدد مع الطبيب حول موعد تلقي الحقنات وزيارات المتابعة.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا استعملت كمية أكبر من اللزوم من إلوميلا  
إذا حققت كمية أكبر من إلوميلا من الكمية التي كان يفترض أن تحصل عليها، أو إذا حصلت على الجرعة في وقت أكبر نسبيا من تعليمات الطبيب، أخبر الطبيب بذلك.

**إذا نسيت استعمال إلوميلا**  
إذا نسيت أو تخطيت حقنة إلوميلا، الحقن الجرعة في أسرع وقت ممكن. بعد ذلك، استعمل الدواء مجددا بفوارق زمنية ثابتة بموجب ما تم تحديده لك.

**إذا توقفت عن استعمال إلوميلا**  
يجب اتخاذ القرار حول التوقف عن استعمال إلوميلا بناء على محادثة مع الطبيب. قد تظهر الأعراض مجددا بعد التوقف عن الاستعمال.  
يجب المداومة على العلاج وفقاً لتوصية الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.  
إذا كانت لديك أسلمة إضافية تتعلق باستعمال الدواء، استشير الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، يمكن أن يسبب استعمال هذا الدواء أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، فقد لا تعاني من أيٍ منها.

أعراض جانبية خطيرة توجه إلى الطبيب حالاً إذا تعرضت لأحد الأعراض التالية:

- تورم الوجه، الشفتين أو الحنجرة
- صعوبات في التنفس

لأن هذه الأعراض قد تكون علامات على رد فعل تحسسي.

أعراض جانبية إضافية

معظم الأعراض الجانبية التالية طفيف. إذا تفاقم أي عارض جانبي، أخبر الطبيب أو الصيدلي.

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تحدث لدى أكثر من واحد من بين 10 مستعملين):

- حالات عدوى في المسالك التنفسية العليا

أعراض جانبية شائعة (قد تحدث لدى حتى واحد من بين 10 مستعملين):

- التهاب في الجهاز الهضمي (gastroenteritis)
- غثيان
- إسهال
- ألم في موقع الحقن
- ألم في الظهر
- صداع

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أيٍ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى استماراة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي و المجال روئية الأولاد و/أو الأطفال، وهذا تتجنّب التسمم. لا تسبّب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على عبوة وملصقة المحقنة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من ذات الشهر.

شروط التخزين:

يجب الاحتفاظ بالمنتج في العبوة الكرتونية الأصلية لحمايته من الضوء. لا يجوز خصمه. يجب الاحتفاظ به في الثلاجة (2°C – 8°C).

بعد إخراج المحقنة الجاهزة للاستعمال من الثلاجة، يجب الانتظار نحو 30 دقيقة لكي يصبح محلول إلوميا في المحقنة بدرجة حرارة الغرفة (حتى 25°C). لا يجوز التدفئة بأية طريقة أخرى.

لا يجوز الاستعمال إذا كان السائل يتضمن جزيئات يمكن رؤيتها، إذا كان عكراً أو إذا بدا لونه بنياً بشكل واضح.

بعد إخراج العبوة من الثلاجة، لا يجوز تخزين تيلر اكيزوماب بدرجة حرارة أعلى من 25°C أو إعادةه إلى الثلاجة. سجل تاريخ إخراج العبوة من الثلاجة في المكان المعد لذلك على الكرتونة. استعمل المحقنة خلال 30 يوماً بعد إخراجها من الثلاجة أو حتى انتهاء تاريخ انتهاء الصلاحية، الأول من بينهما.

يُمنع إفقاء الدواء في مياه الصرف الصحي أو في سلة النفايات المنزلية. استشر الصيدلي لمعرفة كيفية التخلص من الدواء. تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

## **6. معلومات إضافية**

**إضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على:**

sucrose, L-histidine hydrochloride monohydrate, polysorbate 80, L-histidine and water for injections.

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:**  
الوميا هو محلول شفاف حتى حلبي قليلاً، وعديم اللون حتى مائل إلى الأصفر قليلاً.  
يتوفر إلوميا في عبوة تحتوي على محقنة جاهزة للاستعمال لمرة واحدة.  
تحتوي كل محقنة جاهزة للاستعمال على واقٍ إبرة وغطاء إبرة.

**اسم المنتج وعنوانه:** Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.  
Polaris Avenue 87, 2132 JH Hoofddorp, The Netherlands

**صاحب التسجيل وعنوانه:** تارو إنترنشيونال م.ض، شارع هكينور 14، خليج حيفا، 2624761

تم تحريرها في تشرين الثاني 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

**رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:** 00-36455-49-167.

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.

## تعليمات الاستعمال


قبل استعمال المحقن الجاهزة للاستعمال:

### نقاط تجدر معرفتها

- قبل أن تستعمل إلوميا محقنة جاهزة للاستعمال، اقرأ كل التعليمات خطوة ثلو الأخرى بتمعن وابعها بعناية. احفظ بتعليمات الاستعمال وراجعها وفق الحاجة.
- لا يجوز خض المحقن الجاهزة للاستعمال.
- اقرأ النشرة للمستهلك الخاصية بيلوميا لتعرف المزيد عن الدواء.

### وصف المنتج


هكذا يبدو إلوميا محقنة جاهزة للاستعمال:



### التحضير



1. أخرج العبء من الثلاجة (في حال تخزينها في الثلاجة)
  - أخرج عبوة كرتون من الثلاجة وضع عبوة الكرتون الأصلية المغلقة على مسطح عمل نظيف ومستو.
2. انتظر 30 دقيقة (في حال تخزينها في الثلاجة)
  - أبق المحقنة الجاهزة للاستعمال في الكرتونة (واترك الغطاء مغلقا) واتركها بدرجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة.
3. افحص مظهر الدواء عبر النظر
  - أخرج المحقنة الجاهزة للاستعمال من الكرتونة عندما تكون جاهزاً للحقن.
    - افحص تاريخ انتهاء الصلاحية الظاهر على الكرتونة وعلى المحقنة الجاهزة للاستعمال وتخلص من المحقنة في حال انقضى تاريخ ساريان المفعول.
    - لا تنزل غطاء الإبرة حتى تكون جاهزاً للحقن.
  - افحص إلوميا عبر النظر لرؤيه بأنها لا تتضمن أجزاء أو إذا طرأ تغيير على لونه قبل الحقن.
    - إلوميا هو محلول شفاف حتى حليبي قليلا، وعديم اللون حتى مائل إلى الأصفر قليلا.
    - لا يجوز الاستعمال إذا كان السائل يتضمن جزيئات يمكن رؤيتها، أو إذا كانت المحقنة متضررة. قد تكون هناك فقاعات هواء؛ لا داعي لتحريرها.
    - يُمنع استعمال المستحضر إذا سقط على سطح صلب أو تعرض للضرر.



#### 4. اجمع كل المواد التي تحتاجها

- ضع الأغراض التالية على مسطح عمل نظيف ومضاء جيدا:
  - منديل كحولي
  - قطعة قطن أو شاش
  - ضمادة لاصقة
  - وعاء للتخلص من الأغراض الحادة

#### 5. اغسل يديك

- اغسل يديك جيدا بالصابون والماء.




#### 6. اختر موقع الحقن

- اختر موقع حقن يكون فيه الجلد أملس ويمكن الوصول إليه بسهولة مثل البطن، الفخذين أو الذراع العلوية.
  - لا يجوز الحقن على بعد 5 سم من السرة أو في موقع يكون فيه الجلد حساسا، متكمدا، أحمر بشكل شاذ، صلبا أو متأثرا بالصدفية.
  - لا يجوز الحقن في منطقة ذات ندبات، علامات شد جلدية أو في الأوعية الدموية.
  - الذراع العلوية ملائمة فقط عندما يعطي لك الحقنة شخص آخر.

#### 7. نظف موقع الحقن

- نظف موقع الحقن بمنديل كحولي، ثم دع الجلد يجف.
- لا يجوز ملامسة هذا الموقع ثانية قبل الحقن.



موقع حقن ملائم فقط إذا ساعدهك شخص آخر على تلقي الحقنة.

#### الحقن

#### 8. أزل غطاء الإبرة

- في الوقت الذي تمسك فيه بجسم المحقنة الجاهزة للاستعمال، أزل غطاء الإبرة وفق ما هو موضح في الرسم، وتخلص منه. يمكن أن تشاهد قطرة أو قطرتين من السائل. هذه الحالة سليمة.
  - لا تلمس حاليا المكبس الأزرق.
  - لا يجوز الاستعمال إذا كانت المحقنة الجاهزة للاستعمال أو الإبرة ملتوتين.




#### 9. أقرص الجلد وأدخل الإبرة

• أقرص الجلد بحذر في موقع الحقن الذي اخترت.

• أدخل الإبرة كلها في الجلد الذي تمسك به بين أصابعك، بينما تكون المحققة بزاوية 45 حتى 90 درجة.

◦ لا تضع أصابعك على المكبس أثناء إدخال الإبرة.

• أمسك المحققة الجاهزة للاستعمال بشكل ثابت.



#### 10. الحقن

• بعد إدخال الإبرة، حرر الجلد بلطف.

• اضغط على المكبس الأزرق حتى يتوقف عن التقدم. تشتمل هذه الخطوة آلية الأمان وتتضمن عودة الإبرة بعد الحقن بشكل كامل.

◦ تُعطى الجرعة الكاملة في حال لا يعود المكبس الأزرق قادرًا على التقدم، ولم يحدث تسرب.




#### 11. أخرج المحققة المستعملة

•

• أخرج الإبرة من الجلد بالكامل قبل أن تحرر المكبس الأزرق.

◦ بعد تحرير المكبس الأزرق، يسبب قفل الأمان سحب الإبرة إلى داخل وaci الإبرة.



- تخلص من المحقنة المستعملة في حاوية الأدوات الحادة بعد استعمالها.
- إذا ظلت بقايا من السائل أو القليل من الدم، نظف موقع الحقن بقطعة قطنية أو قطعة شاش دون أن تمارس ضغطاً. إذا شعرت بأن هناك حاجة، يمكن أن تستعمل ضمادة لاصقة لتغطية موقع الحقن.