

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיירים) התשמ"י - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ויאק תמייסה למtan לטור שלפוחית השtan

חומר פעיל

אוקסיבוטיניין הידרוקולוריד (oxybutynin hydrochloride)

1 מ"ל תמייסה מכיל 1 מ"ג אוקסיבוטיניין הידרוקולוריד.

1 מזרק מוכן לשימוש מכיל 10 מ"ג אוקסיבוטיניין הידרוקולוריד.

חומרם בלתי פעילים וآلרגניים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוספים".
קרוא בעין את העלון עד סוף בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

ויאק מותוווה לדיכוי פעילות יתר נירוגנית של הדטרוזור (NDO) בילדים מגיל 6 ובמבוגרים, אשר מ羅קנים את שלפוחית השtan באמצעות צנתור נקי לסירוגין (CIC), אם איןם יכולים לקבל טיפול הולם באמצעות תכשירים אנט-קולינרגיים פומיים (דרך הפה) בשל היעדר ייעילות ו/או תופעות לוואי בלתי נסבלות.

קבוצה רפואיית: תרופות לטיפול בתכיפות מתן שtan ובאי שליטה במתן שtan
התרופה פועלת באמצעות הריפית השירותים של שלפוחית השירות ובכך מפסיקת התכווציות שרירים פתאומיות (עוויות). הדבר עוזר בשיליטה בהפרשת שtan.

תמייסת ויאק מיועדת להזרקה ישירות לטור שלפוחית השtan (מתן לטור שלפוחית השtan) דרך צינורית המכונה צנתר.

הטיפול בויאק חייב להתחיל ולהינתן תחת השגחת רופא מומחה בטיפול בפעולות נירולוגיות.
שלפוחית השtan בשל הפרעות נירולוגיות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיס (אלרגי) לאוקסיבוטיניין הידרוקולוריד (החומר הפעיל) או לכל אחד מהמרכיבים הננספים של תרופה זו (ראה פרק 6).
- אתה סובל ממחלת אוטואימונית נדירה המכונה מיאסטניה גרביס, אשר גורמת לשירי הגוף להיחלש ולהתעיף בקלות.
- אתה סובל מהפרעה חמורה בקיבה או במעי, כגון קוליטיס כיבית חמורה או מגה-קולון רעיל (הרחבת מעי חריפה).
- אתה סובל מגלאקומה (לחץ תוך-עיני מוגבר, לעתים פתאומי ומכאיב, מלוויה בטשטוש ראייה או באובדן ראייה). אם אתה בעל היסטוריה משפחתית של גלאקומה, דוחה עליך לרופא.
- אתה חווה כאבים במtan שtan או ריקון חלקי של שלפוחית השtan במהלך מתן שtan (אצירת שtan).
- אתה חווה תכיפות במtan שtan בלילה הנגרמת על ידי מחלת לב או כלויות.
- אתה מקבל טיפול בחמצן.

ازהרונות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בווסוקס ספר לרופא אם:

- אתה סובל מזיהום בדרכי השתן. יתכן שהרופא יצטרך לרשום לך תרופות אנטיביוטיות מסוימות
- גילך מעל 65, מאחר שאתה עלול להיות רגש יותר לווסוקס
- אתה נוטל ניטרטים במשך תקופה מהנחת מתחת ללשון לטיפול באכב בחזה)
- אתה סובל מחסימה במיצרי העיכול, מאחר לווסוקס עלול להאט את תנועות הקיבה והמעיים
- אתה סובל מקרע בקיבה (בקע סרעפטלי) או מצרבת
- אתה סובל מהפרעה עצבית המכונה נוירופתיה אוטונומית, אשר משפיעה על תפקוד הגוף בלתי רצוניים, לרבות קצב הלב, לחץ דם, הדעה ועיכול
- אתה סובל מבעיות בזיכרון, בשפה או בכישורי חישיבה
- אתה סובל מבעיות יתר של בלוטת התannis, אשר יכול לגרום לתיאבן מוגבר, לירידה במשקל או להזעה
- אתה סובל מהיצרות בכל הדם המספקים דם וחמצן לב
- אתה סובל מבעיות לב, אשר יכולות לגרום לקוצר נשימה או לנפיחות בקרטולאים
- אתה סובל מכאב לב בלתי סדייר /או מהיר
- אתה סובל מלחץ דם גבוה
- אתה סובל מבלוטת ערמנונית מוגדלת

ווסוקס עלול להפחית את כמות הרוק, דבר המוביל לריקון השן(עששת), למחלות חניכיים או לזיהום פטריטי בפה (פטרת הפה).

אוקסיבוטיניין יכול לגרום לסוג מסוים של גלאוקומה. פנה לרופא מיד אם אתה חווה טשטוש ראייה, אובדן ראייה או כאב כלשהו בעין. ראה גם סעיף 'בדיקות ומעקב'.

יש לנווג בחירות בעת שימוש בווסוקס במזג אויר חם או אם יש לך חום. לדוגמה, עליך להתרחק משמש ולהימנע מפעולות ספורטיביות בשעות הצהרים החמות. הסיבה לכך היא שווסוקס מפחית את כמות הזיעה של המטופל. הדבר עלול להוביל לתשישות כתוצאה מחום ולמכת חום.

ילדים וمتבגרים

ווסוקס אינו מומלץ לשימוש ילדים מתחת לגיל 6.יעילות ובטיחות השימוש ילדים מתחת לגיל 6 לא נבדקה. ראה גם 'תופעות לוואי' נספנות ילדים ובמתבגרים' בסעיף 4.

בדיקות ומעקב

עליך לעבור בבדיקות תקופתיות של חדות ראייה ולחץ תוך-עיני במהלך הטיפול.

אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לך תרופה אחרת, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרופק.

שימוש בווסוקס בו זמן קצר עם תרופות אחרות הגורמות לתופעות לוואי דומות כגון יובש בפה, עצירות וישנוניות עלול להגבר את שכיחותן וחומרתן של תופעות לוואי אלו.

החומר הפעיל בווסוקס הוא אוקסיבוטיניין הידרוכולוריד, אשר עלול להאט את מערכת העיכול ובכך להשפיע על הספיגת תרופה פומיות אחרות; כמו כן, שימוש בתרופה זו יחד עם תרופות אחרות עלול להגבר את ההשפעה של אוקסיבוטיניין הידרוכולוריד.

במיוחד דוחה לרופא אם אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות:

- ביסופסונטים (משמשים לטיפול באוטואפורוזיס) ותרופות אחרות אשר יכולות לגרום לדלקת בושט או להחמיר אותה
- קטוקונאנזול, איטראקונאנזול או פולקונאנזול (משמשים לטיפול בziehominums פטריטיים)
- אריתרומיצין, תכשיר אנטיביוטי מקבוצת מקרולידיים (משמש לטיפול בziehominums חידקים)
- ביפורדין, לבודופא או אמאנטאנדין (משמשים לטיפול במחלת פרקינסן)
- אנט-היסטמינים (משמשים לטיפול באלהריגיות כגון קדחת השחתה)
- פנטיאצין, בוטירופונינים או קלוזאפין (משמשים לטיפול במחלת נפש)
- נוגדי דיכאון טריציקליים (משמשים לטיפול בדיכאון)

- דיפירידאמול (משמש לטיפול בבעיות בקרישת דם)
- כינידין (משמש לטיפול בהפרעות בקצב הלב)
- אטרופין ותרופות אנטי-קולינרגיות אחרות (משמשות לטיפול בהפרעות במערכת העיכול כגון תסמנות המעי הרגיז)
- מעכבי פולין אסטראץ (נגד דמנציה או מחלות שרירים מסוימות)

תרופות לטיפול בתעוקת חזה (לחץ בחזה בשל ירידת בזרימת הדם ללב) האמורות להתמכסו מתחת לשון עשוות להתמכסו במידה מופחתת מתחת לשון בשל יושב בפה. לפיקר, מומלץ להחלה (להרטיב) את הפה טרם נטילת תרופות אלו.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול
וסוקס עלול לגרום לשינויים או לטשטוש ראייה. ישנות עלולה להיות מוגברת על ידי צריכת אלכוהול.

הירין והנקה
אם את בהירין או מניקה, חושבת שאט עשויה להיות בהירין או מתכוונת להרהור, פני לרופא ליעוץ טרם השימוש בתרופה זו.

הירין
אין להשתמש בווסוקס אם את בהירין, אלא אם כן הרופא הורה לך על כך.

הנקה
לא ידוע האם ווסוקס מופרש בחלב על כן השימוש בווסוקס במהלך הנקה אינם מומלץ.

נהיגה ושימוש במכוונות
וסוקס עלול לגרום לשינויים או לטשטוש ראייה. נדרשת זהירות מיוחדת בעת נהיגה או שימוש במכוונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה ווסוקס מכל נתרן
תרופה זו מכילה 3.56 מ"ג נתרן (המרכיב העיקרי במלח בישול/שולחן) בכל מ"ל. כמות זו שווה ערף ל-0.18% מצרכית הנתרן היומיית המומלצת עבור מבוגר.

3. כיצד להשתמש בווסוקס?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא אם הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן השימוש בתרופה.

מינון
הרופא יחשב את הכמות הנכונה של ווסוקס הדרישה לטיפול בפעולות יתר של שלפוחית השטן. אין לשנות את המינון על דעת עצמה.

במהלך תחילת הטיפול, הרופא יבדוק את התפקוד של שלפוחית השטן באופן סדר ויתאים את המינון לפי הצורך.

מתבגרים (בני 12 ומעלה), מבוגרים וקשישים (מעל גיל 65)
המינון ההתחלתי המומלץ הוא בדרך כלל 10 מ"ל ליום.

ילדים (בני 6 – 12)
המינון ההתחלתי המומלץ הוא בדרך כלל 0.1 מ"ג/ק"ג משקל גופו בובוקר ובערב.
אין לעבור על המנה המומלצת.

אם אתה סובל מבעיות בכבד או בצליות
אני דווח לרופא אם אתה סובל מבעיות בכבד או בצליות.

אופן המtan

הרופא ירשום לר' וסוקס רק אם אתה או בני המשפחה/המטפל שלך מכירם את ההליך המכונה "צנתור נקי לסירוגין (CIC)". זהה פעללה המתבצעת לפחות 6 פעמים ביום כדי לשיע בריון השtan משלפוחית השtan באמצעות צנתר.

משמעות המונח CIC היא צנתור נקי לסירוגין:
צנתור: שימוש בצנתר, סוג של צינורית דקה, לניקוז השtan משלפוחית השtan
נקי: נקי מבדיקות כל האפשר
לסירוגין: מתבצע לפי לוח זמינים סדיר פעמיים רבות במהלך היום

הרופא ידריך אותך / או את בני המשפחה/המטפל שלך לגבי הליך הצנתור הנקי לסירוגין (CIC) והליך המתן של וסוקס.

ההלך הוא כדלהלן:

מזרק מוקן לשימוש העשי מפוליפרופילן (לחיבור ישיר למערכות צנתר סטנדרטיות)

1. חטא את ידיך כמצין על אריזת חומר החיטוי. פתח את אריזת המזרק המוקן לשימוש בנקודה המסומנת למטרה זו.
2. הוציא את המזרק המוקן לשימוש מהאריזה. הסר את המכסה על ידי סיבוב קל.
3. עצה: אם נרשמה לךמנה הנמוכה מהכמות שבמזרק, סלק מהמזרק את הקומות המיותרת טרם הצלפה (יש לפנות תכשיר רפואי שנוטר ללא שימוש או חומר פסולת בהתאם להנחיות הוצאות הרפואית. למען הסביבה, אין לפנות תרופות לביבו).
4. כעת החזר את המזרק לאrizתו מבלי לגעת בקצתה המזרק.
5. חטא את ידיך והתחילה בצנתר.
6. רוקן את שלפוחית השtan לחלוtin דרך הצנתר וודא שהצנתר עדין נמצא בשלפוחית השtan בטרם תחילת הצלפה.
7. הוציא את המזרק המוקן לשימוש מהאריזה שוב וחבר אותו לצנתר.
8. הצלף את תכלתת המזרק המוקן לשימוש לתוך שלפוחית השtan באמצעות לחיצה על בוכנת המזרק. הסר את המזרק המוקן לשימוש ייחד עם הצנתר לצורך פינוי.
9. יש להשליך תכשיר רפואי שנוטר ללא שימוש או חומר פסולת בהתאם להנחיות הוצאות הרפואית. למען הסביבה, אין להשליך תרופות לביבו.

התמיסה שהוזקרה נותרת בשלפוחית השtan עד לצנתור הבא.
כל מזרק מיועד לשימוש חד-פעמי בלבד. יש להשליך את הצנתר השופכתי וכל תכשיר רפואי שנוטר ללא שימוש.

אם השתמשה בכמות גבוהה מדי של וסוקס

אם בטיעות הצלפת מנה גבוה יותר מהמנה שנרשמה לך, רוקן מיד את שלפוחית השtan דרך הצנתר.

מיןין יתר יכול לגרום לתסמינים כגון אי שקט, סחרחות, הפרעות בדיבור ובראייה, חולשת שרירים או קצב לב מהיר יותר.

אם אתה חוווה אחד או יותר מתרומות אליה, פנה לרופא או לבית החולים הקרוב ביותר בהקדם האפשרי.

אם שכחת להשתמש בווסוקס

אם שכחת להשתמש במנה במועד הרגיל, השתמש במנה הרגילה בשילוב עם הליך הצנתור הבא. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמזה.

אין להשתמש במנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.

אם יש לך ספק, עליך תמיד להתיעץ עם הרופא.

יש להתميد בטיפול כפי שהוא ממלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתroxפה ללא התיעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק להשתמש בוויסוקס

אם אתה מפסיק להשתמש בויסוקס, התס敏ינים והמצב של פעילות יתר של שלפוחית השטן עלולים לחזור או להחמיר. אם אתה שוקל הפסיקת טיפול, עילץ תמיד להתייעץ עם הרופא.

אין ליטול תroxפה בחושך! בדוק התוויות והמנה **כל פעם** שאתה לוקח תroxפה. הרכב משקפיים אם אתה **זקוק** להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתroxפה, **היוועץ** ברופא או ברוקח.

4. תופעות ללואו!

כמו בכל תroxפה, השימוש בויסוקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשיימת תופעות הלואו. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

תופעות הלואו השכיחות ביותר אופייניות לroxפה מסווג זה וכוללות יובש בפה, ישוניות ועיצרות.

תופעות הלואו הבאות דוחו בהקשר לשימוש באוקסיבוטיניין הידרוכולוריד, אם כי לא כולן דוחו עבור מתן לתוך שלפוחית השטן. שכיחותן של תופעות לוואי אלו אינה ידועה (השכיחות אינה ניתנת להערכתה מהנתונים הקיימים):

הפסיק את השימוש בויסוקס / או פנה מיד לרופא אם:

- אתה חוות תגובה אלרגית (חמורה) הגורמת לנפיחות בפנים או בגרון (אנגיגיאדמה)*
- אתה מרגיש ירידת בהצעה המובילת לחימום יתר בסביבה חמה (מכת חום)*
- אתה חוות כאב פתאומי בעיניים עם טשטוש ראייה או אובדן ראייה (גלאוקומה)*
- אתה חוות ערפלן הכרה או בלבול
- אתה חוות איבוד הכרה
- אתה חוות תחושת סחרורת או "סחרור"
- אתה חוות קצב לב בלתי סדרי (הפרעת קצב)*
- אתה חוות פרכוסים (התקפים)

דוח לroxפה או לרוקח אם אחת מתופעות הלואו הבאות מחמירה

כליות

- זיהום בדרכי השטן
- הופעת חידקים בשטן ללא גריםת תס敏ינים
- צורך דחוף במתן שטן (דחיפות במתן שטן)
- חלבון בשטן
- דם בשטן
- כאב בעת הזרקת (הזרפת) התמיישה לתוך שלפוחית השטן
- הפרעה במתן שטן או קושי להתחילה לתוך שטן

מחילות נפש

- ראייה או שמיעה של דברים שאינם קיימים (הזיות)
- הפרעות קוגניטיביות
- אי שקט ותנוועתיות יתר (היפראקטיביות)
- עצבנות*
- קשיי שינה
- אגרופובייה (כגון פחד לצאת מהבית, להיכנס לחניות, לשחות בתוך קהלה ובמקומות ציבוריים)
- אי יכולת להתרכך
- חרדה*
- סיטוי לילה*
- תחשות חדשנות יתר וחוסר אמון באחרים (פרנונייה)*

- תסמיini דיכאון*
- פיתוח תלות באוקסיבוטין (במטופלים בעלי היסטוריה של שימוש לרעה בסמים או בחומרים כלשהם)*

הכרה

- חוסר התמצאות
- תשישות
- תחששות עייפות
- ישוניות

עיניים

- עיניים יבשות
- תחששה חריגה בעיניים
- אי יכולת של העין לשנות מיקוד מרחק לעצמים קרובים באופן אוטומטי, תופעה אשר יכולה לגרום לראייה מוטשטשת, לראייה כפולה, לעיניים עייפות
- טשטוש ראייה*
- לחץ תור-עיני מגבר*

מחלוות לב וכלי דם

- קצב לב סדייר אך מהיר באופן חריג (טכיקרדיה על-חדרית)
- לחץ דם נמוך

עור

- סומק בפנים
- פריחה
- ירידה בהזעה
- הזעת לילה
- פריחה גבשושית המלווה בגרד (סרפדת)*
- יובש עור*
- עור רגish יותר לשימוש (רגישות לאור)*

בעיות עיכול

- עצירות
- יובש בפה
- אי נוחות בבטן
- כאב בבטן התחתונה או העליונה
- בחילות
- קשיי עיכול
- שלשול
- הקאות*
- חוסר תיאבון (אנורקסיה)*
- ירידה בתיאבון*
- קושי בבליעה (דיספגיה)*
- צרבת*
- נפיחות חריגה יחד עם כאב ובחילה או הקאה (חסימה מדומה)*
- שינוי בחוש הטעם
- צימאון

הפרעות כלויות

- אי נוחות בחזה
- תחששות קור
- כאב ראש
- מחלת מערכת העצבים (תסמונת אנטי-קולינרגית)

- רמה גבוהה של ההורמן פרולקטין בدم. נשים עלולות לחוות שיבושים במהלך הווסת התקין או זרימה ספונטנית של חלב אם. גברים עלולים לחוות הפרעות בחשק המיני או בזכפה וכן האגדלה של רקמת השד.

* תופעות לוואי אלו דוחו עבור תרופות אחרות מסוג. עם זאת, לא ידוע האם תופעות לוואי אלו תתרחשנה גם בעת שימוש בויסוקס שנרשם להן.

מטופל אחד חוות חסור חמוץ במהלך טיפול ביתי בחמצן (ראה פרק 2 סעיף "אין להשתמש בויסוקס").

תופעות לוואי נוספות בילדים ובתבגרים
ילדים עלולים להיות רגישים יותר להשפעות של תרופה זו, במיוחד לתופעות לוואי במערכת העצבים המרכזית ולתופעות לוואי פסיקיאטריות.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי חמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלוון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) (<https://sideeffects.health.gov.il>) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

5. איך לאחסן את התרופה?

מנוע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטוויח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Date of exp) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- -30°C .
שימוש במתן חד פעמי בלבד.
יש להשליך מיד כל תמיישה שנותרה ללא שימוש. אם לא נעשה שימוש מיידי בתמיישה, משך האחסון ותנאי האחסון טרם המתן הם באחריות המשתמש.

אין להשליך את התרופה לשפכים או לפסולת הביתיית. התיעץ עם הרוקח כיצד יש להיפטר מהתרופה (תרופות שאין בשימוש עוד). זה יסייע לשימירה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
sodium chloride, hydrochloric acid, water for injections

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:
תמיישה צוללה וחסרת צבע בתוך מזרק מוקן לשימוש המכיל 10 מ"ל תמיישה והעשו מפוליפרופילן עם בוכנת גומי סינטטי שעשו מברומובוטיל ומכסה לקצתה.

אריזה המכילה 12 או 100 מזרקים מוקנים לשימוש לחיבור ישיר למערכותentral סטנדרטיות.
יתכן שלא כל גודלי האריזות משווים.

בעל הרישום וכתובתו: פרופארם בע"מ, ת.ד. 4046, בן גוריון 23, זיכרון יעקב.

שם היצרן וכתובתו:
Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlin
Germany

אושר בנובמבר 2023.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 174-61-37610-99-99
לשם הפשטות ולהקלת הקראיה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.