

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אטאזנביר טבע 150 מ"ג

כמוסות

הרכב:

כל כמוסה מכילה:

אטאזנביר (כסולפט) 150 מ"ג Atazanavir (as sulfate) 150 mg

אטאזנביר טבע 200 מ"ג

כמוסות

הרכב:

כל כמוסה מכילה:

אטאזנביר (כסולפט) 200 מ"ג Atazanavir (as sulfate) 200 mg

אטאזנביר טבע 300 מ"ג

כמוסות

הרכב:

כל כמוסה מכילה:

אטאזנביר (כסולפט) 300 מ"ג Atazanavir (as sulfate) 300 mg

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופה זו מיועדת למבוגרים ולילדים מעל גיל 6 שנים. תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות מתחת לגיל שלושה חודשים.

1. למה מיועדת התרופה?

אטאזנביר טבע מיועדת לטיפול בנגיף ה-HIV-1 (Human Immunodeficiency Virus type 1) - נגיף הכשל החיסוני האנושי מסוג 1) הניתנת בשילוב עם תרופות אנטי-רטרוויראליות אחרות המיועדות לטיפול ב-HIV-1 (Antiretroviral agents) במבוגרים ובילדים מעל גיל 6 שנים. אטאזנביר טבע איננה מיועדת לתינוקות מתחת לגיל שלושה חודשים.

קבוצה תרפויטית: מעכבי פרוטאזות.

HIV-1 הינו הנגיף אשר גורם למחלת האיידס (תסמונת הכשל החיסוני הנרכש).

בשימוש עם תרופות אנטי-רטרוויראליות אחרות לטיפול בזיהום ה-HIV-1 - אטאזנביר טבע עשויה לעזור בהורדת כמות נגיף ה-HIV-1 - בדם (נקראת גם עומס נגיפי) ובהעלאת מספר תאי הדם מסוג CD4+ (T) אשר עוזרים להילחם בזיהומים אחרים.

הורדת כמות נגיף ה-HIV 1 - בדם והעלאת מספר תאי הדם מסוג CD4+ (T) עשויות לעזור לשפר את המערכת החיסונית שלך, ויכולות להוריד את הסיכון שלך לתמותה או לזיהומים העלולים להופיע כשהמערכת החיסונית שלך חלשה (זיהומים אופורטוניסטיים).

אטאזנביר טבע אינה מרפאת זיהום HIV-1 ואינה מרפאת איידס. יש להקפיד ליטול את התרופות ל-HIV-1 על מנת לשלוט בזיהום ה-HIV-1 ולהפחית מחלות אחרות הקשורות ל-HIV-1.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאטאזנביר סולפט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
 - אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות. נטילת אטאזנביר טבע עם תרופות אלו עלול להשפיע על אופן פעילותה של התרופה. אטאזנביר טבע עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, מסכנות חיים או למוות בשימוש עם התרופות הבאות:
 - אלפוזוסין
 - אמיודארון (בשילוב עם ריטונאביר), קווינידין (בשילוב עם ריטונאביר)
 - קארבאמאזפין, פניטואין, פנוברביטל
 - ריפאמפין
 - אירינוטקאן, אפלוטאמיד, אנקוראפניב, איבוסידניב
 - לורסידון (בשילוב עם ריטונאביר), פימוזיד
 - טריאזולם, מידאזולם (במתן דרך הפה)
 - תרופות ממשפחת הארגוט הכוללות: דיהידרוארגוטאמין, ארגוטאמין, ארגונובין, מתילארגונובין.
 - ציסאפריד
 - אלבסביר/גרזופרבר, גלצרבר/פיברנטסביר
 - צמח ההיפריקום פרפוראטום (St. John's wort)
 - לובאסטאטין, סימבסטטין, לומיטאפיד
 - סילדנאפיל לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי
 - אינדינאביר
 - נביראפין
- בעיות חמורות עלולות להופיע אם אתה או ילדך נוטל אחת מהתרופות הרשומות למעלה עם אטאזנביר טבע.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול באטאזנביר טבע ספר לרופא אם:

- אתה סובל מבעיות בלב.
- אתה סובל מליקוי בתפקוד הכבד כולל זיהום בנגיף ההפטיטיס B או C.
- אתה סובל מבעיות בכליות.
- אתה עובר טיפול דיאליזה.
- אתה סובל מסוכרת.
- אתה סובל מהמופיליה.
- את בהיריון או מתכננת היריון.
- במהלך ההיריון עליך לקחת אטאזנביר טבע עם ריטונאביר.
- **אמצעי מניעה הורמונאליים כגון זריקות, התקן תוך רחמי או טבעת וגינלית, מדבקה עורית למניעת היריון וגלולות למניעת היריון עלולים לא לפעול במהלך הטיפול עם אטאזנביר טבע.** יש להיוועץ ברופא באשר לאמצעי מניעה שניתן להשתמש בהם במהלך הטיפול באטאזנביר טבע.
- **לאחר שתינוקד ייולד, יש לספר לרופא אם גוון עורו או החלק הלבן של עיניו הופך לצהוב.**
- את מניקה או מתכננת להניק. אל תניקי במהלך לקיחת התרופה.
 - את לא צריכה להניק אם יש לך נגיף ה-HIV-1 בשל הסיכון להעברת נגיף ה-HIV-1 לתינוקך.
 - אטאזנביר טבע עלולה לעבור לחלב האם.
 - היוועצי ברופא לגבי הדרך הטובה ביותר להאכיל את תינוקך.

בדיקות ומעקב:

- הרופא שלך יבצע לך בדיקות דם על מנת לבדוק את תפקודי הכבד טרם נטילת אטאזנביר טבע ובמהלך הטיפול.
- הרופא שלך יבצע לך בדיקות דם ושתן על מנת לבדוק את תפקודי הכליות, טרם נטילת אטאזנביר טבע ובמהלך הטיפול.

ילדים ומתבגרים:

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 6 שנים.
תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות מתחת לגיל שלושה חודשים.

תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.

שמור את רשימת התרופות אותן הינך נוטל על מנת להציגה לרופא המטפל ולרוקח. היוועץ ברופא או ברוקח בנוגע לרשימת התרופות אשר מגיבות עם אטאזנביר טבע. אין ליטול תרופה חדשה ללא התייעצות מוקדמת עם הרופא המטפל שלך. הרופא המטפל יכול ליעץ לך אם נטילת תרופות אחרות יחד עם נטילת אטאזנביר טבע הינה בטוחה.

ייתכן שהשימוש בתרופות הבאות יחד עם אטאזנביר טבע (עם או בלי ריטונאביר) ידרוש שינוי במינון או במשטר המינון של אטאזנביר טבע או של התרופות המופיעות מטה. יש להיוועץ ברופא המטפל אם אתה נוטל אחת או יותר מהתרופות הבאות:

- תרופות לטיפול ב-HIV כגון: דיאנוזין, טנופוביר דיזופרוקסיל פומארט, אפאבירנו, נביראפין, סאקווינאביר, אינדינאביר, ריטונאביר ועוד.
- תרופות לטיפול בדלקת כבד מסוג C: אלבסביר/גרזופרבר, גלצרבר/פיברנטסביר, סופוסבוביר/ולפאטאסביר/ווקסילאפרבר.
- אלפוזוסין.
- תרופות סותרות חומצה.
- תרופות לטיפול בהפרעות קצב לב: אמיודרון, קווינידין, בפרידיל, לידוקאין (במתן סיסטמי).
- נוגד קרישה: וארפרין, בטריקסאבן, דביגטראן, אדוקסאבן, ריברוקסבן, אפיקסבן.
- תרופות לטיפול בדיכאון כגון: משפחת הטריציקליים, טראזודון.
- תרופות לטיפול באפילפסיה כגון: קארבאמזפין, פניטואין, פנוברביטאל, למוטריגין.
- אנטי פטרייתים כגון: קטוקונאזול, איטראקונאזול, ווריקונאזול.
- למניעה או טיפול בשיגדון (Gout) - קולכיצין.
- אנטיביוטיקה: ריפאבוטין, ריפאמפין.
- תרופות לטיפול בסרטן: אירינוטקאן, אפלוטמיד, איווסידיניב, אנקורפניב.
- נוגדי טסיות דם: טיקגורלור, קלופידוגרל.
- אנטיפסיכוטי: פימוזיד, קוטיאפין ולורסידון.
- בנזודיאזפינים: מידאזולם (במתן אוראלי ופרנטרלי) וטריאזולם.
- חוסמי תעלות סידן כגון: דילטיאזם, פלודיפין, ניפדיפין, ניקרדיפין, וראפאמיל.
- קורטיקוסטרואידים.
- בוסנטן - לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי.
- תרופות ממשפחת הארגוט הכוללות: דיהידרוארגוטאמין, ארגוטאמין, ארגונובין, מתילארגונובין.
- ציסאפריד - תרופה המשפיעה על תנועתיות מערכת העיכול.
- אלגוליקס - תרופה לטיפול בכאב.
- צמח ההיפריקום פרפוראטום (St. John's wort).
- פוסטאמאטיניב.
- תרופות להפחתת כולסטרול: לובאסטאטין, סימבאסטטין, אטורבסטטין, רוזובסטטין ולומיטאפיד.
- תרופות לצרבת והגנה על הקיבה, כמו למשל פאמוטידין.
- תרופות למניעת היריון (גלולות) - אתיניל אסטרדיל, נורגסטימט או נוראתינדרון.
- תרופות מדכאות מערכת חיסון - ציקלוספורין, סירולימוס, טאקרולימוס.
- סאלמטרול (במשאף).
- פלוטיקזון - סטרואיד בתרסיס לאף או במשאף.

- אנטיביוטיקה ממשפחת המקרולידיים מסוג קלריתרומיצין.
- משככי כאבים אופיואידיים: בופרנורפין.
- תרופות לטיפול ביתר לחץ דם עורקי ריאתי או לטיפול באין אונות- סילדנאפיל, טאדאלאפיל, ורדנאפיל.
- אומפרזול- מעכבת משאבות פרוטונים.

שימוש בתרופה ומזון:

יש ליטול את התרופה בשלמותה עם מזון. אין מידע לגבי פתיחת הכמוסות ופיזור תוכן.

היריון והנקה:

- לפני הטיפול באטאזנביר טבע ספרי לרופא אם את בהיריון או מתכננת להרות. היוועצי ברופא המטפל לגבי נטילת אטאזנביר טבע במהלך ההיריון או אם הינך מתכננת להיכנס להיריון.
- אמצעי מניעה הורמונאליים כגון זריקות, התקן תוך רחמי או טבעת וגינלית, מדבקה עורית למניעת היריון וגלולות למניעת היריון עלולים לא לפעול במהלך הטיפול עם אטאזנביר טבע. יש להיוועץ ברופא באשר לגבי אמצעי המניעה בהם ניתן להשתמש במהלך הטיפול בתכשיר.
- לאחר שתינוקך ייוולד, יש לספר לרופא אם גוון עורו או החלק הלבן של עיניו הופך לצהוב.

אין להניק אם הינך נוטלת אטאזנביר טבע בשל הסיכון להעברת נגיף ה-1 HIV לתינוקך. אטאזנביר טבע עשויה לעבור לתינוק דרך חלב האם. היוועצי ברופא לגבי הדרך הטובה ביותר להאכיל את תינוקך.

נהיגה ושימוש במכוונות:

התרופה עלולה לגרום לסחרחורות, במקרה כזה יש לפנות לרופא שלך מיד.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

אטאזנביר טבע מכילה לקטוז. אם נאמר לך על-ידי הרופא שיש לך אי-סבילות (רגישות) לסוכרים מסוימים, היוועץ ברופא שלך לפני נטילת תרופה זו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

אטאזנביר טבע חייבת להילקח בשילוב עם תרופות אנטי-רטרוויראליות אחרות. יש ליטול את התרופה במועד קבוע כל יום כפי שהורה לך הרופא. יש ליטול את התרופה בהתאם למינון ולפרק הזמן שנקבע על ידי הרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש ליטול את התרופה בשלמותה עם מזון. אין מידע לגבי פתיחת הכמוסות ופיזור תוכן.

אין להפסיק את הטיפול או לשנות את המינון ללא הנחייה מהרופא המטפל. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

חשוב להיות במסגרת טיפולית של הרופא המטפל במשך תקופת הטיפול באטאזנביר טבע. וודא כי יש ברשותך כמות מספיקה של אטאזנביר טבע על מנת שלא תישאר ללא התרופה. אם תפסיק ליטול את התרופה, אפילו לזמן קצר, כמות נגיף ה-1 HIV בדם עלולה לעלות. הנגיף עלול לרכוש עמידות לאטאזנביר טבע וכתוצאה יהיה קשה יותר לטפל בו.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת וליטול את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול מנה כפולה במקום המנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באטאזנביר טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

אטאזנביר טבע עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות. יש לפנות לרופא במקרים הבאים:

- **שינויים בקצב הלב.** פנה לרופא מייד אם אתה מרגיש סחרחורת. תופעה זו עלולה להעיד על בעיה בלב.
- **פריחה עורית.** פריחה בעור שכיחה בחולים הנוטלים אטאזנביר טבע, אך יכולה לעיתים להיות חמורה. פריחה יכולה להתלוות לתסמינים רציניים אחרים ועלולה להיות חמורה. אם אתה מפתח פריחה חמורה או פריחה עם אחד מהתסמינים הבאים, הפסק את הטיפול באטאזנביר טבע ופנה מייד! לרופא או לבית החולים הקרוב:
 - הרגשת חולי או תסמינים דמויי שפעת
 - חום
 - כאבי שרירים או מפרקים
 - עיניים אדומות או מודלקות (דלקת הלחמית)
 - שלפוחיות
 - פצעים בפה
 - התנפחות של הפנים
 - גוש כואב, חם או אדום מתחת לעור
- **בעיות בכבד.** אם הינך סובל מבעיות בכבד כולל דלקת כבד מסוג B או C, הן עלולות להחמיר במהלך הטיפול באטאזנביר טבע. הרופא שלך יבצע לך בדיקות דם על מנת לבדוק את תפקודי הכבד טרם נטילת אטאזנביר טבע ובמהלך הטיפול. ספר לרופא מייד אם הינך מפתח אחד מהתסמינים הבאים:
 - שתן כהה (בצבע תה)
 - גוון עורך או החלק הלבן של עיניך הופך לצהוב
 - צואה בהירה
 - בחילה
 - גרד
 - כאבים באזור הקיבה
- **מחלת כליות כרונית.** אטאזנביר טבע עלולה להשפיע על תפקוד הכליות. הרופא שלך יבצע לך בדיקות דם ושתן על מנת לבדוק את תפקודי הכליות, טרם נטילת אטאזנביר טבע ובמהלך הטיפול. עליך להרבות בשתייה בזמן הטיפול באטאזנביר טבע.
- **אבנים בכליות** דווחו בחלק מהמטופלים באטאזנביר טבע. בחלק מהמקרים המטופל אושפז. דווח לרופא באופן מיידי אם אתה חווה תסמינים של אבנים בכליות העלולים לכלול: כאב בגב התחתון או באזור הבטן התחתונה, דם בשתן או כאב בזמן מתן שתן.
- **אבנים בכיס המרה** דווחו בחלק מהמטופלים באטאזנביר טבע. בחלק מהמקרים המטופל אושפז. דווח לרופא באופן מיידי אם אתה חווה תסמינים של בעיות בכיס המרה העלולים לכלול: כאב בחלק הימני או האמצעי עליון של הבטן, חום, בחילות והקאות, הצהבת העור או החלק הלבן של העין.
- **גוון צהוב בעור או בחלק הלבן של העיניים** הינה תופעה שכיחה בחולים הנוטלים אטאזנביר טבע שלעיתים יכולה להוות תסמין של בעיה חמורה. תופעה זו יכולה להיגרם כתוצאה מעלייה ברמת הבילירובין בדם (בילירובין מיוצר על ידי הכבד). יש לפנות לרופא באופן מיידי במידה והעור שלך או החלק הלבן של העיניים מצהיבים.
- **סוכרת או רמות סוכר גבוהות (היפרגליקמיה)** דווחו או החמירו בחלק מהמטופלים הנוטלים תרופות ממשפחת מעכבי הפרוטאז כגון אטאזנביר טבע. חלק מהמטופלים נדרשו להתחיל ליטול תרופות לטיפול בסוכרת או לערוך שינוי במינון הטיפול התרופתי בסוכרת. ספר לרופא שלך אם חלה עלייה בתחושת הצמא או עלייה בתכיפות מתן שתן בזמן הטיפול באטאזנביר טבע.
- **שינויים במערכת האימונית (Immune Reconstitution Syndrome)** עלולים להתפתח בחולים שהחלו ליטול תרופות לטיפול ב - HIV-1. מערכת החיסון שלך עשויה להתחזק ולהתחיל להילחם

בזיהומים רדומים קודמים בגוף. ספר לרופא אם הינך חש בתסמינים חדשים לאחר תחילת נטילת אטאזנביר טבע.

- **שינויים בשומן הגוף** יכולים להתרחש במטופלים הנוטלים תרופות לטיפול ב HIV-1. שינויים אלה יכולים לכלול עליה בכמות השומן בחלק העליון של הגב והצוואר, בחזה ובהיקף הגוף. ייתכן שתחושה איבוד שומן מהרגליים, הזרועות והפנים. הגורם המדויק וההשפעה הבריאותית ארוכת הטווח של מצבים אלה אינם ידועים.
- **עליה בדימומים אצל חולי המופיליה** דווחה במהלך הטיפול בתרופות ממשפחת מעכבי פרוטאזות כגון אטאזנביר טבע.

תופעות הלוואי הכי שכיחות בזמן הטיפול באטאזנביר טבע כוללות:

- בחילה
- כאב ראש
- כאב באזור הבטן
- הקאות
- קשיי שינה
- חוסר תחושה, עקצוץ, תחושת שריפה בידיים או בכפות הרגליים
- סחרחורת
- כאבי שרירים
- שלשול
- דיכאון
- חום

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

זוהי איננה רשימה מלאה של תופעות הלוואי של אטאזנביר טבע. למידע נוסף, יש לפנות לרופא המטפל או לרוקח.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות, ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן את התרופה מתחת ל 25°C

אטאזנביר טבע 150 ו- 200 מ"ג:

חיי מדף לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק – 3 חודשים, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

אטאזנביר טבע 300 מ"ג:

חיי מדף לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק – חודשיים, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

אין להשליך תרופות לביוב או לפסולת הביתית. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם :

תכולת הכמוסה:

Lactose monohydrate, crospovidone, magnesium stearate.

גוף הכמוסה :

Gelatin, titanium dioxide, Indigotine (FD&C Blue No. 2).

גוף הכמוסה של 300 מ"ג מכיל בנוסף :

Red iron oxide, and yellow iron oxide.

דיו להדפסה :

Shellac glaze, iron oxide black, n-butyl alcohol, purified water, propylene glycol, dehydrated ethanol, isopropyl alcohol, ammonia solution.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה :

אטאזנביר טבע 150 מ"ג :

כמוסה אטומה. ראש הכמוסה בצבע כחול כהה. גוף הכמוסה בצבע כחול בהיר. על הכמוסה מופיע הסימון 150 בצבע שחור.

אריזת הבקבוק/בליסטר מכילה 60 כמוסות.

אטאזנביר טבע 200 מ"ג :

כמוסה אטומה. ראש הכמוסה בצבע כחול. גוף הכמוסה בצבע כחול. על הכמוסה מופיע הסימון 200 בצבע שחור.

אריזת הבקבוק/בליסטר מכילה 60 כמוסות.

אטאזנביר טבע 300 מ"ג :

כמוסה אטומה. ראש הכמוסה בצבע אדום. גוף הכמוסה בצבע כחול. על הכמוסה מופיע הסימון 300 בצבע שחור.

אריזת הבקבוק מכילה 30 כמוסות.

אריזת בליסטר מכילה 30, 60 או 90 כמוסות.

ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.

שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו :

טבע ישראל בע"מ

רח' דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

מספרי רישום התרופות בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות :

אטאזנביר טבע 150 מ"ג : 160.95.35017

אטאזנביר טבע 200 מ"ג : 160.96.35018

אטאזנביר טבע 300 מ"ג : 160.97.35019

העלון נערך בדצמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.