

- 5. איך לאחסן את התרופה?**
- מען הרעלות! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמרה במקום מוגן מפני מגע ידים וטוחנה ראייתית של ילדים / ואו תינוקות ועל ידי כך מנע הרעלות. אל תגרגָן להקאה לאלה הרורה פורשת מהתרופה.
 - אין להשמש תרופה אחרת תאריך תאריך תרופה (exp. date) המופיע על גבי אריזת הטרקטון ואריזת הבליטסטר. תאריך התופה מתיחס למשך האחרון בלבד.
 - יש לאחסן תרופה ישן במשך לפחות 3 ימים.
 - יש לאחסן במקומות קרים, מתחת ל-25°C.
- 6. מידע נוסף**
- נסוף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Lactose Monohydrate, Sucrose, Potato Starch, Talc, Povidone 25, Magnesium Stearate, Gelatin, Acacia, Carnauba Wax. כל טבילה מכילה 97 מ"ג לקטוז ו-79 מ"ג סוכר.
 - כדי נמנית התרכזות והארות: הטבליות ארכוטונת קרמיים גדולים או אריזות הקלים בטבליות לבנות. בכל קלטטර 10 טבליות לפחות, 50, 20, 50, 100 טבליות. יתרן שלא כל גדי האריזות משוקרים.
 - שם היצרן ובעלותו וכתובתו: פאdagis ישראל פרומטטיקה בע"מ, רח' רקרט, 1, שוהם.
 - מס' רישום תרופה בפנסוס התרופות הממלכתי: במועד הרישום: 035-72-25831-00.
 - קולוטאל טבליות קרייזה, השימוש בקולוטאל עלול לגרום להפרעות למחלות הנושאות הלוואו. על מנת למנוע צרך על הסבון.
 - לשם הפשטה ולחקלתה הקרייזה, עלון זה לנוכח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.
 - עדכן בחודש ספטמבר 2023 בהתאם להרואות משרד הבריאות.
- 3. כיצד תשמש בתרופה?**
- עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בוגוע למינון ואופן הטיפול בתק舍ר.
 - המינון המקובל הוא טיפול בתק舍ר אחת 3 פעמיים ביום.
 - אין לבצע על המנה המומלצת:
- שורות נתולות:**
- יש לטול את הטבילה יהוד עם כוס מים מלאה.
 - מחולץ לטול את הטבילה 2-3 דקות לפני הארוחה.
 - השתדל לקחת את הטבליות בזמנים קבועים בכל יום ובאזורים שונים רצויים במשך שטנית הטבליות הטעפה לאירוע כל רitre.
 - אין ללעום, לכתוש או לחזוץ את הטבילה.
 - אם גטלת בטעות מינון יתר או אם בטעות בעל-ילך:** מן הרוקח, הנקה, הפאה מד' לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את הרורה פאיה. אין את המנה הבאה בזמן הגירל.
 - אם שכחת לטול תרופה זו בזמן המתיעד אין לטול מגה כפולה.** קח את המנה הבאה בזמן הגירל.
 - אין ליטול תרופה בחושך!** בודק התווות והמנה בכל פעם לאחרות.
 - הנרת זוקה להם.**
 - אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הרווחן ברופא או ברוקח.**
- 4. תופעות לוואי**
- כמו בכל תרופה, השימוש בקולוטאל עלול לגרום לתופעות לוואי בעלי הколоוניט והמהמטשים. אל תבהיר למקרה רשות מיניהם הלוואו. ייירן שלא הסבול מראות אלה:
- עליך ליטול את התרופה ולפנות לרופא** אם אתה מושפע מSIDE-EFFECTS הסימנים הבאים. ייירן שלא סובל לטיפול רפואי:
- קשי נשימה, נפיחות בנפינים, בצוואר, בשפתיים, בלשון או בברון. ייירן שאתה סובל מהגבגה אלרגית חמורה לתרופה.
- תופעות לוואי נספות:**
- יירן שלא סובל מרגבה ארגנטית קלה לתרופה, כגון: פרחה, אדומותיות, גירוי בעור.
- אם הוועיה תוענת לוואי, אם אתה מותפעת הלוואי מחמירה או כאשר, לאת סובל מותפעת לוואי צורנית בעlion, עליך לחתיעץ עם הרופא.
- דיווח תופעות לוואי:**
- נתין לזרוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות חיבורו על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" בטלפון הלקוחות תרופה" שנדפס בראש הכתובת אדר' הבטה של אתר משרד הבריאות (אילו: www.health.gov.il) המפנה כינסה לKİSY. דיווח על תופעות לוואי, או ע"י טלפונם מקנון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י <https://sideeffects.health.gov.il> כו".
לקיים: נתון לדוחה על הריטה פאdagis ע"י כו".
- לקיים:
www.padagis.co.il
- כל דוחה על קולוטאל אין השעה על הניגזה או שימוש במכוונות:**
- 6. מידע חשוב על חיקוק תרוכחים של התרופה:**
- התרופה משוקקת ללא מרשם רפואי על כל הדוחה לתקון תרוכחים (מכשירים) משנת 1986 – 1986.
- קולוטאל טבליות 135 מ"ג**
- כל טבילה מכליה 135 מ"ג של מברירן הידרוכולורייד (Mebeverine hydrochloride). חומרה בבלט פעילים ואליגרים בחCKER – ראה סעיף 6 מ"ג נסוף – מ"ג ומיוזע וטעוב על חלק מהרכיבים הנדרש תרופה עלון זה.
- קרא בעיין את העlion עד סופו בטars תשמש בתרופה. עלון זה מכל מיצע תמייצת על התרופה. אם יש לך שאלות או מופות, פה לא רופא או אל הרוקח. עליך לטול את ההכחיר על פל תרואה בסעיף התוינו בעlion, היוזע ברוקח אט תרצוק למ"ד נסוף. עליך לטובות לעוא אמדיה וטומייה המחלת (סימפטומים) מחמירים או אינם מshortרים.
- 1. למה מיועדת התרופה?**
- התרופה מיועדת לטיפול בתסמונה עוויתות המעיים (סומנו התעי העגיין).
- 2. לפני השימוש בתרופה:**
- אין להשתמש בתרופה אם:**
אתה ורגי (אלרגי) לחומר הפעיל מבברין הידרוכולורייד או לכל אחד מהרכיבים הנדרשים אשר סעיף 6 מ"ג נסוף (ראה סעיף 6 מ"ג נסוף בעlion זה).
- לידיים ומתבגרים:**
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות, לילדים ולתבגרים מתחת גיל 18 שנים.
- 氤וניקוזיטות בין תרופות:**
אם אתה לתקה, או אם לך שתפקיד אחרה, כולל תרופות לא מרשם ותוספי תזונה. סר על לרופא או לרוקח.
- הרווחן והנקה:**
- היועץ לרופא אם הרווחן או מנהנת להיכנס להרווחן. קולוטאל ניתן מומלץ בקורס תרופה.
 - ייירן שהרווחן ייירן לטפל בהפסק את הטיפול בקולוטאל או על ניליה תרופה אחרת.
 - היועץ לרופא אם הרווחן מינקה או מתחילה להרווחן. קולוטאל אינו ממלץ בהפסקת ההנקה.
 - ייירן שהרווחן ממלץ על הפסקת ההנקה או ניליה תרופה אחרת מס את מעוניין להנקה.
- הניגזה ושימוש במכוונות:**
- כל דוחה על קולוטאל אין השעה על הניגזה או שימוש במכוונות.
- 7. מידע חשוב על חיקוק תרוכחים של התרופה:**
- התרופה מכילה לטסוח וטובר. בקרה על לרושית לוסררים מסוימים, ייירן מהיוזע ברופא לפני תחילת הטיפול.