

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תקנירם) התשמ"ו – 1986

התורופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

רוזליטריך	רוזליטריך
200 מ"ג	100 מ"ג
כמוסות קשות	כמוסות קשות
רכוב:	רכוב:
כל כמוסה מכילה: אנטרכטיניב 200 מ"ג entrectinib 200 mg	כל כמוסה מכילה: אנטרכטיניב 100 מ"ג entrectinib 100 mg

למידע על חומרים בלתי פיעילים ואילרגניים, ראה בסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התורופה" וגם סעיף 6 "מידע נוספים".

קרוא ביעין את העلون עד סוף בטרכם תשמש בתורופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התורופה. אם יש לך שאלות נוספות נספנות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. שומר את העلون. יתכן שתצטרכך לקרוא אותו שוב.

תורופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה לשלה.

1. למה מיועדת התורופה?

רוזליטריך מיועדת לטיפול במוגדים עם:

- א. גידול סולידי אשר:
 - נגרם על ידי שינוי בגן משפחת NTRK -
 - התפשט למקומות נוספים בגוף או במקרים בהם ביצוע ניתוח להסרת הגידול עלול לגרום לסיבוכים חמורים ו-
 - אין חלופה טיפולית מספקת או הגידול גדול או התפשט במהלך קיבלת טיפול אחר.

ב. סרטן ריאת מסוג תאים שאינם קטנים [NSCLC – small cell lung cancer], אשר התפשט למקומות נוספים בגוף, עם שינוי ROS1 בגן.

קבוצה רפואיית:
מעכב קינאז**2. לפני השימוש בתורופה****אין להשתמש בתורופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל אנטרכטיניב (entrectinib) או לאחד ממרכיבי התורופה הנוספים המוזכרים בפרק 6 "מידע נוספים".

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתורופה:

לפני Nutzung רוזליטריך, ספר לרופא על כל מצב רפואי קודם, כולל אם:

- אתה סובל מבעיות בכבד או בcliffe
- יש לך שברים בעצמות
- אתה סובל מבעיות לבביות כלשהן, כולל מצב רפואי שנקרא תסמונת QT המוארך (Long QT Syndrome)
- אתה סובל מבעיות נירולוגיות (במערכות העצבים)
- אם סבלת או אתה סובל מבעיות בעיניים או בראייה
- הנר בהריון או מתכנתת בהריון. רוזליטריך יכולה לגרום לך לעובר. יש לספר לרופא המתפל מיד אם נכנסת להריון או שאת חושבת שתאת בהריון בעת Nutzung רוזליטריך.

נשים ב גיל הפוריוט:

- הרופא המתפל יפנה אותך לביצוע בדיקת הריון לפני התחלת הטיפול ברוזליטריך.
- עלייך להשתמש באמצעי מניעה ייעיל במהלך הטיפול ברוזליטריך ולמשך 5 שבועות לפחות לאחר נטילת המנה האחורהה של רוזליטריך.

גברים אשר בנוט זוגם ב גיל הפוריוט:

- עלייך להשתמש באמצעי מנעה ייעיל במהלך הטיפול ברוזליטריך ולמשך 3 חודשים לאחר נטילת המנה האחורהה של רוזליטריך.
- הנר מיקקה, או מתכוונת להניק. לא ידווע אם רוזליטריך עוברת לחלב האם. אין להניך במהלך הטיפול ברוזליטריך ולמשך 7 ימים (שבוע אחד) לאחר נטילת המנה האחורהה של רוזליטריך. יש לדzon עם הרופא המתפל על הדרך הטובה ביותר להזין את תינוקך במהלך תקופה זו.
- נאמר לך על ידי הרופא שיש לך חוסר סבלות לסוכרים מסוימים, זאת מכיוון שרוזליטריך מכילה לקטוז (סוג של סוכר).

ילדים ומתבגרים:

תורופה זו אינה מאושרת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

בדיקות ועקב:

- הרופא המטפל יפנה אותך לבדיקות דם על מנת לבדוק את תפקוד הכבד במהלך הטיפול ברוזליטרק.
- הרופא המטפל בצע בדיקות לפני ובמהלך הטיפול ברוזליטרק על מנת לבדוק את הפעילות החשמלית של הלב שלך ואת מלא חילוף (אלקטROLיטים).
- יתכן שהרופא המטפל יפנה אותך לבדיקות דם לפני ובמהלך הטיפול ברוזליטרק על מנת לבדוק את רמת החומצה האורית בدم.
- נשים בגיל הפוריות: הרופא המטפל יפנה אותך לביצוע בדיקת הרוין לפני התחלת הטיפול ברוזליטרק.

תגובהות בין-תרופתיות:

אם אתה לוקחת, אם לך חותם לאחרונה, או אתה עלול לקחת תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

נטילת רוזליטרק עם תרופות מסוימות עלולה להשפיע על הרמה של רוזליטרק או תרופות אחרות בדם, ועשוי לגרום לתופעות לוואי או להשפיע על הדרך שבה רוזליטרק או תרופות אחרות עובדות. יש להזכיר ולהחזיק רשימה של התרופות אשר הנך גוט ולהציג אותה בפני הרופא המטפל והרוקח כאשר הנך מקבל תרופה חדשה.

שימוש בתרופה מזוין ושתייה:

ניתן ליטול את הכמוסות עם האוכל או לאכול. אין לשותות מיץ אשלוליות או לאכול אשלוליות במהלך הטיפול ברוזליטרק מכיוון שהזה עלול להעלות את כמות החומר הפעיל אנטרקטיבי בדם לרמה מזיקה, ולהעלות את הסיכון לתופעות לוואי.

הרוין, הנקה ופוריות:

- לפני נטילת רוזליטרק, ספרי לרופא על כל מצב רפואי קודם, כולל אם:
- הנך בהריון או מתכוננת להריון. רוזליטרק יכולה לגרום בעור. יש לספר לרופא המטפל מיד אם נכנסת להריון או שאת חושבת שתה בהריון בעת נטילת רוזליטרק.

נשים בגיל הפוריות:

- הרופא המטפל יפנה אותך לביצוע בדיקת הרוין לפני התחלת הטיפול ברוזליטרק.
- עליך להשתמש באמצעי מניעה ייעילים במהלך הטיפול ברוזליטרק ולמשך 5 שבועות לפחות לאחר נטילת המנה האחורה של רוזליטרק.

גברים אשר בנוט זוגם בגיל הפוריות:

- עליך להשתמש באמצעי מנעה ייעיל במהלך הטיפול ברוזליטרק ולמשך 3 חודשים לאחר נטילת המנה האחורה של רוזליטרק.
- הנך מניקה, או מתכוננת להנתק. לא ידוע אם רוזליטרק עברת לחלב האם. אין להנתק במהלך הטיפול ברוזליטרק ולמשך 7 ימים (שבוע אחד) לאחר נטילת המנה האחורה של רוזליטרק. יש לדון עם הרופא המטפל על הדרך הטובה ביותר להזין את תינוקך במהלך תקופה זו.

נגיעה ושימוש במכוונות:

אין לנו גאג או להפעיל מכונות כבדות עד אשר תדע כיצד רוזליטרק משפיע עליך. אם אתה מרגיש סחרחות, עילפון, עיפות, טשטוש ראייה, אובדן זיכרון, שינוי במצב המנטלי, בלבול או הזיות, אל תנהג ואל תפעיל מכונות כבדות עד שהסתומים שלך יעברו.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

- רוזליטרק 100 מ"ג ורוזליטרק 200 מ"ג מכילות לקטוז (סוג של סוכר). אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך חוסר סבירות לסוכרים מסוימים, היועץ ברופא שלך לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.
- רוזליטרק 200 מ"ג מכילה חומר צבע בשם (E110) sunset yellow FCF אשר עלול לגרום לתגובה אלרגית.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בהתאם לתמיהד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין לך בעוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

מינון:

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקביל בדרך כלל הוא: 3 כמוסות של רוזליטרק 200 מ"ג, פעם ביום (סה"כ 600 מ"ג ביום). אין לעبور על המנה המומלצת. אין לשנות את המינון או להפסיק לקחת רוזליטרק, אלא אם כן הרופא המטפל הורה לך על כן. יתכן שהרופא המטפל ישנה את המינון, יפסיק באופן זמני או לצמצמות את הטיפול ברוזליטרק אם יהיה לך תגובה לוואי מסוימת.

צורת הנטילה:

יש לבלוע את המכמוסות בשלהמונות עם מים לשתייה, בהתאם להוראות הרופא. אין לפתח, לרטק או לילוע את המכמוסות ואין להמיס את תונן המכמוש מכיוון שתונן המכמוש בעל טעם מר. ניתן ליטול את המכמושות עם האוכל או לאכול. אין לשותות מיץ אשלוליות או לאכול אשלוליות במהלך הטיפול ברוזליטרק מכיוון שהזה עלול להעלות את כמות החומר הפעיל אנטרקטיבי בדם לרמה מזיקה, ולהעלות את הסיכון לתופעות לוואי.

אם הקאת מיד לאחר נטילת המנה של רוזליטרק, ניתן ליטול את המנה שנייה.

אם נטلت בטיעות מינון גבוהה יותר או אם בטיעות בעליל או מישחו אחר מן התהופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התהופה איתך.

אם שכחת ליטול את התהופה בזמן הדרוש, יש לקחת אותה ברגע שמדוברת. אם המנה הבאה אמורה להילך בתוך 12 שעות, דלג על המנה שנשכח וקח את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין לקחת מנה כפולה כדי לפצות על מנה נשכחה.

חשוב לזכור רוזליטריך כל יום למשך פרק הזמן שנקבע על ידי הרופא שלך. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתהופה ללא הייעוץ ברופא.

אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התוויות והמינה **בכל פעם** שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זוקק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתהופה, הייעוץ ברופא או ברוקט.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברוזליטריך עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות, כולל:
תינוק ולא תסבול מכך אהת מהן.

- **אי ספיקת לב.** רוזליטריך עלולה לגרום לאירוע ספיקת לב או להחמרה באירוע ספיקת לב קיימת. יש לספר לרופא המטפל מיד אם אתה חווית אחד מהсимנים והתסמינים של אי ספיקת לב:
 - צפיפות או שיעול ממושך
 - קושי בנשימה בשכיבה
 - עלייה פתאומית במשקל
 - קוצר נשימה אשר מתגבר
 - עיפיות או חולשה
 - התנפחות של הקרטזוליים, כף רגל או רגליים
- **השפעות על מערכת העצבים המרכזית.** רוזליטריך עלולה לגרום לסתורחות, שינוי במצב הרוח, או עלולה להשפיע על האופן שבו אתה חושב ולגרום בלבול, הזיות, בעיות בರיכוז, בקשבר, בזיכרון, בדיבור, ביכולת הבנת הנarra ווהנשמע ובשינה. יש לספר לרופא המטפל מיד אם אתה חווית הסיכון שלך לשברים עצומות. שברים עצומות עלולים להתרכש בעקבות נפילה או חבלה אחרת או להתרכש ללא נפילה או חבלה אחרת. ספר לרופא המטפל אם אתה מפתח כאב, שינויים בתנוחה או שינויים בעצומות.
- **בעיות בכבד (רעילות כבדית).** הרופא המטפל יפנה אותך לבדיקות דם על מנת לבדוק את תפקוד הגוף במהלך הטיפול ברוזליטריך. יש לספר לרופא המטפל מיד אם אתה מפתח כל אחד מהتسمינים הבאים של בעיות בכבד, כולל:
 - אובדן תיאבון
 - בחילה או הקאה
 - כאב באזורי הבطن העליון מצד ימין
 - הצהבהה של העור או של החלק הלבן של העיניים
 - שタン כהה
- **עליה ברמת חומצה אורית בدم (היפראוריצמיה).** רוזליטריך עלולה לגרום לרמה גבוהה מדי של חומצה אורית בדם. יתכן שהרופא המטפל יפנה אותך לבדיקות דם לפני ובמהלך הטיפול ברוזליטריך על מנת לבדוק את רמת החומצה האורית בדם. אם יש לך רמה גבוהה של חומצה אורית בדם, יתכן שהרופא המטפל ירשום לך תרופה לטיפול במצב זה. ספר לרופא המטפל אם אתה מפתח כל אחד מהتسمינים הבאים של עליה ברמת חומצה אורית (היפראוריצמיה) כולל:
 - אדמומיות, חום, ריגשות או נפיחות במפרקים, במיוחד בבחוץ
 - כאב באזורי הבطن או בצדיה
 - בחילה או הקאה
 - שタン ורוד או חום
- **הארכת מקטע QT - שינויים בפעולות החשמלית של הלב.** הארכת מקטע QT יכולה לגרום לדיפיקות לב לא סדירות אשר עלולות להיות מסכנות חיים. הרופא המטפל יבצע בדיקות לפני ובמהלך הטיפול ברוזליטריך על מנת לבדוק את הפעולות החשמלית של הלב שלך ואת מלאי הגוף (אלקטROLיטים). יש לספר לרופא המטפל מיד אם הנרך חש תחושת עילוף, מסוחרר, או מרגיש כי לבך פועל באופן לא סדר או במהירות גבוהה במהלך הטיפול ברוזליטריך. אלה עלולים להיות סימנים הקשורים להארכת מקטע QT.
- **בעיות בראיה.** רוזליטריך עלולה לגרום לביעות בראיה. אם תפתח בעיות עיניים חמורות במהלך הטיפול ברוזליטריך יתכן שהרופא המטפל יפסיק לך את הטיפול ברוזליטריך ופנה אותך לרופא עיניים. יש לספר לרופא המטפל מיד אם יש לך אובדן ראייה כלשהו או כל שינוי בראיה, כולל:
 - ראייה כפולה
 - ראייה מוטושטשת
 - עכירות בראיה או החמרה בעכירות קיימות
 - ראייה של הבזקן או ראייה של הבזקן או ראייה של הבזקן או
 - אויר אשר גורם לכואב בעיניים

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות מוגד (עשויות להשפיע על יותר ממטופל אחד מתוך 5 מטופלים):

- עייפות
- עצירות
- שניי בחוש הטעם
- נפיחות
- סחרחות
- שלשול
- בחליה
- שניי בתחשות המגע
- קוצר בנשימה
- כאבי שרירים
- בלבול, שניים במצב הנפשי, בעיות בזכרון והזיות
- עלייה במשקל
- שיעול
- הקאה
- חום
- כאבי מפרקים
- שניים בראשיה

הרופא המטפל עשוי להפסיק זמנית, להוריד את המינון או להפסיק לחולוטין את הטיפול ברוזליטרק, אם אתה מפתח תופעות לוואי מסוימות במהלך הטיפול בתכשיר. אלו לא כל תופעות הלואוי האפשריות של רוזליטרק. אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי חמירה או אם אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה לעלון, עליך להתיעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות קישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מוחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידיך תמנע הרעללה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (date exp.) המופיע על גבי האריזה החיצונית. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן מעל ל- 30°C.
- על מנת להגן מלחות, יש לאחסן את התרופה באזירה המקורית ולשמור את הבקבוק סגור היטב.
- אין להשילר תרופה למי השפכים או לפחות האשפה הביתית. היועץ ברוקח כיצד להשילר תרופות שאין בהן צורך. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוספת

רוזליטרק מכילה את החומר הפעיל אנטרכטיניב (entrectinib).

רוזליטרק 100 מ"ג: כל כמוסה מכילה 100 מ"ג חומר פועל.
רוזליטרק 200 מ"ג: כל כמוסה מכילה 200 מ"ג חומר פועל.

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

מרכיבי תוכן הרכוסה:

- lactose anhydrous, tartaric acid, crospovidone, hypromellose, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide.
- מרכיבי ציפוי הרכוסה:
- hypromellose, titanium dioxide (E171), yellow iron oxide (E172; for Rozlytrek 100 mg capsule), FD&C Yellow #6 (E110; for Rozlytrek 200 mg capsule).
 - Printing ink: shellac, propylene glycol, strong ammonia solution, and FD&C blue #2 aluminum lake.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

רוזליטרק 100 מ"ג מגעה ככמוסות קשות, אוטומות, בצבע צהוב. על גופו הרכוסה מוטבע בצבע כחול "ENT 100". התרופה זמינה באריזת בקבוק המכילה 30 כמוסות.

חוליטרק 200 מ"ג מגיעה ככמוסות קשות, אוטומות, בצלע כתום. על גוף הכמוסה מוטבע בצלע כחול "ENT 200". התרופה זמינה באrizat בקבוק המכילה 90 כמוסות.

בעל הרישום וכותבתו: רוש פרמצטטיקה (ישראל) בע"מ, ת.ד 6391, הוד השרון 4524079.

שם הייצן וכותבתו: הוופמן- לה רוש בע"מ, באזל, שוויץ.

עלון זה נערך בדצמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

חוליטרק 100 מ"ג: 36185

חוליטרק 200 מ"ג: 36186

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.