

**עלון לצרכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ז - 1986**  
התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

**טDALIS טבָע 20 מ"ג**  
**טבליות**

הרכב:  
כל טבלייה מכילה:  
טDALIFIL 20 מ"ג (Tadalafil 20 mg)  
לשימוש "על פי צורך"

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוספת".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.  
אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

**1. למה מיועדת התרופה?**

טDALIS טבָע מיועדת לטיפול בהפרעה בזקפה אצל גברים.

**קבוצה רפואיית:** אורתוגוניות, תרופות המשמשות לביעוֹת זקפה.  
טDALIS טבָע מכילה את החומר הפעיל טDALIFIL, השיר לקבוצת תרופות הנקרואוט מעכבי PDE5 (מעכבי 5).

הפרעה בזקפה היא מצב שבו גבר לא יכול להשיג או לשמור על איבר המין זקוף במצבה המקורי של הדרישת פעילות מינית. הוכח כי טDALIFIL משפר משמעותית את יכולת להשיג איבר מין זקוף וקשה הדרושה לפעילות מינית.

לאחר גירוש מין, טDALIS טבָע פועלת על ידי הרפ"ת כל הדם באיבר המין שלו, וכך מאפשרת זרימת דם אליו. התוצאה המתבקשת היא תפוקוד זקפה משופר. טDALIS טבָע לא תעזר לך אם אין לך הפרעה בזקפה.

חשוב לציין כי טDALIS טבָע אינה פועלת בהיעדר גירוש מין. עלייך ועל הפרטן שלך לפעול להשתגת גירוש מין, בדיק כפי שהייתם עושים אם לא הייתה נוטל תרופה להפרעה בזקפה.

**2. לפני השימוש בתרופה**

אין להשתמש בתכשיר אם:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל טDALIFIL או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוספת").</li><li>• אתה נוטל סוג מסוים של ניטרט אורגני או מסווג המשחרר ניטրיק אוקסיד, כגון אAMIL ניטרט. זהה קבוצת תכשירים ("ניטרטים") המשמשת לטיפול באנגינה פקטורייס ("כאב בחזה"). הוכח כי טDALIFIL מגבירת את ההשפעה של תכשירים אלו. אם אתה נוטל סוג מסוים של ניטרט או שאינך בטוח, ספר על כך לרופא.</li><li>• אתה סובל ממחלה לב חמורה או עברת התקף לב במהלך 90 הימים האחרונים.</li><li>• עברת לאחרונה אירוע מוחי שהתרחש בששת החודשים האחרונים.</li><li>• אתה סובל מלחץ דם נמוך או יתר לחץ דם בלתי מבוקר.</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- אי פעם סבלת מאובדן ראייה כתוצאה מה- non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION), מצב רפואי שנקרא "שבץ של העין".
- אתה נוטל ריאו-יגואט (riociguat). זהה תרופה המשמשת לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי (כלומר לחץ דם גבוה בריאות) ויתר לחץ דם ריאתי כרוני קריישי (כלומר לחץ דם גבוה בריאות הנבוע מקרישי דם). הוכח כי מעכבי PDE5, כגון טדאליס טבע, מגבירים את השפעת הורדת לחץ הדם של תרופה זו. אם אתה נוטל ריאו-יגואט או שאין לך בטוח ספר עליך לרופא.

התרופה אינה מיועדת לשימוש מתחת לגיל 18 או לנשים.

#### **اذהרונות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

שוחח עם הרופא לפני נטילת טדאליס טבע. עליך לדעת כי פעילות מינית מהוות סיכון אפשרי עבור חוליותך, היות שהיא דורשת ממך מוגבר מהלב. אם אתה סובל מבעיה לבבית עליך להתייעץ עם הרופא.

#### **לפני נטילת הטబליות, ספר לרופא אם:**

- אתה סובל מאנמיה חרמשית (תאי דם אדומים שאינם תקינים).
- אתה סובל ממיאלומה נפוצה (سرطان של מח העצם).
- אתה סובל מלוקמיה (سرطان של תא הדם).
- קיימות עייפות במהלך איבר המין שלך.
- אתה סובל מבעיית כבד חמורה.
- אתה סובל מבעיית כליות חמורה.

לא ידוע אם טדאליס טבע יעליה במטופלים שעברו:

- ניתוח בגן הירכיים.
- הסרה חלקית או מלאה של בלוטת הערמוונית (פרוסטטה) שבה חותכים את עצבי הבלוטה.

אם אתה חווית רידיה או אובדן פתאומי בראייה או שהראיה שלך מעוותת או מעוממת בזמן שאתה נוטל טדאליס טבע, הפסיק את השימוש בטדאליס טבע ונונה מיד לרופא.

רידיה בשמיעה או אובדן פתאומי של השמיעה נצפו במספר מטופלים שנטלו טדאליפיל. על אף שלא ניתן לשער את השימוש בטדאליפיל ישירות לתופעה זו, אם אתה חווית רידיה בשמיעה או אובדן פתאומי של השמיעה, הפסיק את השימוש בטדאליס טבע ונונה מיד לרופא.

#### **ילדים ומתבגרים**

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18.

**תגובה בין תרופתיות**  
אם אתה לוקחת, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח.

אין לך תרופה טדאליס טבע אם אתה לוקחת תכשירים מסווג ניטרטים.

תרופות מסוימות עשויות להיות מושפעות מטדאליס טבע או שהן עשויות להשפיע על מידת הפעולה של טדאליס טבע. ספר לרופא או לרוקח אם אתה כבר לוקחת:

- תרופות משפחת חוסמי אלפא (משמשות לטיפול ביתר לחץ דם או בתסמיני שתן הקשורים להגדלה שפירה של הערמוונית (פרוסטטה)).
- תרופות אחרות לטיפול ביתר לחץ דם.
- ריאו-יגואט.
- תרופות משפחת מעכבי 5-אלפא-רדוקטאז (משמשות לטיפול בהגדלה שפירה של בלוטת הערמוונית).
- תרופות כגון טבליות קטוקונזול ( לטיפול בזיהומים פטריאייטים) ומעכבי פרוטאז לטיפול במחלות האידס או בזיהום בגין הכשל החיסוני האנושי (HIV).

- פנobarbitual, פניטואין וקארבאמאזפין (תרופה לטיפול בכפין).
- ריפאמפיצין, אריתרומיצין, קלאריתרומיצין או איטראקונזול.
- תכשירים נוספים לטיפול בהפרעה בזקפה.

#### **שימוש בתרופה עם מזון ושתייה**

טבליות טדאליס טبع מיועדות לשימוש פומי בגברים בלבד. יש לבלוע את הטבליה או חצי טבליה עם מעט מים. ניתן ליטול טדאליס טבע עם או ללא מזון. מיץ אשכליות עשוי להשפיע על האופן שבו טדאליס טבע תפעל ויש לקחת אותו בזיהירות. שוחח עם הרופא לקבלת מידע נוספת.

#### **שימוש בתרופה ואכילת אלכוהול**

שתיית אלכוהול עלולה לגרום ביכולות שלר להשגת זקפה ועלולה להויריד באופן זמני את לחץ הדם שלר. אם נטלה או אתה מתכוון ליטול טדאליס טבע, יש להימנע משתיית אלכוהול מופרצת (רמת אלכוהול בדם של 0.08% או יותר), מאחר שהוא גם עלולה להעלות את הסיכון לשחרחות בקימה משכיבת לעמידה.

#### **פוריות**

בדיקות שנערךו בセルבים נמצאה ירידה בייצור הזרע. ירידה בייצור הזרע נצפתה גם במספר גברים. לא סביר שתופעות אלו יובילו לפגיעה בפוריות.

#### **נהיגה ושימוש במכונות**

ישנים גברים שלקו טdalfil במחקרים קליניים ודיווחו על סחרחות. בדוק היבט כיצד אתה מגיב לטבליות לפני הנהיגה או שימוש במכונות.

#### **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

טdalil טבע מכילה לקטוז. אם נאמר לך על-ידי הרופא שיש לך אי-סבילות למטופים מסוימים, התיעץ עם הרופא לפני השימוש בתרופה. תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

**המינון המקובל לטיפול בהפרעה בזקפה אצל גברים, בהיעדר הוראה אחרת מרופא:**  
המינון ההתחלתי המומלץ הוא 10 מ"ג טdalfil (חצי טבליה של טdalil טבע 20 מ"ג) לפני קיום פעילות מינית. אם ההשפעה של מינון זה חלשה מדי הרופא עשוי להגדיל את המינון ל-20 מ"ג טdalfil (טבליה אחת של טdalil טבע 20 מ"ג).

יתכן שהרופא רשם לך מינון של 20 מ"ג טdalfil (טבליה אחת של טdalil טבע 20 מ"ג) היה שהוא החליט שהמינון המומלץ של 10 מ"ג הינו חלש מדי עבורך.


יש ליטול טdalil טבע לפחות 30 דקות לפני קיום פעילות מינית. השפעת טdalil טבע יכולה להימשך עד 36 שעות לאחר נטילת התרופה. אין ליטול טdalil טבע יותר מפעם אחת ביום. טdalil טבע מיועדת לשימוש לפני קיום פעילות מינית צפוייה ואני ממליצה לשימוש يوم-יומי מתמשך.

חשוב לציין כי טdalil טבע אינה פועלת בהיעדר גירוי מיני. עליך ועל הפרטנר שלך לפעול להשגת גירוי מיני, בדיקות כדי שהיית עושים אם לא הייתה נוטל תרופה להפרעה בזקפה.

**אין לעבור על המונה המומלצת.**

**ח齐יה / כתישה / לעיסה**  
בטבליית טdalיס טבע 20 מ"ג קיימן ח齊יה, בעת הצורך ניתן לחצוץ את הטעבלייה לפני ההוראות הבאות:  
**הוראות עבור חלוקת הטעבלייה לחצאים (כל ח齊י טבלייה מכיל 10 מ"ג טdalיס לשימוש "על פ' צורר"):**

1. הניח את הטעבלייה על משטח קשה ושטוח (לדוגמה שולחן) כאשר קוווי החלוקה מופיעים לפני מעלה.
2. הניח את האגודלים (או האצבועות המוראות) של שתי הידיים בו-זמנית משני צידי קו החלוקה הקצר יותר של הטעבלייה.
3. לחץ כלפי מטה בכוח למשך זמן קצר באמצעות שני האגודלים (או האצבועות המוראות) על הצד השמאלי ועל הצד הימני החיצוניים של הטעבלייה עד שהטעבלייה נחצית לשני חלקים שווים.



אין מידע בנוגע לכתיישה או לעיסה של הטעבלייה.  
בנוסף, אין מידע לגבי שימוש בתכשיר בזונדה.

**אם נטלת בטיעות מינון גבוהה יותר**  
אם נטלת בטיעות מינון גבוהה יותר מאשר לפנות לרופא. יתכן שתחווה תופעות לוואי כפי שמפורטות בסעיף 4 – "תופעות לוואי".  
אם נטלת מנת יתר או אם בטיעות בלבד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה אליו.

**אם שכחת ליטול את התרופה**  
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, קח את התרופה ברגע שנזכרת אבל אין ליטולמנה כפולה כדי לפסות עלמנה שנשכחה. אין ליטול טdalיס טבע יותר מפעם אחת ביום.  
יש להתמודד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפים  
אם אתה זקוק להם.  
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

#### **4 . תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בטdalis טבע עשוי לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואו. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן. תופעות לוואי אלה בדרך כלל קלות עד בינוניות.

**יש להפסיק טיפול ולפנות לרופא מיד אם אתה סובל מ:**  
• תגובה אלרגית כולל פריחה על העור (תדיירות שאינה שכיחה).

- כאבים בחזה - אין להשתמש בתרופות מסווג ניטרטים יש לפנות מיידית לקבלת טיפול רפואי (תדיירות שאינה שכיחה).
- זקפה ממושכת ואולי כואבת לאחר נטילת טDALIS טבע (priapism) (תדיירות נדירה). אם יש לך זקפה צואת, שנמשכת ברציפות במשך יותר מ-4 שעות יש לפנות מיידית לרופא.
- אובדן פתאומי של ראייה (תדיירות נדירה), ראייה מרכזית מעוותת, מעוממת או מטושטשת או ריאדה פתאומית בראייה (תדיירות לא ידועה).

#### **תופעות לוואי אחרות שדווחו:**

##### **תופעות לוואי שכיחות (נצחו ב-10-1 משתמשים מתוך 100):**

כאב ראש, כאב גב, כאבי שרירים, כאבים בידיהם וברגליים, סומך בפנים, גודש באף והפרעות בעיכול.

##### **תופעות לוואי שאין שכיחות (נצחו ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):**

סחרחות, כאב בטן, לחילה, הקאות, צרבת, טשטוש ראייה, כאב בעיניים, קשי נשימה, נוכחות של דם בשתן, זקפה ממושכת, תחושה של הלוות לב, דופק מהיר, לחץ דם גבוה, לחץ דם נמוך, דימומיים מהאף, צפוף או זמזום באוזן (טנטון), בזקת בידיהם, בכפות הרגליים או בקרסוליים ותחושת עייפות.

##### **תופעות לוואי נדירות (נצחו ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):**

עליפון, התקף כפין ואובדן זיכרון חולף, התנפחות עפupyים, אדמומיות בעיניים, ריאדה פתאומית בשמיעה או אובדן השמיעה, חרלה (חברות אדומות מגדרות על פני הגוף), דימום מהפיין, נוכחות של דם בזרע והזעה מוגברת. דוחו מקרים נדירים של התקף לב ושbatch גם בקרב גברים הנוטלים טDALFIL. לרוב הגברים הללו היו בעיות לבבות טרם נטילת התרופה.

לעתים נדירות דוח על ריאדה חלקית, זמנית או קבועה בראייה או אובדן ראייה בעין אחת או בשתי העיניים.

דוחו כמה **תופעות לוואי נדירות** בקרב גברים שנטלו טDALFIL, שלא הופיעו בניסויים הקליניים. אלו כוללים:

- מיגרנה, בזקת בפנים, תגובה אלרגית חמורה המתבטאת בזקת בפנים או בגרון, פריחה חמורה בעור, הפרעות בזרימת הדם אל העיניים, דופק לב שאינו סדיר, תעוקת חזה ומומות פתאומי על רקע לבבי.
  - ראייה מרכזית מעוותת, מעוממת, מטושטשת או ריאדה פתאומית בראייה (תדיירות לא ידועה).
- סחרחות הופיעו לעתים קרובות יותר בקרב גברים מעל גיל 75 שנטלו טDALFIL. שלשלולים הופיעו לעתים קרובות יותר בקרב גברים מעל גיל 65 שנטלו טDALFIL.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעлон, עליך להתייעץ עם הרופא.**

#### **דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

## **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחן ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעליה. אין לגרום להקה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל-25°C.**

- אין להשליך את התרופה לשפכים או לפסולת הביתיית. התייעץ עם הרופא או הרוקח כיצד יש להיפטר מהתרופה. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

## **6 . מידע נוסף**

### **נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:**

Lactose monohydrate, povidone, crospovidone, polyvinyl alcohol, sodium stearyl fumarate, sodium laurilsulfate, PEG 3350, titanium dioxide, talc, iron oxide yellow.

### **כיצד נראה התרופה ומה תוכן האrizה:**

טבליה מצופה בצורת אליפסה, בצבע חום-צהוב עד צהוב. בצדיה האחד של הטבליה יש קווים חלוקה לרבעים. בצדיה השני של הטבליה מוטבע "20".

אריזה של טדאליס טבע 20 מ"ג מכילה 1, 4 או 8 טבליות.  
ו"תכן שלא כל גודלי האrizות משווים.

### **שם היצרן ובעל הרישום וכתוותו:**

טבע ישראל בע"מ,  
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

**העלון נערך בדצמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.**

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**  
154.90.34233