



עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים (תקשיים) התשמ"י – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ולבוטרין XR 150 מ"ג טבליות בשחרור ממושך

כל טבלייה מכילה:

בופרופיון הידרוכלוריד (bupropion hydrochloride) 150 מ"ג

ולבוטרין XR 300 מ"ג טבליות בשחרור ממושך

כל טבלייה מכילה:

בופרופיון הידרוכלוריד (bupropion hydrochloride) 300 מ"ג

לרישימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 6 – "מידע נוספים".
קרא בעיון את העalon עד סוף בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
ולבוטרין XR אינה מיועדת לטיפול ילדים מתחת לגיל 18 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

ולבוטרין XR היא תרופה המיועדת לטיפול באפיוזות של דיכאון מג'ורי. לאחר תגובה מספקת, המשך הטיפול בולבוטרין XR ייעיל במניעת הישובות.

קבוצה Terapeutic:

תרופות נגדות דיכאון אחרות (other antidepressants).

היא נחשבת כמגיבה עם כימיקלים במוח הנקראים נראדרנליין ודופמין.

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשימוש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לבופרופיון או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).
- אתה לוקח תרופות אחרות המכילות בופרופיון
- אובחנת כסובל מאפילפסיה או שיש לך היסטוריה של פרקושים
- יש לך או הייתה לך הפרעת אכילה (לדוגמא, בולימיה או אנורקסיה נרבה)
- יש לך גידול במוח
- אתה בדרכך כל שטיין כבד וזה עתה הפסיק או שאתה עומד להפסיק לשתו
- יש לך בעיות כבד חמורות

- הפסיקת לאחרונה לחתת תרופות הרגעה, או שאתה עומד להפסיק אותן בזמן שאתה לוקח וולבוטרין XR
 - אתה לוקח או לחתת תרופות אחרות לדיכאון או למחלת פרקינסן הנקראות מעכבי מונואמי אוקסידאז (MAOIs) ב-14 הימים האחרונים.
- אם אחד מ אלה חל עלייך, שוחח מיד עם הרופא, מבלתי לחתת וולבוטרין XR.**

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרפופה
שוחח עם הרופא לפני השימוש בוולבוטרין XR.

تسمונת ברוגדה

אם יש לך מצב הנקרוא **تسمונת ברוגדה** (تسمונת תורשתית נדירה המשפיעה על קצב הלב) או אם דום לב או מות פתאומי אירעו במשפחהך.

ילדים ומתבגרים

וולבוטרין XR אינה מיועדת לטיפול בילדים מתחת לגיל 18 שנים. קיים סיכון מוגבר להתקנות ולמחשבות אובדניות כאשר ילדים מתחת לגיל 18 שנים מטופלים בוגדי דיכאון.

מבוגרים

הרופא צריך לדעת לפני שתיקח וולבוטרין XR אם:

- אתה שותה הרבה אלכוהול באופן קבוע
- יש לך סוכרת גבוהה אתה משתמש באינסולין או בטබליות
- הייתה לך פגעת ראש חמורה או היסטוריה של חבלת ראש

נמצא שולבוטרין XR גורמת להתקפים (פרכוים) בערך ב-1 מתוך 1,000 אנשים. סביר

יותר שתופעת לוואי זו תתרחש באנשים מהקבוצות המצוירות לעיל. אם יש לך התקף

פרכוים במהלך הטיפול עלייך להפסיק לחתת וולבוטרין XR. **אל תמשיך בטיפול ונפה לרופא**

• **יש לך הפרעה דו-קוטבית** (שינויים קיצוניים במצב רוח), מכיוון שולבוטרין XR עלולה להביא לאפיוזה של מחלה זו

• אתה לוקח **תרופות אחרות לדיכאון**, השימוש בתרופות אלה יחד עם וולבוטרין XR יכול להוביל לתסמונת סרטונין, מצב שיכל לסכן חיים (ראה "אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות" בסעיף זה)

• **יש לך בעיות בכבד או בכליות**, יתכן שייהיה לך סיכוי רב יותר לסבול מתופעות לוואי. אם אחד מהנדקרים לעיל חל עלייך, שוחח שוב עם הרופא לפני לחתת וולבוטרין XR. יתכן שהוא ירצה להזכיר מחדש לשומות לב מיוחדת לטיפול שלך, או ימליץ על טיפול אחר.

מחשבות אובדניות והחמרת דיכאון

אם אתה מודכו, עלולות להיות לך לעיתים מחשבות על פגיעה עצמית או התאבדות. מחשבות אלו עלולות להתגבר כאשר מתחילה לראשנה ליטול נוגדי דיכאון, שכן לטרופות הללו לוקח זמן להשפיע, לרבות כשבועים אף לעתים יותר.

אתה עלול לסבול מכך בסבירות גבוהה יותר אם:

- הינו לך בעבר מחשבות להתאבד או לפגוע בעצמך.
 - אתה בוגר צעיר. מידע מניסויים קליניים הראה سيكون מוגבר של התנהגות אובדן במבוגרים מתחת לגיל 25 עם מצבים פסיכיאטריים שטופלו בנוגד דיכאון.
- אם יש לך מחשבות על פגעה עצמית או התאבדות בכל זמן שהוא, **צור קשר עם הרופא או גש לבית החולים מיד**.

יתכן שתמצא שימושי לספר לקרוב משפחה או חבר קרוב שאתה מודכו, ולבקש מהם לקרוא עליו זה. תוכל לבקש מהם לומר לך אם הם חושבים שהDICAOן שלך מחריר, או אם הם מודאגים לגבי שינויים בתנהוגותך.

אינטראקציות/תגובה בין תרופות

אם אתה לוקח, או לוקח תרופות אחרות לדיכאון או למחלת פרקינסן הנקראות מעכבי מונומאי אוקסידאז (MAO) ב-14 הימים האחרונים, **ספר לרופא מבלי לחתול ולבוטרין XR** (ראה גם "אין להשתמש בתרופה אם" בסעיף 2).
אם אתה לוקח, אם **לאחרונה או יתכן שתיקח תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח**. יתכן שהוא ישנה את המנה של ולבוטרין XR, או יציע שינוי בתרופות אחרות שלך.

תרופות מסוימות אין משתמשות עם ולבוטרין XR. חלק מהן עלולות להגדיל את הסיכוי להתקפים או לפרכוסים. תרופות אחרות עלולות להגדיל את הסיכון לתופעות לוואי אחרות. כמו דוגמאות מפורטות מטה, אך זו אינה רשימה מלאה.

סיכוי גבוהה מהרגיל לפרוכסים עלול להיות אם:

- אתה לוקח תרופות אחרות לדיכאון או למחלת נפש אחרות
- אתה לוקח תאופילין לאסתמה או למחלת ריאות
- אתה לוקח טרמדול, משקר כאבים חזק
- **לקחת תרופות הרגעה, או אם אתה עומד להפסיק אותן בעודו לוקח ולבוטרין XR** (ראה גם "אין להשתמש בתרופה אם" בסעיף 2)
- אתה לוקח תרופות נגד מלריה (כמו מפלוקווין או קלורוקווין)
- אתה לוקח מריצים או תרופות אחרות לשיליטה במשקל או בתיאבון
- אתה לוקח סטרואידים (דרך הפה או בהזרקה)
- אתה לוקח תרופות אנטיביוטיות הנקראות קוונגולוניים
- אתה לוקח סוגים מסוימים של אנטי-היסטמינים שעולולים לגרום לשינויות

- **אתה לוקח תרופות לsocرت.**
אם אחד מלאה חל עלייר, שוחח עם הרופא מיד, לפני נטילת וולבוטרין XR. הרופא ישקול את היתרונות והסיכוןם עבורך בנטילת וולבוטרין XR.

סיכוי גבוה מהרגיל לתופעות לוואי אחרות עלול להיות אם:

- **אתה לוקח תרופות אחרות לדיכאון** (כגון אמייטריפטילין, פלאוקסטין, פארוקסטין, ציטלופרム, אסציטלופרם, נילפקסין, דיזולפין, דזיפראמין או אימיפראמין) או למחלות نفس אחרות (כגון קלוזאפין, ריספרידון, תיורידיאזין או אולאנזאפין).
 - וולבוטרין XR עלולה להגביך עם תרופות מסוימות המשמשות לטיפול בדיכאון ואתך עלול לחווות שינויים במצב הנפשי (לדוגמה אי שקט, הזיות, תרדמת), והשפעות אחרות כגון חום גוף מעל 38°C, עלייה בקצב הלב, לחץ דם לא יציב ורפלקסים מוגזמים, נזקשות שרירים, חוסר קואורדינציה / או תסמיינים של מערכת העיכול (לדוגמה בחילה, הקאה, שלשול).
 - **אתה לוקח תרופות למחלת פרקינסון** (לבודופה, אמאנטאדים או אורפננדרים)
 - **אתה לוקח תרופות שימושיות על יכולת הגוף שלך לפרק וולבוטרין XR** (קרבאמאזפין, פניטואין, אלפרואט)
 - **אתה לוקח תרופות מסוימות המשמשות לטיפול בסרטן** (כמו ציקלופוספורמید, איפוסופמיד)
 - **אתה לוקח קלופידוגרל המשמשת בעיקר למניעת שבץ**
 - **אתה לוקח חוסמי בטא מסוימים** (כמו מטופרולול)
 - **אתה לוקח תרופות מסוימות לקצב לב לא סדייר** (פרופאפנון או פלקאייניד)
 - **אתה משתמש במדבקות ניקוטין לעזור לך להפסיק לעשן.**
- אם אחד מלאה חל עלייר, שוחח עם הרופא מיד, לפני נטילת וולבוטרין XR.

וולבוטרין XR עלולה להיות פחות יעילה

- אם אתה לוקח ריטונאביר או אפאבירנז, תרופות לטיפול בziehom VIIH.
- אם זה חל עלייר, ספר לרופא. הרופא יבדוק עד כמה וולבוטרין XR יעילה עבורך. יתכן שייהי הכרחי להעלות את המנה שלך או לשנות לטיפול אחר לדיכאון שלך. **אל תעלה את מנת הwalbutorin XR שלך מבלי להתייעץ עם הרופא, שכן הדבר עלול להגביר את הסיכון שלו ל副作用ות לוואי, כולל פרקושים.**

וולבוטרין XR עלולה להפחית יעילות של תרופות אחרות

- אם אתה לוקח טמוקסיפין המשמשת לטיפול בסרטן השד.
 - אם זה חל עלייר, ספר לרופא. יתכן שייהי צריך לשנות לטיפול אחר לדיכאון שלך.
 - אם אתה לוקח דיגוקסין לטיפולقلب.
- אם זה חל עלייר, ספר לרופא. הרופא עשוי לשקל את התאמת המינון של דיגוקסין.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אלכוהול יכול להשפיע על אופן הפעולה של וולבוטרין XR, וכך גם הם נלקחים יחדיו הם עלולים, במקרים נדירים, להשפיע על העצבים שלך או על מצבך הנפשי. חלק מהאנשים מוצאים שהם רגשים יותר לאLCOHOL כאשר הם נוטלים וולבוטרין XR. יתכן שהרופא ימליץ לך לשותות אלכוהול (בירה, יין או משקאות חריפים) כאשר אתה נוטל וולבוטרין XR, או להשתדל לשותות מעט מאוד. אבל אם אתה נהוג לשותות כמותות גדולות של אלכוהול ביום, אל תפסיק בפתאומיות: זה עשוי להגבר סיכון לפרכזים.

שוחח עם הרופא לגבי שתית אלכוהול לפני שאתה מתחילה ללקחת וולבוטרין XR.

השפעה על בדיקות שתן
וולבוטרין XR עלולה להפריע בבדיקות שתן מסוימות לזיהוי תרופות אחרות. אם עלייך לעבור בדיקת שתן, ספר לרופא או לבית החולים שאתה לוקח וולבוטרין XR.

הירין והנקה
אל תיקחי וולבוטרין XR אם אתה בהירין, חושבת שייתכן שאתה בהירין או מתכונת להרhot, אלא אם כן הרופא ממליץ על כך. היועצי ברופא או ברוקח לפני קיחת תרופה זו. חלק מהחוקרים, אך לא כולם, דיווחו על עלייה בסיכון למומים מולדים, במיוחד מומי לב, בתינוקות שאימהותיהם נטלו וולבוטרין XR. לא ידוע אם הם עקב השימוש בוולבוטרין XR.
הרכיבים של וולבוטרין XR יכולים לעבור לחלב אם. היועצי עם הרופא או הרוקח לפני קיחת וולבוטרין XR.

נהיגה ושימוש במכונות
אם וולבוטרין XR גורמת לך לסתורחות או להרגשה שאתה עומד להתעלף, אל תנעה או תפעיל כלים או מכונות כלשהם.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

ייתכן שייקח זמן עד שתתחליל להרגיש טוב יותר. לוקח זמן עד שימושת השפעה מלאה של התרופה, לפעם שבועות או חודשים. כאשר תתחליל להרגיש טוב יותר, הרופא עשוי להמליץ לך להמשיך לנקחת וולבוטרין XR כדי למנוע חזרה של הדיכאון.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקביל למبالغים בלבד הוא טבליה אחת של 150 מ"ג פעמי יום.

הרופא עשוי להעלוות את המנה שלך ל-300 מ"ג פעמי יום אם הדיכאון שלך לא משתפר לאחר מספר שבועות.

קח את מנת טబליות הוולבוטרין XR שלך ב�отך. אין לך לנקחת וולבוטרין XR יותר מאשר אחת ביום.

אין לעבר על המנה המומלצת.

הטבילה מצופה בקיליפה המשחררת באיטיות את התרופה בתוך הגוף. יתכן שתבחן במשהו בצוואה שלך שנראה כמו טבילה. זהה הקיליפה הריקה היוצאת מגוף.

בלע את הטבליות בשלמותן. אין לעוזו אותן, לכתוש אותן או לחצות אותן – אם תעשה זאת, יש סכנת שתיקח מינון יתר, היות והתרופה תשחרר לתוך הגוף מהר מדי. הדבר יגביר את הסבירות שהיו לך תופעות לוואי, כולל התקפים (פרכויסים).

חלק מהאנשים ימשיכו לקחת טבליה אחת של 150 מ"ג בכל יום במשך כל תקופה הטיפול שלהם. יתכן שהרופא רשם זאת אם יש לך בעיות כבד או כלויות.

משך הטיפול

רק אתה והרופא יכולים להחליט כמה זמן עליך לקחת ולבוטרין XR. יתכן שייקחו שבועות או חודשים של טיפול עד שתבחן בשיפור כלשהו. שוחח על התסמנים שלך עם הרופא בקביעות על מנת להחליט במשך כמה זמן תצטרך לקחת אותה. כאשר תתחיל להרגיש טוב יותר, הרופא עשוי להמליץ לך להמשיך לקחת ולבוטרין XR כדי למנוע מהdicauן לחזור.

אם נטלה בטעות מינון גבוהה יותר

אם אתה נטול יותר מדי טבליות, אתה עלול להגביר את הסיכון להתקפים או לפרכוסים. **אל תטעכב.** אם נטלה מנת יתר או אם בטעות בלעILD מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מيون של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרש, המתן וקח את הטבילה הבאה בזמן הרגיל. **אין ליטול מנה כפולת כדי לפצות על המנה שנשכחה.** יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, **אין להפסיק לקחת ולבוטרין XR או להפסיק את המנה ללא התיעצות עם הרופא לפני כן.**

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, **היועץ ברופא או ברוקט.**

הבקבוק סגור עם פקק קשה פתיחה לילדים

הוראות פתיחה: כדי להסיר את הפקק, יש ללחוץ מטה ובו זמנית לסובב שמאליה (נגד כיוון השעון).

הוראות סגירה: יש להניח את הפקק על הקצה הפתוח של הבקבוק ולסובב לכיוון ימין (בכיוון השעון) עד לסגירה מלאה.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בוולבוטרין XR עשוי לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבחן למקרא רשותת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מ一封 אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות התקפים או פרכוסים

כ-1 מכל 1,000 אנשים הנוטלים וולבוטרין XR נמצא בסיכון להתקף (פרכוֹס או עוֹוִית). הסיכוי שזה יקרה גבוה יותר אם אתה לוקח יותר מדי וולבוטרין XR, אם אתה לוקח תרופות מסוימות, או אם אתה נמצא בסיכון גבוה מהריגל להתקפים. אם אתה מודאג, שוחח עם הרופא. אם אתה חווית התקף, ספר לרופא לאחר שתתאושש. **אל תיקח טבליות נוספות.**

תגובה אלרגית

חלק מהאנשים עלולים לפתח תגובה אלרגית לוולבוטרין XR. אלה כוללות:

- עור אדום או פריחה (דומה לסרפת), שלפוחיות או גבשושים מגרדים (חרلات) על העור.
- חלק מהפריחות העוריות עלולות להצריך טיפול בביתחולים, במיוחד אם אתה סובל גם מכאבים בפה או בעיניים.
- צפצופים בלתי רגילים בנשימה או קשי נשימה
- עפפאים, שפטים או לשון נפוחים
- כאבם בשירים או במפרקים
- התמתנות או אובדן הכרה.

אם יש לך סימנים כלשהם של תגובה אלרגית צור קשר עם רופא מיד. **אל תיקח טבליות נוספות.**

תגובות אלרגיות עלולות להמשך זמן רב. אם הרופא רשם משחו שיעזר עם תסמיין אלרגיה, ודא שאתה נוטל את הטיפול עד סופו.

פריחה עורית של לופוֹס (זאבת) או החמרה בתסמיינים של לופוֹס

שכיחות לא ידועה – לא ניתן להעריך את השכיחות מהנתונים הקיימים באנשים הולוקחים לוולבוטרין XR.

לופוֹס הינה הפרעה במערכת החיסון המשפיעה על העור ואיברים אחרים.

← אם אתה חווית התלקחות של לופוֹס, פריחה עורית או נגעים (ביחוד באזורי החשופים לשמש) במהלך ליקוחה של וולבוטרין XR, צור קשר עם הרופא מיד, לאחר שייתכן שהיא צורך להפסיק את הטיפול.

פוסטולוזיס תירחתי מפושטת חריפה (Acute Generalised Exanthematous Pustulosis -AGEP)

שכיחות לא ידועה – לא ניתן להעריך את השכיחות מהמידע הקיים באנשים הlohkim ולבוטרין XR. התסמינים של AGEP כוללים פריחה עם פצעוניים/שלפוחיות מלאי מוגלה. ← אם יש לך פריחה עם פצעוניים/שלפוחיות מלאי מוגלה, צור קשר עם הרופא מיד, לאחר מכן תהיתן שיהיה צורך להפסיק את הטיפול.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות מאוד

אליה עלולות להופיע ב- **יותר מ 1 מכל 10 אנשים**:

- קשהים בשינה. ודא שאתה לוקח ולבוטרין XR בבוקר
- כאב ראש
- יובש בפה
- תחושת בחילה, הקאה.

תופעות לוואי שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 10 אנשים**:

- חום, סחרחות, גרד, הזעה ופריחה בעור (לעתים בשל תגובה אלרגית)
- רעם, חולשה, עייפות, כאבים בחזה
- תחושת חרדה או עצבנות
- כאב בטן או הפרעות אחרות במערכת העיכול (עצירות), שינויים בטעם המזון, אובדן תיאבון (אנורקסיה)
- עליה בלחץ דם לעתים חמורה, הסמקה
- צלצול באוזניים, הפרעות בראייה.

תופעות לוואי שאין שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 100 אנשים**:

- תחושת דיכאון (ראה גם סעיף 2 "ازהרות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה", תחת "מחשבות אובדן ווחמת דיכאון")
 - תחושת בלבול
 - קושי ברכיז
 - קצב לב מוגבר
 - ירידה במשקל.

תופעות לוואי נדירות

אליה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 1,000 אנשים**:

- פרכויסם.

תופעות לוואי נדירות מאוד

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10,000 אנשים:

- דפיקות לב, עילפון
- עויפות, נוקשות שרירים, תנוונות לא נשלחות, בעיות בהליכה או בקואורדינציה
- תחושת חוסר מנוחה, אי שקט, עיניות, תוקפנות, חלומות מוזרים, תחושת עקצוץ או חוסר תחושה, אובדן זיכרון
- הצהבה של העור או של הלובן בעיניך (זהבת) שעלולה להגרם בשל עלייה באנדמי כבד, דלקת כבד (הפטיטיס)
- תגבות אלרגיות חמורות; פריחה יחד עם כאבי מפרקים ושרירים
- שינויים ברמות הסוכר בدم
- השתנה מרובה או פחותה מהרגלי
- אי שליטה במתן שתן (בריחה לא רצונית של שתן, דיליפת שתן)
- פריחות חמורות בעור העולות להופיע בפה ובחלקי גוף אחרים ויכולות להיות מסכנות חיים
- החמרה של פסורייזיס (כתמים מעובדים של עור אדום)
- תחושה של ניתוק מהמציאות או מוזרות (דה פרטונליזציה); ראייה או שמיעה של דברים אשר אינם קיימים (הזיהות); תחושה או אמונה בדברים שאינם נכונים (אשליות); חשנות חמורה (פרמיה).

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה

- תופעות לוואי אחרות הופיעו במספר קטן של אנשים אך שכיחות המדייקת אינה ידועה:
- מחשבות על פגיעה עצמית או מחשבות אובדן זיכרון לקחת וללבוטרין RX או מיד לאחר הפסיקת הטיפול (ראה סעיף 2 "לפני השימוש בתרופה"). אם יש לך מחשבות כאלה, צור קשר עם הרופא או גש לבית חולמים מיד
 - אובדן קשר עם המציגות ואי יכולת לחשב או לשפוט בצורה צלולה (פסיכוזה); תסמנינים אחרים יכולים לכלול הזיות ו/או אשליות
 - תחושה פתאומית של פחד עד (התקף חרדה)
 - גמגומים
 - ירידה במספר תאי הדם האדומים (אנמיה), ירידה במספר תאי הדם הלבנים (לויקופניה) וירידה במספר טסיות הדם (טרומבוציטופניה)
 - ירידה ברמת הנתרן בדם (היפונתרמיה)
 - שינויים במצב הנפשי (לדוגמה אי שקט, היזות, תרדמת), והשפעות אחרות כגון חום גוף מעל 38°C, עלייה בקצב הלב, לחץ דם לא יציב ורפלקסים מוגזמים, נוקשות שרירים, חוסר קואורדינציה ו/או תסמנינים של מערכת העיכול (לדוגמה בחילה, הקאה, שלשול), בעת לקחת וללבוטרין RX יחד עם תרופות לטיפול בדיאנון (כגון פארוקסטין, ציטלופרム, אסציטלופרם, פלאואוקסטין וונלפקסן).

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלוון, عليك להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלתם. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזינה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל- -25°C . יש לאחסן באזינה המקורי כדי להגן מלחות ומאור.
- לשימוש עד 30 ימים מהפתיחה.
- הבקבוק מכיל אטום קטן המכיל פחם וגל סיליקה על מנת לשמור על הטבליות יבשות. השאיר את המכל בבקבוק. אל תבלע אותו.
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביתיית. התייעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאינן בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
הטבלייה מכילה:

Polyvinyl alcohol, glycerol dibehenate.

ציפוי הטבלייה מכיל:

Ethylcellulose, povidone K-90, methacrylic acid ethyl acrylate copolymer dispersion (Eudragit L30 D-55), macrogol 1450, silicon dioxide, triethyl citrate.

די להדפסה:

Shellac glaze, iron oxide black (E172), ammonium hydroxide.

- כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץזה:
טבליות וולבוטרין XR 150 מ"ג הן טבליות עגולות בצבע לבן שמנת עד צהוב חיוור עם הדפס "GS 5FV 150" בדיו שחור על צד אחד והצד השני חלק. הן זמיןות בבקבוקי פוליאתילן לבנים המכילים 7, 30 או 90 (3X30) טבליות. הבקבוק סגור עם פקק קשה פתיחה לילדיים.

טבליות וולבוטרין XR 300 מ"ג הן טבליות עגולות בצבע לבן שמנת עד צהוב חיוור עם הדפס "GS 5YZ 300" בדיו שחור על צד אחד והצד השני חלק. הן זמיןות בבקבוקי פוליאתילן לבנים המכילים 7, 30 או 90 (3X30) טבליות. הבקבוק סגור עם פקק קשה פתיחה לילדיים.

"תכן שלא כל גדי הארץזות משוקיים".

- בעל הרישום: גלקסוסמייטקלין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.
- יצור: בש הלת' קומפניז. INC, מניטובה, קנדה.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
וולבוטרין XR 150 מ"ג: 140-05-31653
וולבוטרין XR 300 מ"ג: 140-06-31654
- לשם השפטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בדצמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיונות של קבוצת החברות של GSK.

© 2023 קבוצת החברות של GSK או הזכיון שלה.