



תאריך: דצמבר 2023

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה

חברת טבע מודיעעה שמשרד הבריאות אישר את העדכוןים הבאים בעלוں לצריך של התכשיט:

Famotidine Teva 40 mg

פמווטידין טبع 40 מ"ג

Tablets

טבליות

שם וכמות החומר הפעיל: **Famotidine 40 mg**

התוויה כפי שאושרה בתעוזת הרישום:

- Treatment of Duodenal Ulcer, Benign Gastric Ulcer, Pathological hypersecretory conditions such as Zollinger-ellison syndrome, Gastroesophageal reflux disease.
- Prevention of relapses of duodenal ulceration.

עדכוניים בעלוון לצריכן

ברצוננו להודיעו שהעלון לצריכן עודכן, עם החזרות כמפורט מטה.

בפירוט שללן כוללים העדכוניים העיקריים בלבד (תוספות מסומנות באדום והסרות מיידע

בטקסט מחוקק:

עלון לצריכן

2. לפני השימוש בתרופה

[...]

בדיקות ומתק

השימוש בפמווטידין טבע 40 מ"ג יכול להשווות סימפטומיים של מחלות נוספת. לפני תחילת השימוש בתרופה יתכן שהרופא יערוך לבר בדיקות על-מנת לאבחן את מצבו הרפואי ולשלול מחלות אחרות. אם אתה נוטל את התרופה במינון גבוה ולאורך זמן ממושך, יתכן שתופנה על-ידי רופאך לבדיקות דם ותפקודי כבד.

תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לךחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- קוטוקונאצול או איטראקונאצול (טיפול בזיתומים פטריתיים). שניתן ליטול קוטוקונאצול פמוטידין שבע-לפחות שעתים לאח-לפני נטילת פמוטידין טبع קוטוקונאצול או איטראקונאצול.
- אספרין ותרופות נאdot-פאביס-אחרות.
- אטازניביר (טיפול בוירוס VII).
- סוכראלפאט (טיפול בכיבים בלבנה), יש ליטול סוכראלפאט לפחות שעתים לאחר נטילת פמוטידין טبع.
- סוטרי חומצה (טיפול בצרבת והפרעות בעיכול). ניתן ליטול פמוטידין טبع שעה או שעתים לפני נטילת סוטרי חומצה.
- פרובניציד (טיפול בשיגdon (גאות)).
- קלצרים קרבונט, אשר משמש כתרופה לרמת פוסfat גבוהה בדם (hyperphosphatemia) למטופילים בדיאליזה.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול פמוטידין טבע 40 מ"ג לפני או אחרי הארוחה

על מנת למנע גורני של מערכות העיכול רצוי להימנע מששתית משקאות המכיליט קפאן (קפה, תה, קקאו וקולה) או משקאות תוססיט, ומאפשרת מזמן הגורט לrk לפאב או לאו-נוחות (כגון: פירות הדר). יש לאכול ארוחות-קטנות יותר וליעתים קרובות יותר. מומלץ לאכול לאט ולבועת את המזון היבש.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתחום הטיפול בתרופה.

הירין והנקה

שלחוועץ-ברופא לפני השימוש בתרופות.

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהירין. חוسبת שאת בhirion או מתכנתת להרות. אם את בהירין בעת נטילת טבע 40 מ"ג, עליך לספר לרופא באופן מיידי. אל תשתמש בתרופה זו כאשר הינך מניקה. פמוטידין עובר לחלב אם. אם את מניקה או מתכנתת להניך, היוועצי עם הרופא לפני נטילת תרופה זו.

[...]

4. תופעות לוואי

[...]

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא או לחדר המיון הקרוב אם:
תופעות לוואי נדירות מאד (rare), תופעות שמופיעות בפחות מושתמש אחד מתוך 10,000:

- אתה סובל - מתגובה אלרגית חמורה לleshai-beur (כגון הכללה פריחה בעור, גירוד או סרפדת, אדמוניות, כיבט-בעור, מראה ערובה) קווצר נשימה, צפופים או קשי נשימה,
- אתה-סובל מהתנופחות של הידיים, הרגליים, של הפנים, השפטים, הלשון הפה, או של העיניים (שעלול להיגרם לקשי נשימה או בליעת)
- הזהבת העור / או של הלבן שבעינים, שtan כהה, צואה בhirah, חוסר תיאבו מתמיש או כאב בطن שיכולים להיות סימנים לבעיות רציניות בכבד
- פריחה עם שלפוחיות חמורה מאוד, עם אייזורים אדומיים כוabiim, לאחר מכן שלפוחיות גדולות ולבסוף kılוף של השכבה העלונה בעור. יתכן שים lr תסמונת סטיבנס-ג'ונסון (Stevens-Johnson syndrome) או תסמונת הנקראת 'טוקסיק אפידרמאל נקרוליזיס' (TEN) שעלולות להיות מסכנות חיים.

- תחושת בעירה בחזה, קוצר נשימה או שיעול עיקש, אלו יכולים להיות סימנים לדלקת ריאות חמורה. בនוסף, תחושת עייפות, כיחלון השפטית או האצבועות או ירידה בمشק
- התכווציות או פרכוים העולים להיות מלאים באובדן הכרה או בצעקות או בתנועות קופצניות, תחושת אזהרה מוקדמת (אורה) לפני ולאחר מכן יתכן בלבול, עייפות או כאב ראש חמור. אם יש לך בעיה בכלiot אתה בסיכון מוגבר לפרקויים
- יש לך חום, פאברגרן
- שינויים בפעולות החשמלית של הלב שנכנית ב-EEG. יתכן שתחש שחרחות. מטופלים
- שקיבלו את התroppה בזירה חוו שיר לחץ בחזה, אי סדרות או ירידת שינויים בקצב פעימות הלב או פעימות לב לא סדירות
- אתה סובל מעייפות או מחולשה בלתי-רגילה
- יש לך דימום בלתי-רגיל
- יש לך בעיות בכבד האגרומוט לחילה, להகאות, לאובדן תפאה, להרגשה כללית לא-טובה, לחום, לגדוד, להצחבות העור ו/או העינש (צחבת) ולשתן לצבע פהה
- יש לך דלקת ריאות
- יש לך עישותות (נדיר מאוד), במיוחד במטופלים עם בעיות בכלiot
- תופעות אלו הן נדירות וריציניות יותר, ויתכן שיידרש פיקוח רפואי-דחוף או אשפוז.

ש להפסיק את השימוש בתroppה ולפנות מיד לרופא אם:

- תופעות לוואי נדירות מאוד (rare vary), תופעות שמוויות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000:
- עליה במספר הזרים. יתכן התסמים הבאים: חום, צמרמות חמורה, כאב גרון או כאבים בפה (יכול להיות סימן לירידה בכמות תא הדם הלבנים)
 - ספירה נמוכה, תתכן תחושה של עייפות, קוצר נשימה, תחושת קור בידיים וברגליים וחווון עורי (מספר נמוך של כדוריות דם אדומות). חבלות יוצאות דופן או דימום בקלות הרבה יותר מהרגיל וקושי להחלים לאחר חתר (מספר טסיות נמוך)
 - דיכאון, בלבול, חוסר התמצאות למרחב, חרדה או עצבנות, היזות (ראיה, שמיעה ותחושה של דברים שאינם אמיתיים)

ש לפנות לרופא פסיד אם:

- יש לך טשטוש ראייה
- יש לך לחילה, הקאות, כאב בטן וטיפחות, יובש בפה ובעור, אובדן תיאבון
- אתה סובל מעייפות, מנמנמת, מישננות
- יש לך כאבי שריריים ומפרקתיים, התכווציות שריריות
- יש לך היזות, בלבול, חוסר שקט, דיכאון, חרדה, אינטולת להירדק
- יש לך תחושת עקצציות באצבועות הרגליים או הדסם
- אתה סובל מירידה בתפקוד או בדחף המפי
- יש לך הפרעות בחוש הטעם
- יש לך זמצומים באזניים
- יש לך הצעות יתרכז
- יש לך דלדול או נשירת שער-חריגת

תופעות לוואי נוספת

[...]

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon), תופעות שמוויות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000:

- יובש בפה
- תחושת עייפות לא-רגילה
- בחילה והקאה, אובדן תיאבון, שינוי בחוש הטעם, גזים, נפיחות
- גרד בעור או פריחה



תופעות לוואי נדירות (rare) תופעות ש郿יפות ב 10-1 מטופלים מתוך 10,000:

- עליה במספר אנזימי הכבד דם, נצפה בבדיקות דם
- צמיחה שדים בגברים (לא ידוע בוודאות האם תופעת הלואוי זהו גרםת על-ידי שימוש במופטידון)

תופעות לוואי נדירות מאוד (vary rare), תופעות ש郿יפות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000:

- קשה להגעה לזמן ממושכת או ירידה בחשך המין
- עקבוצים או חוסר תחושה באצבעות הידיים או הרגליים
- נדודי שינה, נמנום
- כאבים בחזה
- שינויים בדם של אנזימי כבד, הנצפה בבדיקות דם
- נשירת שיער
- כאבי מפרקים או התכווצויות שרירים

העלון לצרכן נשלח לפרסום במאגר התרופות באתר האינטרנט של משרד הבריאות
וניתן לקבלו מודפס על-ידי פניה לחברת טבע.
<https://israeldrugs.health.gov.il>