

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986
يُسوّق الدواء بدون وصفة طبيب

سبوسيل مستعلق

المادة الفعالة وتركيزها

يحتوي كل 1 ملل على:

selenium sulfide 25 mg

(سيلينيوم سولفيد 25 ملغ)

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية في المستحضر: انظر الفصل 2 البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

يجب عليك استعمال المستحضر بحسب التعليمات الواردة في بند المقدار الدوائي في هذه النشرة. قم باستشارة الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

إذا لم يطرأ تحسن على حالتك أو إذا تفاقمت حالتك بعد/خلال العلاج الموصى به، يجب التوجه للطبيب.

1. لم أعد هذا الدواء؟

لعلاج القشرة، التهاب الجلد المتهي (seborrheic dermatitis) في فروة الرأس والسعفة المبرقشة (tinea versicolor).

المجموعة العلاجية: مضاد للفطريات.

يعمل المستحضر ضد القشرة بطريقتين:

- عن طريق تقليل دهنية فروة الرأس.
- عن طريق إبطاء نمو طبقة خلايا الجلد الموجودة على فروة الرأس والتي تسبب القشرة.

2. قبل استعمال الدواء

يمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (سيلينيوم سولفيد) أو لأحد مركبات الدواء الأخرى (انظر الفصل 6).
- وجد لديك تشقق في الجلد، عدوى جلدية أو التهاب جلدي شديد في مكان العلاج، لأن ذلك قد يؤدي إلى امتصاص سيلينيوم سولفيد في الدم.

تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء

- تجنب من ملامسة الدواء للعينين. إذا دخل الدواء عن طريق الخطأ إلى العينين – اغسل العينين فوراً مع الكثير من الماء البارد.
- سبوسيل معد للاستعمال الخارجي فقط. سبوسيل غير معد للبلع أو الأكل.
- لا تترك الدواء يتلامس مع الشعر أو الجلد لفترة أطول من الفترة الموصى بها. هذا الأمر ممكن أن يسبب إلى تهيج، لشعور بالحرقة أو لظهور حويصلات. كذلك، لا تستعمل في أحيان متقاربة أكثر من الموصى به.
- عليك قبل الاستعمال نزع المجوهرات المصنوعة من الذهب، الفضة ومن معادن أخرى لأن هذا الدواء ممكن أن يسبب إلى تغيير في لونها.
- اغسل جيداً الدواء عن الشعر قبل صبغ الشعر، وضع ألوان، تمويح الشعر أو تلميس كيميائي. يمنع استعمال هذا الدواء يومين قبل أو بعد أحد علاجات الشعر هذه.
- انزع دبابيس الشعر قبل الاستعمال وتجنب ملامسة المادة مع أسطح معدنية.

الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير معد للرضع والأطفال. لم يتم فحص السلامة والنجاعة لدى الأطفال.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإرضاع

يُمنع استعمال الدواء إذا كنت حاملاً، تظنين أنك حامل أو مرضعةً.
يجب أن تستشير الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين أنك حامل أو تخططين للحمل.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي سبوسيل على پرابينات (ميثيل پارابين وپروپيل پارابين)، والتي قد تسبب ردود فعل تحسسية (ربما متأخرة).

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالمقدار الدوائي وبطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج المُتَّبعة، عادة، هي:

لعلاج السُّعفة الميرقشة (*tinea versicolor*):

1. ادهن على المنطقة المُصابة، وارغيبها مع القليل من الماء.
2. اترك الدواء على الجلد تقريباً 10 دقائق.
3. اغسل جيداً.
4. كرر العملية مرّة في اليوم لمدة أسبوع.

لعلاج قشرة الرأس والتهاب الجلد المني:

1. افرك كمية صغيرة (5-10 ملل) من المستعلق على فروة الرأس الرطبة.
2. اتركه على فروة الرأس لمدة 2 حتى 3 دقائق.
3. اغسل فروة الرأس جيداً.
4. كرر العملية واغسل جيداً.
5. بعد العلاج اغسل يديك جيداً.
6. قم بتنفيذ العلاج المذكور أعلاه مرتين في الأسبوع لمدة أسبوعين ومن ثم مرة كل أسبوع-أسبوعين أو مرة كل بضعة أسابيع. في كل حالة يُمنع استعمال المادة أكثر من مرتين في الأسبوع.

يُمنع تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

هذا الدواء غير مخصّص للأطفال وللأطفال.

إذا لم يحدث تحسن في حالتك أو إذا تفاقت حالتك بعد/خلال العلاج الموصى به، يجب التوجه للطبيب.

يُمنع البلع! هذا الدواء معدّ للاستعمال الخارجي فقط.

يجب خض القنينة قبل الاستعمال.

يجب تجنّب التلامس مع العينين و/أو أنسجة مخاطية.

إذا ابتلعت كمية من الدواء عن طريق الخطأ، أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجّه، فوراً، إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبه الدواء معك. ابتلاع سبوسيل ممكن أن يُسبب غثياناً أو تقيؤاً.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقّق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرّة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبّب استعمال سبوسيل أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتدهش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أيّ منها.

أعراض جانبية نسبة شيعها غير معروفة (أعراض لم يتمّ تحديد توأترها بعد)

- رد فعل تحسسي مثل طفح جلدي أو شرى.
- تهيج أو حساسية في الجلد أو في فروة الرأس، يتم وصفها أحياناً كشعور بالحرقه.
- تزايد تساقط الشعر.
- تغير في لون الشعر، الذي يمكن تجنبه من خلال غسل الشعر بصورة جيدة بعد العلاج.
- زيادة دهنية أو جفاف الشعر وفروة الرأس.
- في أحيان نادرة ممكن ظهور حويصلات، خاصة إذا كان الدواء يتلامس مع الشعر أو مع الجلد لفترة أطول من الفترة الموصى بها.
- تهيج في العينين، تآكل القرنية (ألم في العين، احتقان الدم وعمى مؤقت) - قد تظهر نتيجة تعرّض العينين لسبوسيل.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية:

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية جراء علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير في الشهر ذاته.
- شروط التخزين: يجب التخزين تحت الـ 25°C.
- مدة الصلاحية بعد فتح المستحضر: 12 شهراً.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلة المهملات. اسأل الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. إن ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية:

إضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء، أيضاً:

Sodium lauryl ether sulfate, aluminum magnesium silicate, sodium dihydrogen phosphate dehydrate, cocamide DEA, sodium chloride, citric acid anhydrous, fragrance (I.F.F. #9138) herbal, titanium dioxide, methyl paraben, captan, propyl paraben, purified water

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

مستعلق بلون برتقالي معبأ في قنينة بلاستيكية ذات 30 أو 100 غرام. قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

المنتج وصاحب التسجيل:

تارو للصناعة الدوائية م.ض.، شارع هكيتور 14، خليج حيفا 2624761

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

01679.21210

تم تحريرها في كانون الأول 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.

لمعلومات إضافية حول المستحضر والنشرات المحدثّة باللغات العبرية، العربية والإنجليزية، امسحوا الكود التالي:

For further information about the medicinal product and for updated patient leaflets in Hebrew, Arabic and English, please scan the code:



<https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/016%2079%2021210%2000>

يمكن التوجه إلى صاحب التسجيل للمستحضر لطلب الحصول على نشرة مطبوعة للمستهلك باللغة الإنجليزية على عنوان البريد الإلكتروني Info@taro.com أو عن طريق رقم الهاتف 1-800-464-664.

For a printed copy of the patient information leaflet in English, please contact the registration holder by email Info@taro.com or by phone 1-800-464-664.