

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

בקסרו

תרחיף להזרקה בمزוק מוכן לשימוש

כל מנתה (0.5 מ"ל) מכילה:

ארבעה חלבוניים רקובומבייננטיים מחידק הניסרית מנינגיטיס מקבוצה B:

- | | |
|--------------|---|
| 50 מיקרוגרים | - Recombinant <i>Neisseria meningitidis</i> group B NHBA fusion protein |
| 50 מיקרוגרים | - Recombinant <i>Neisseria meningitidis</i> group B NadA protein |
| 50 מיקרוגרים | - Recombinant <i>Neisseria meningitidis</i> group B fHbp fusion protein |
| 25 מיקרוגרם | - Outer membrane vesicles (OMV) from <i>Neisseria meningitidis</i> group B strain NZ98/254 measured as amount of total protein containing the PorA P1.4 |

לרשימת החומרם הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 - " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - " מידע נוספת".
קרא בעיון את העلون עד סוףו בטרם אתה או ילך תשמשו בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פונה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורה או עבור הילד. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

חיסון פעיל החל מגיל חודשיים ומעלה כנגד מחלת מנינגוקוקית פולשנית הנגרמת על ידי חיידק הניסרית מנינגיטיס (*Neisseria meningitidis*) מקבוצה B.

קבוצתית:
חיסון מקבוצת המNINGOKOKYL מסוג B.

בקסרו מכיל ארבעה רכיבים שונים מפני השטח של חיידק הניסרית מנינגיטיס (*Neisseria meningitidis*) מקבוצה B. חיידק זה עלול לגרום לziehomiים חמוריים ולעיטיות מסכני חיים, כגון דלקת קרום המוח (דלקת של מעטפת המוח וחוט השדרה) וספסיס (אלהם דם). החיסון פועל על ידי גירוי ספציאפי של מערכת החיסון הטבעית של המתחسن ובכך נותן הגנה נגד המחלת.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה או ילדר או רגישיים (אלרגיים) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).

ażhorot miyadot haengutot li shirush batrufa

לפני הטיפול בקסרו ספר לרופא אם:

- לך או לילדך יש זיהום חמוץ עם חום גבוה. במצב זה, החיסון יידחה. במקרה של זיהומים קלימים, כגון צינון, לא יהיה צורך לדוחות את החיסון, אולם יש לדבר עם הרופא או האחות תחילת.
- לך או לילדך יש המופilia או כל בעיה אחרת אשר עלולה למנוע מהדם להיקrush כראוי, כגון טיפול במדלי דם (נוגדי קריישה). דבר עם הרופא או האחות תחילת.
- אתה או לילדך מטופלים בתרופה כגון אקווליזומאב, אשר חוסמת את פעילותה של מערכת המשלימים, מהוות חלק מערכת החיסון. אתה או לילדך נמצאים בסיכון גבוה לחЛОות במהלך הנגרמת על ידי חידק ניסריה מנינגייטיס מקבוצה B, על אף שאתה או לילדך חוסנתם עם בקסרו.
- הילד שלך נולד לפני הזמן (לפני או בשבוע 28 של ההריון), במיוחד אם היו לו קשיי נשימה. הפסקת נשימה או נשימה לא סדירה במשך זמן קצר עלולה להיות שכיחה יותר בשלושת הימים הראשונים לאחר החיסון בתינוקות אלה, וייתכן שזדקרו לעקב מיום אחד.
- לך או לילדך יש אלרגיה לאנטיביוטיקה קנמייצין. אם אכן קיימת, רמת הקנמייצין בחיסון גבוהה. אם לך או לילדך עשויה להיות אלרגיה לקנמייצין, דבר תחילת עם הרופא או האחות.

טלפון, תחושים עליפון או תגבות אחרות הקשורות לחץ עשויות להתרחש כתגובה לכל זריקה עם מחת. ספר לרופא או לאחות אם חוות תגובה צזו בעבר.

אין מידע על שימוש בקסרו במוגרים מעל גיל 50 שנים. ישנו מידע מוגבל לגבי השימוש בקסרו בחולים עם מצב רפואי כרוני או עם מערכת חיסון מוחלשת. אם לך או לילדך יש מערכת חיסון מוחלשת (למשל כתוצאה שימוש בתרופות המדכאות את מערכת החיסון או זיהום HIV או פגם תורשתי במערכת החיסון הטבעית של הגוף), ניתן כי יעילות בקסרו תהיה פחותה.

בדומה לכל חיסון אחר, ניתן כי בקסרו לא יגן באופן מלא על כל מי שמתיחסן.

aintrakziot/tgobot bain torufiot

אם אתה לוקח או אם תקח לאחרונה **תרופות אחרות**, כולל **תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה**, ספר על כך לרופא או לרוקח.

ספר לרופא או לאחות אם אתה או לילדך לוקחים או תקחتم לאחרונה או עשויים לחתת **תרופות אחרות** כלשהן או אם קיבלתם לאחרונה כל חיסון אחר.

בקסרו יכול להיגן באותו הזמן עם כל אחד ממרכיבי החיסון הבאים: דיפטריה, טטנוז, שעלת, המופילוס אינפלואנציה ס, פוליו, דלקת כבד B, פנמאוקוקוס, חצבת, חזרת, אדמת, אבעבועות רוח ומניגוקוקוס A, C, W, Y. דבר עם הרופא או האחות מידע נוסף.

כאשר בקסרו ניתן באותו הזמן עם חיסונים אחרים, יש לתת אותו באתר הזרקה נפרדים. ייתכן כי הרופא או האחות יבקש מך לתת לידך תרופות אשר מורידות את החום בזמן ולאחר המתן של בקסרו. הדבר יעזור להקטין חלק מתופעות הלוואי של בקסרו.

הירין והנקה

אם את בהירין או מניקה, חשוב שיתacen שאת בהירין או אם את מתכנת להרות, התיעצץ עם הרופא לפני שבקסרו ניתן לך. ייתכן שהרופא עדין ימליץ שתקבלי בקסרו אם את בסיכון לחסיפה לווירום מנינגוקוקי.

נהיגה ושימוש במכונות

לבקסרו אין השפעה או יש השפעה זניחה על היכולת לנוהג ולהפעיל מכונות. עם זאת, חלק מהתופעות המוזכרות בסעיף 4 "טופעות לוואי" עלולות להשפיע באופן זמני על היכולת לנוהג או להפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התכשיר מכיל פחת מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לפחות, כלומר הוא מוגדר כתכשיר "לא נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

בקסרו (0.5 מ"ל) ניתן לך או לידיך על ידי רופא או אחות. הוא יזרק לתוך השיר, בדרך כלל בירך אצל תינוקות או בזרוע העליונה אצל ילדים, מתבגרים ומבוגרים.

חשוב לעקוב אחר הוראות הרופא או האחות על מנת שאתה או לידיך תשלימו את כל סדרת הזריקות.

המינון המקובל הוא:

תינוקות בגילאי 2 עד 5 חודשים בזמן מנת המנה הראשונה
הילד שלו קיבל סדרה התחלתית של שתיים או שלוש זריקות חיסון ולאחריה מנת נוספת (מנת דחף).

- האזיקה הראשונה ניתנת לא מוקדם מגיל חודשים.
- אם ניתנות שלוש זריקות ראשוניות, המרווח בין הזריקות יהיה לפחות חודש אחד.
- אם ניתנות שתי זריקות ראשוניות, המרווח בין הזריקות יהיה לפחות חודשים.

- מנת דחף תיננתן בין גילאי 12 ל-15 חודשים, לאחר מרוחה של לפחות 6 חודשים מהזריקה האחרונה של הסדרה ההתחלתית. במקרה של עיכוב, אין לתת את מנת הדחף יאוחר מגיל 24 חודשים.

תינוקות בגילאי 6 עד 11 חודשים בזמן מתן המנה הראשונה
תינוקות בגילאי 6 עד 11 חודשים יקבלו שתי זריקות חיסון ולאחריה מנה נוספת (מן דחף).

- המרווח בין הזריקות יהיה לפחות 2 חודשים.
- מנת הדחף תיננתן בשנה השנייה לחיים, לאחר מרוחה של לפחות 6 חודשים מהזריקה השנייה.

ילדים בגילאי 12 עד 23 חודשים בזמן מתן המנה הראשונה
ילדים בגילאי 12 עד 23 חודשים יקבלו שתי זריקות חיסון ולאחריה מנה נוספת (מן דחף).

- המרווח בין הזריקות יהיה לפחות 2 חודשים.
- מנת הדחף תיננתן לאחר מרוחה של 12 עד 23 חודשים מהזריקה השנייה.

ילדים בגילאי 2 עד 10 שנים בזמן מתן המנה הראשונה
ילדים בגילאי 2 עד 10 שנים יקבלו שתי זריקות חיסון.

- המרווח בין הזריקות יהיה לפחות 2 חודשים.
ייתכן שילדך יקבל זריקה נוספת (מן דחף).

מתבגרים ומבוגרים מגיל 11 שנים בזמן מתן המנה הראשונה
מתבגרים (מגיל 11 שנים) ומבוגרים יקבלו שתי זריקות חיסון.

- המרווח בין הזריקות יהיה לפחות 2 חודשים.
ייתכן שתקבל זריקה נוספת (מן דחף).

מבוגרים מעל גיל 50 שנים
לא קיימם מידע לגביminsimum במבוגרים מעל גיל 50 שנים. התיעץ עם הרופא האם ישנה תועלת עבורם בקבלה בקורסו.

אין לעבר על המנה המומלצת.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווות והמנה בכל פעמי שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקת.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקסרו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשות תופעות הלואוי. ייתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

כאשר בקסרו ניתן לך או לילדך, תופעות הלואוי שכיחות מאוד (עלולות להופיע ביותר משימוש אחד מעשרה) שאיתה או יליך (דוחה בכל קבוצות הגיל) עלולים לחוות הם:

- כאב/רגישות במקום ההזרקה, אדמומיות העור במקום ההזרקה, נפיחות בעור במקום ההזרקה, התקשות העור במקום ההזרקה.

תופעות הלואוי הבאות עשויה גם להתרחש לאחר קבלת החיסון.

תינוקות וילדים (עד 10 שנים)

תופעות לוואי שכיחות מאוד

אליה עלולות להופיע ב- יותר מ-1 מכל 10 אנשים:

- חום (38 מעלות צלזיוס ומעלה)

- אובדן תיאבון

- רגישות במקום ההזרקה (כולל רגישות חמורה במקום ההזרקה שעלולה לגרום לבכי בעת היזמת האיבר שבו הזרק החיסון)

- כאבים במפרקים

- פריחה בעור (ילדים בגיל 12 חודשים עד 23 חודשים) (לא שכיח לאחר זריקת דחף)

- ישנוניות

- תחרשת עצבנות

- בכיה לא רגיל

- הקאה (לא שכיח לאחר זריקת דחף)

- שלשול

- כאב ראש

תופעות לוואי שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים:

- פריחה בעור (תינוקות וילדים בגילאים 2 עד 10 שנים)

תופעות לוואי שאין שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 100 אנשים:

- חום גבוה (40 מעלות צלזיוס ומעלה)

- פרכוסים (כולל פרכוסי חום)

- עור יבש

- חיוורון (נדיר לאחר זריקת דחף)

תופעות לוואי נדירות

אליה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 1000** אנשים:

- מחלת קואסטי העשויה לכלול תסминים כגון חום הנمشך יותר מחמשה ימים, המלווה בפריחה בעור על מרכז הגוף, ולעתים מלאה בהתקפות עור הידים והאצבעות, נפיחות בבלוטות הצואר, ועיניהם, שפתיהם, גרון ולשון אדומים.
- גרד בעור, פריחה בעור

מתבגרים (מגיל 11 שנים) ומבוגרים

תופעות לוואי שכיחות מאוד

אליה עלולות להופיע ב- **יותר מ-1 מכל 10** אנשים:

- כאב במקום ההזרקה הגורם לחוסר יכולת לבצע פעולות יומיות רגילות
- כאב שרירים ומפרקים
- בחילה
- תחושה כללית לא טובה
- כאב ראש

תופעות לוואי נוספות:

בלוטות לימפה מוגדלות.

תגובה אלרגיות העשויה לכלול נפיחות חמורה של השפתיים, פה, גרון (העלולה לגרום לקשיים בבליעת), קשיי נשימה המלווים בצפיפות או שייעול, פריחה, איבוד הכרה ולחץ דם נמוך מאוד.

התמוטטות (חולשת שרירים פתאומית), יכולת תגובה ירודה מהרגיל או חוסר ערנות, חיורון או עור בצעע כחחל בילדים צעירים. תחושת עילפון או עילפון.

פריחה בעור (במתבגרים מגיל 11 שנים ובמבוגרים).

חום (במתבגרים מגיל 11 שנים ובמבוגרים).

תגובה באטר ההזרקה כגון נפיחות נרחבת של האיבר שחוסן, שלפוחיות במקום או סביב אזור ההזרקה וגושים קשים באזור ההזרקה (היכולים להישאר יותר מחודש).

קשיון בצוואר או רגשות לא נעימה לאור (פוטופוביה), המצביעות על גירוי מנינגיאלי, דווחו באופן ספורדי זמן קצר לאחר ההתחסנות. תס敏ים אלו היו קלים וחולפים.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה לעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי לשדר הביריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המכוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה ל קישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחה ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין לשימוש בתרופה אחרי התגובה (exp. date) המופיע על גבי האזינה ותוויות המזרק. תאריך התגובה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן בקירור (2°C - 8°C). אין להקפיא.
- יש לאחסן באזינה המקורית על מנת להגן מאור.
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביתית. התייעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sucrose, sodium chloride, aluminium hydroxide, histidine and water for injections.

- כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה:
בקסרו הינו תרחיף להזרקה במזרק המוכן לשימוש. התרחיף הינו נולך לבן אטום. גגלי אזינה: מזרק אחד או עשרה מזרקים עם או בלי מחתמים. ייתכן שלא כל גגלי האזינה מסווקים.
- בעל הרישום: גלקסומיתקלין (ישראל) בע"מ, רח' בל"ז 25, פתח תקווה.
- יצרן: GSK חיסונים I.r.S., סיינה, איטליה.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 155-59-34399
- שם הפשטות ולהקלת הקראיה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בנובמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינות של קבוצת החברות של GSK.

© 2023 קבוצת החברות של GSK או הזכיון שלה.

The following information is intended for healthcare professionals only:

Upon storage a fine off-white deposit may be observed in the pre-filled syringe containing the suspension.

Before use, the pre-filled syringe should be well shaken in order to form a homogeneous suspension.

The vaccine should be visually inspected for particulate matter and discolouration prior to administration. In the event of any foreign particulate matter and/or variation of physical aspect being observed, do not administer the vaccine. If two needles of different lengths are provided in the pack, choose the appropriate needle to ensure an intramuscular administration.


Do not freeze.

Bexsero must not be mixed with other vaccines in the same syringe.

Should concomitant administration of other vaccines be necessary, vaccines must be administered at separate injection sites.


Care must be taken to ensure that the vaccine is injected intramuscularly only.

Instructions for the pre-filled syringe



Hold the syringe by the barrel, not by the plunger.

Unscrew the syringe cap by twisting it anticlockwise.



To attach the needle, connect the hub to the Luer Lock Adaptor and rotate a quarter turn clockwise until you feel it lock.

Do not pull the syringe plunger out of the barrel. If it happens, do not administer the vaccine.

Disposal

Any unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

Bex PT V3A