

نشرة المستهلك وفقاً لأنظمة الصيادلة (مستحضرات) لعام 1986
يُسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

إرلوتنيب إس.كي 25 ملغ أقراص مغلفة
يحتوي كل قرص مغلف على:

إرلوتنيب (إرلوتنيب على شكل هيدروكلوريد) 25 mg

إرلوتنيب إس.كي 100 ملغ أقراص مغلفة
يحتوي كل قرص مغلف على:

إرلوتنيب (إرلوتنيب على شكل هيدروكلوريد) 100 mg

إرلوتنيب إس.كي 150 ملغ أقراص مغلفة
يحتوي كل قرص مغلف على:

إرلوتنيب (إرلوتنيب على شكل هيدروكلوريد) 150 mg

للقائمة المواد غير الفعالة، انظر القسم 6 "معلومات إضافية". انظر أيضاً القسم 2.8 "معلومات مهمة حول بعض مركبات الدواء".

اقرأ هذه النشرة بعناية حتى نهايتها قبل استخدام الدواء.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن إرلوتنيب إس.كي. إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي
- ووصف هذا الدواء من أجلك فقط. لا تطهه للأخرين. فهو قد يضرهم، حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية تشبه حالتك.
- هذا الدواء غير مخصص للأطفال والمرأهفين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

1. ما هي دواعي استخدام الدواء؟

إرلوتنيب إس.كي مخصص لعلاج البالغين في الحالات التالية:

- سرطان الرئة المتقدم من النوع NSCLC (سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة Non-Small Cell Lung Cancer)؛ علاج الخط الأول لدى المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة المتقدم من نوع NSCLC إذا كانت الخلايا السرطانية تشير لوجود طفرات في EGFR
- العلاج الوقائي للمرضى الذين يعانون من سرطان الرئة المتقدم NSCLC إذا كانت الخلايا السرطانية تشير لوجود طفرات في EGFR وظل مرضك باغليه دون تغيير بعد العلاج الأولي بالعلاج الكيميائي.
- علاج المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة المتقدم من نوع NSCLC إذا فشل علاج سابق بالعلاج الكيميائي في إيقاف المرض.
- علاج المرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس في مرحلة متقدمة أو نقيلي مدمجاً مع العلاج الدوائي التقليدي (gemcitabine)

الفصيلة العلاجية: مضادات الأورام، مثبطات التيروزين كينيز

2. قبل استخدام إرلوتنيب إس.كي
منع استخدام إرلوتنيب إس.كي في حال:

– كنت تعاني من حساسية (فرط تحسس) لأي من مكونات إرلوتنيب إس.كي (انظر القسم 6 "معلومات إضافية" للاطلاع على القائمة الكاملة لمكونات إرلوتنيب إس.كي).

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام إرلوتنيب إس.كي
قبل بدء العلاج بـ إرلوتنيب إس.كي، أخبر طبيبك إذا:

- كنت تتناول أدوية أخرى قد تخفيض أو تزيد من مستوى إرلوتنيب إس.كي في الدم أو قد تؤثر على فعالية الدواء (على سبيل المثال: الأدوية المضادة للغطرسات مثل كيتوكونازول، مثبطات الأنزيم البروتيني بروتيلز، إريثروميسين، كلاريثروميسين، فينيتوين، كاربامازيبين، الباربิตورات، ريفامبيسين، سيفروفلوكساسين، أومبيرازول، رانيتيدين، نبتة سانت جون أو مثبطات البروتوزوم). في بعض الحالات، يمكن لهذه الأدوية أن تقلل من فعالية إرلوتنيب إس.كي أو تزيد من تأثيراته الجانبية، وسيتعين على الطبيب تعديل جرعتك. قد يمنع الطبيب إعطاءك هذه الأدوية أثناء تناول إرلوتنيب إس.كي.
- إذا كنت تتناول مضادات التخثر (أدوية تمنع تختثر الدم أو تجلط الأوردة مثل وارفارين)، فقد يتسبب إرلوتنيب إس.كي في بالميل للإصابة بالنزف. سيحتاج الطبيب إلى إجراء فحوصات دم دورية للك.
- إذا كنت تتناول الستاتينات (أدوية لخفض نسبة الكوليسترول في الدم)، فقد يتسبب إرلوتنيب إس.كي في حدوث آلام في العضلات، والتي قد تؤدي في حالات نادرة إلى انيهار العضلات (انحلال الريبيات) مما قد يؤدي إلى تضرر الكل.
- إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة و/أو إذا كان لديك تاريخ من مشاكل في العين مثل الجفاف الشديد في العين، أو الالتهابات أو التقرحات في الجزء الأمامي

لمزيد من المعلومات، راجع قسم "التدخلات الدوائية / التفاعلات بين الأدوية"

أخبر طبيبك إذا:

- إذا كنت تعاني من صعوبة مفاجئة في التنفس مع السعال أو الحمى، لأن الطبيب قد يعطيك أدوية أخرى ويوقف العلاج بـ إرلوتينيب إس.كي
- إذا كنت تعاني من الإسهال، فقد يعطيك الطبيب دواء مضاداً للإسهال (مثل لوبراميد)
- على الفور، إذا عانيت من إسهال شديد أو طول الألم، أو غثيان، أو فقدان للشهية أو تقيؤ، حيث قد يوقف طبيبك علاجك بـ إرلوتينيب إس.كي ويعالجك في المستشفى
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد. يمكن أن يسبب إرلوتينيب إس.كي مشاكل خطيرة في الكبد وفي بعض الحالات الوفاة. قد يطلب منك الطبيب إجراء فحوصات دم أثناء تناول إرلوتينيب إس.كي.
- إذا كنت تعاني من آلام شديدة في المعدة، أو تقرحات جلدية شديدة أو تقرح في الجلد. قد يوقف الطبيب العلاج بشكل مؤقت أو دائم.
- إذا كنت تعاني من ظهور سريع / حاد أو تفاقم احمرار والم في العينين، أو دموع في العين، أو عدم وضوح الرؤية و / أو حساسية للضوء، فتوجه إلى الطبيب أو المرضرة على الفور، حيث قد تحتاج إلى علاج عاجل (انظر قسم "تأثيرات الجانبية" لاحقاً في النشرة).
- إذا كنت تتناول عقاقير مخفضة للكوليستيول وتعاني من آلام عضلية غير مبررة، أو الم في العضلات عند اللمس، أو ضعف أو تشنجات عضلية. قد يوقف الطبيب العلاج.

لمزيد من المعلومات، انظر القسم 4 "تأثيرات الجانبية"

أمراض الكبد أو الكلى

من غير المعروف ما إذا كان عقار إرلوتينيب إس.كي له تأثير مختلف في الحالات التي لا يعمل فيها الكبد أو الكلى بشكل طبيعي. لا ينصح بالعلاج بـ إرلوتينيب إس.كي إذا كنت تعاني من مرض كبدي حاد أو مرض كلوي حاد

اضطراب التمثيل الغذائي المرتبط بالجلوكورونيد مثل متلازمة جيلبرت

يجب أن يعالجك الطبيب بحذر إذا كنت تعاني من اضطراب استقلابي متعلق بالجلوكورونيد (متلازمة جيلبرت Gilbert's syndrome) مثل اضطراب الجلوكورونيد (Glucuronidation disorder).

التدخين

يوصى بالتوقف عن التدخين أثناء العلاج بـ إرلوتينيب إس.كي لأن التدخين قد يقلل من كمية الدواء في الدم.

الأطفال والمراهقون

لم تتم دراسة إرلوتينيب إس.كي على المرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. العلاج بهذا الدواء غير مخصص للأطفال والمراهقين.

التدخلات الدوائية / التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تتناولت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو المكمالت الغذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي.

استخدام إرلوتينيب إس.كي والطعام

لا تتناول دواء إرلوتينيب إس.كي مع الطعام (انظر القسم 3 "كيفية استخدام الدواء").

الحمل والرضاعة

يجب تجنب الحمل أثناء العلاج بـ إرلوتينيب إس.كي. إذا كنت في سن الإنجاب وقد تصبحين حاملاً، فيجب عليك استخدام وسيلة فعالة لمنع الحمل خلال فترة العلاج ولمدة أسبوعين على الأقل بعد تناول آخر قرص.

إذا أصبحت حاملاً أثناء العلاج بـ إرلوتينيب إس.كي، يجب عليك إبلاغ الطبيب على الفور، حتى يتمكن من تحديد ما إذا كان من الممكنمواصلة العلاج. لا ترضعي أثناء العلاج بـ إرلوتينيب إس.كي ولمدة أسبوعين على الأقل بعد تناول آخر قرص.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو تعتقدين بأنك حامل أو تخططيين للحمل، استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء.

السياقة وتشغيل الماكائن

لم تتم دراسة تأثيرات إرلوتينيب إس.كي المحتملة على القدرة على القيادة أو استخدام الآلات. ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤثر العلاج باستخدام إرلوتينيب على هذه القدرات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي إرلوتينيب إس.كي على اللاكتوز. إذا أخبرك طبيبك أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، فاستشر طبيبك قبل تناول الدواء. يحتوي إرلوتينيب إس.كي على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (أقل من 23 ملليغرام) لكل قرص، وبالتالي فإنه يعتبر عملياً خالياً من الصوديوم.

3. كيفية استخدام إرلوتنيب إس.كي

يجب دائمًا استخدام إرلوتنيب إس.كي وفقًا لتعليمات الطبيب.

عليك الاستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة أو من طريقة تناول المستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

يجب تناول الدواء قبل الأكل بساعة على الأقل أو بعد الأكل بساعتين

لعلاج سرطان الرئة: الجرعة المقبولة عادة هي قرص واحد في اليوم من إرلوتنيب إس.كي 150 ملجم.

لعلاج سرطان البنكرياس الناقلي: الجرعة المقبولة عادة هي قرص واحد في اليوم من إرلوتنيب إس.كي 100 ملجم. سيتم إعطاء عقار إرلوتنيب إس.كي مع العلاج الدوائي المقصود لهذا المرض (gemcitabine).

يمكن للطبيب أن يعدل جرعتك بزيادات قدرها 50 ملجم. لبرامج العلاج المختلفة، يتوفّر عقار إرلوتنيب إس.كي بجرعات 25 ملجم أو 100 ملجم أو 150 ملجم.

السحق / التقسيم / المضغ

لا توجد معلومات بخصوص سحق/ تقسيم/ مضغ القرص

لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا تناولت بالخطأ جرعة أعلى مما يجب من إرلوتنيب إس.كي

إذا تناولت أكثر مما يجب من إرلوتنيب إس.كي، اتصل بطبيبك على الفور

قد تعاني من المزيد من التأثيرات الجانبية وقد يوقف طبيبك العلاج

إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا بلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، يجب أن تتجه على الفور إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأن تحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول إرلوتنيب إس.كي

إذا نسيت تناول جرعة واحدة أو أكثر من الدواء، فاتصل بطبيبك أو الصيدلي في أسرع وقت ممكن

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت الصحيح، فلا تتناول جرعة مضاعفة.

إذا توقفت عن تناول الدواء

من المهم جدًا المواظبة على تناول دواء إرلوتنيب إس.كي كل يوم، طالما طلب منك طبيبك القيام بذلك.

يجب أن يستمر العلاج بحسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء قبل استشارة الطبيب.

لا تتناول الدواء في الظل! تتحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها أي دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلمة أخرى بخصوص استخدام هذا المنتج، فاستشر طبيبك أو الصيدلي.

4. التأثيرات الجانبية

كما هو الحال مع أي دواء، قد يتسبب استخدام إرلوتنيب إس.كي في ظهور تأثيرات جانبية لدى بعض المستخدمين.

لا تزعج من قراءة قائمة التأثيرات الجانبية، فمن الممكن أن لا تعاني من أي منها.

اتصل بطبيبك في أقرب وقت ممكن إذا عانيت من أي من التأثيرات الجانبية التالية. في بعض الحالات، قد يقلل طبيبك من جرعتك من إرلوتنيب إس.كي أو يوقف العلاج:

الإسهال والتقيؤ (تأثيرات جانبية شائعة جدًا قد تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من كل عشرة).

يمكن أن يتسبب الإسهال الشديد أو المستمر في انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم وضعف وظائف الكلى، خاصة إذا كنت تتلقى أيضًا علاجات كيميائية أخرى في نفس الوقت. إذا عانيت من إسهال شديد أو طويل الأمد، فاتصل بطبيبك على الفور، فقد تحتاج إلى العلاج في المستشفى.

تهيج في العينين بسبب التهاب الملتحمة / التهاب القرنية (تأثيرات جانبية شائعة جدًا قد تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من كل عشرة) والتهاب القرنية (أحد الآثار الجانبية الشائعة التي قد تظهر لدى ما يصل إلى مستخدم واحد من كل عشرة).

شكل من أشكال تهيج الرئة يسمى مرض خالي في الرئة (disease lung interstitial) هذا التأثير الجانبي غير شائع بين سكان أوروبا ولكنه شائع لدى اليابانيين. وقد يصيب ما يصل إلى واحد من كل مائة مستخدم في أوروبا، وما يصل إلى واحد من كل عشرة مستخدمين في اليابان). يمكن أن يكون هذا المرض مرتبطاً بالتطور الطبيعي لحالتك الطبية، وفي بعض الحالات يمكن أن تكون له نتائج مميتة. إذا ظهرت عليك أعراض مثل صعوبة مفاجنة في التنفس مصحوبة بسعال أو حمى، فاتصل بطبيبك على الفور، حيث قد تكون تعاني من هذا المرض. وقد يقرر طبيبك إيقاف العلاج باستخدام إرلوتنيب إس.كي بشكل دائم.

كانت هناك حالات انتقام في الجهاز الهضمي (تأثير جانبي غير شائع قد يصيب حتى مستخدم واحد من كل مائة مستخدم). توجه إلى الطبيب إذا كنت تعاني من آلام شديدة في المعدة. بالإضافة إلى ذلك، آخر الطبيب إذا كنت قد أصبت سابقًا بقرحة هضمية (تضمر الأنسجة المخاطية في الجهاز الهضمي) أو التهاب رتجي (disease diverticular)، لأن هذه الحالات قد تزيد من خطر الانتقام.

لوحظت حالات نادرة من فشل الكبد (تأثير جانبي نادر قد يصيب حتى مستخدم واحد من كل ألف مستخدم). يمكن أن تكون الأعراض شعورًا عامًا بالتواء، مع أو بدون يرقان (اصفرار الجلد والعينين)، بول داكن، غثيان، تقيؤ، آلام في البطن. لوحظت حالات نادرة من فشل الكبد، الأمر الذي يمكن أن يكون قاتلاً. إذا أظهرت فحوصات الدم الخاصة بك تغيرات خطيرة في وظائف الكبد، فقد يحتاج طبيبك إلى إيقاف علاجك بـ إرلوتنيب إس.كي.

تأثيرات جانبية أخرى:
تأثيرات جانبية تظهر بكثرة (قد تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من كل عشرة):

- طفح جلدي قد يظهر أو ينقام في المناطق المعرضة للشمس. إذا كنت تتعرض لأشعة الشمس، فمن المستحسن استخدام الملابس التي تحمي المناطق المكشوفة و/أو المنتجات الواقية من الشمس.
- التهابات
- فقدان الشهية، فقدان الوزن
- اكتئاب
- صداع، تغيرات في الإحساس على سطح الجلد أو الشعور بالتنميل في الأطراف
- صعوبة في التنفس، سعال
- غثيان
- تهيج الفم
- مغص، عسر الهضم والانتفاخ
- نتائج فحوصات دم غير طبيعية لوظائف الكبد
- حكة وجفاف الجلد وتساقط الشعر
- تعب وحمى وقشعريرة

تأثيرات جانبية تظهر بشكل متكرر (قد تظهر لدى حتى مستخدم واحد من كل عشرة):

- نزف من الأنف - رعاف
- نزف من المعدة أو الأمعاء
- تفاعلات التهابية حول الأظافر
- التهاب بصيلات الشعر
- حب الشباب
- تشدقات في الجلد
- ضعف وظائف الكلى (عندما يتم إعطاء الدواء لدواعي غير تلك المتبعة بالدمج مع العلاج الكيميائي)

تأثيرات جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى حتى مستخدم واحد من كل 100):

- تغيرات في الرموش
- زيادة شعر الجسم والوجه بنمط ذكري
- تغيرات في الحاجب
- تنصف الأظافر أو ارتخائها

تأثيرات جانبية نادرة الظهور (قد تظهر لدى حتى مستخدم واحد من كل ألف مستخدم):

- احمرار أو ألم في راحتي اليدين أو القدمين - متلازمة بالمار بلنتر (erythrodysesthesia Plantar Palmar syndrome)

تأثيرات جانبية نادرة جداً (قد تظهر لدى حتى مستخدم واحد من كل عشرة آلاف):

- حالات انتفاخ القرنية أو تقرحها.
- حالات شديدة من تقرح الجلد أو تشرير الجلد (يمكن أن تشير إلى متلازمة جونسون ستيفنز Johnson-Stevens)
- التهاب المنطقة الملونة في العينين

إذا عانيت من أي تأثير جانبي، أو تفاقم أحد التأثيرات الجانبية، أو عانيت من تأثير جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكنك إبلاغ وزارة الصحة عن التأثيرات الجانبية بالضغط على رابط "الإبلاغ عن تأثيرات جانبية بسبب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي سيقودك إلى استماراة الكترونية للإبلاغ عن التأثيرات الجانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين إرلوتينيب إس.كي

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول ومجال رؤية الصغار و/أو الأطفال، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب القبّع بدون تعليمات صريحة من الطبيب!
- لا تتناول إرلوتينيب إس.كي بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة، يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.
- لا توجد شروط تخزين خاصة، يوصى بحفظ الدواء في درجة حرارة الغرفة.
- لا تتخالص من الأدوية في الصرف الصحي أو مع المهملات المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

6.1 ما هي مكونات إرلوتنيب إس.كي؟

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Lactose monohydrate, Cellulose, microcrystalline (E460), Sodium starch glycolate Type A, Magnesium stearate (E470
b), Isopropyl Alcohol

غلاف القرص

Poly (vinyl alcohol), Titanium dioxide (E171) Macrogol, Talc, Methacrylic Acid - Ethyl Acrylate Copolymer, Sodium, Hydrogen Carbonate, Purified water

6.2 كيف يبدو إرلوتنيب إس.كي وما هي محتويات العبوة

إرلوتنيب إس.كي 25 ملغ - هي أقراص مغلفة بيضاء إلى صفراء، مستديرة، مدببة من الجانبين، مطبوع على أحد جانبيها "25".

إرلوتنيب إس.كي 100 ملغ - هي أقراص مغلفة بيضاء إلى صفراء، مستديرة، مدببة من الجانبين، مطبوع على أحد جانبيها "100".

إرلوتنيب إس.كي 150 ملغ - هي أقراص مغلفة بيضاء إلى صفراء، مستديرة، مدببة من الجانبين، مطبوع على أحد جانبيها "150".

تحتوي كل عبوة على 30 قرص مغلف.

اسم وعنوان الشركة المصنعة:

REMEDICA LTD., CYPRUS

AHARNON STREET, LIMASSOL INDUSTRIAL ESTATE, 3056 LIMASSOL, CYPRUS

اسم وعنوان صاحب الترخيص:

ك. إس. كيم انترناشونال.م.ض.، شارع بيجال ألون 94، تل أبيب 6789139.

تم تحرير هذه النشرة في شباط 2023 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي بوزارة الصحة:

إرلوتنيب إس.كي 25 ملغ: 169-84-35857

إرلوتنيب إس.كي 100 ملغ: 169-85-35858

إرلوتنيب إس.كي 150 ملغ: 169-86-35859

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت كتابة هذه النشرة بصيغة المذكر. ومع ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين

For further information about the medicinal product and for updated consumer leaflets in English, Hebrew and Arabic , please scan the following code



Erlotinib s.k. 150mg



Erlotinib s.k. 100mg



Erlotinib s.k. 25mg

يمكنك الاتصال بمالك تسجيل المستحضر لطلب الحصول على نشرة مطبوعة للمستهلك باللغة الإنجليزية على عنوان البريد الإلكتروني report@sk- أو عن طريق رقم الهاتف 03-6114543 _ pharma.com