

مستحضرات) - 1986
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

وك™ 15 ملغ

وك™ 30 ملغ

وك™ 45 ملغ

المُركب الفعال وكميته:
يحتوي كل قرص ذو تحرير مطّول على
(على شكل هيميهيدرات) 15 ملغ
Upadacitinib (as hemihydrate) 15mg
يحتوي كل قرص ذو تحرير مطّول على
(على شكل هيميهيدرات) 30 ملغ
Upadacitinib (as hemihydrate) 30mg
يحتوي كل قرص ذو تحرير مطّول على
(على شكل هيميهيدرات) 45 ملغ
Upadacitinib (as hemihydrate) 45mg

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالها
هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا تم
إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.
وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للأخرين.
حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

بالإضافة للنشرة، تتوفّر للمستحضر رينفوك 'بطاقة
الأمان للمتعالج'. تحتوي هذه البطاقة على معلو
الأمان، التي يتوجب عليك معرفتها، قبل بدء العلاج
ريتفوك والتصرف وفقها. يجب قراءة 'بطاقة المعلو
للمتعالج' والنشرة للمستهلك بتمعن قبل بدء إستع
يجب حفظ البطاقة لقراءتها بتمعن ثانية عند الحال

١) لأي غرض مخصص الدواء؟
ريتفوك مخصص لعلاج
• التهاب المفاصل الروماتيزمي (d Arthritis)
المتوسط حتى الشديد لدى الكبار، الذين قاسوا
كافية لعلاج سابق بدواء واحد مضاد للروماتيزم أو
DMARDs أو لم يكن بإمكانهم تحمل العلاج.

- التهاب المفاصل الصدفي (Psoriatic Arthritis) لدى الكبار، الذين قاسوا من إستجابة غير كافية لعلاج سابق بدواء واحد مضاد للروماتيزم أو أكثر من مجموعة DMARDs أو لم يكن بإمكانهم تحمل العلاج. بالإمكان إستعمال رينفوك كعلاج منفرد أو بمشاركة ميتوترىكسات (methotrexate).
- التهاب الفقار الرثياني (Ankylosing Spondylitis) لدى الكبار، الذين قاسوا من إستجابة غير كافية لعلاج اعتيادي.
- التهاب الجلد التأتبي (Atopic Dermatitis) المتوسط حتى الشديد لدى الكبار والمرأهقين بأعمار 12 سنة وما فوق والمُرشحين لعلاج جهازي.
- التهاب القولون التقرحي (Ulcerative Colitis) المتوسط حتى الشديد لدى الكبار، الذين قاسوا من إستجابة غير كافية، فقدان

- الإستجابة أو عدم تحمل علاج تقليدي أو ببولوجي سابق.
- مرض كرون (Crohn's disease) المتوسط حتى الشديد لدى الكبار، الذين قاسوا من إستجابة غير كافية، فقدان الإستجابة أو عدم تحمل علاج تقليدي أو ببولوجي سابق.
- **الفصيلة العلاجية:** من المثبطات الإنقائية لجهاز المناعة، من مثبطات جانوس كيناز.
- يعمل رينثوك عن طريق تقليل نشاط الإنزيم في الجسم المُسمى "جانوس كيناز" الذي يقلل للالتهاب.
- **التهاب المفاصل الروماتيزمي**
 - يستعمل رينثوك لعلاج التهاب المفاصل الروماتيزمي لدى الكبار.
 - إن التهاب المفاصل الروماتيزمي عبارة عن مرض يؤدي إلى التهاب المفاصل. إذا كنت تعاني من التهاب مفاصل روماتيزمي، نشط متوسط

حتى شديد، فمن الجائز أن تلتقي في البداية أدوية أخرى، حيث أن أحدها سيكون على ما يbedo ميتوتريكسات. إذا لم تؤثر هذه الأدوية بشكل كافٍ، ستلتقي رينفوك مع أو بدون ميتوتريكسات لعلاج التهاب المفاصل الروماتيزمي لديك.

يمكن أن يساعد رينفوك في تقليل الألم، التصلب والإنتفاخ في المفاصل لديك، في تقليل الإرهاق، ويمكن أن يبطئ تضرر العظم والغضروف في المفاصل لديك. هذه التأثيرات يمكن أن تسهل على نشاطك اليومي الإعتيادي وبذلك تؤدي إلى تحسين جودة حياتك.

التهاب المفاصل الصدفي

يُستخدم رينفوك لعلاج التهاب المفاصل الصدفي لدى الكبار. إن التهاب المفاصل الصدفي عبارة عن مرض يؤدي إلى التهاب المفاصل الصدفي والصدفية. إذا كنت تعاني من التهاب مفاصل صدفي نشط، فمن الجائز أن تلتقي في البداية أدوية أخرى. إذا لم تؤثر هذه الأدوية بشكل كاف، ستلتقي رينفوك مع أو بدون ميتوتريكسات لعلاج التهاب المفاصل الصدفي لديك. يمكن أن يساعد رينفوك في تقليل الألم، التصلب والإنتفاخ في المفاصل لديك وما حولها، الألم والتصلب في العمود الفقري، الآفات الجلدية الصدفية والإرهاق ويمكن أن يبطئ تضرة العظم والغضروف في المفاصل لديك. هذه التأثيرات يمكن أن تسهل على نشاطك اليومي الإعتيادي وبذلك تؤدي إلى تحسين جودة حياتك.

يمكن أن يساعد رينقوك في تقليل علامات نزف في البراز، ألم في البطن، الإلحاد وهذه التأثيرات يمكن أن تتبيح ممارسة التخفيف من الإنهاك.

- مرض كرون عبارة عن مرض إلتهابي الذي قد يشرك كل جزء من الجهاز الهضمي، لكنه عادة يؤثر على الأمعاء. يستعمل رينفوك لعلاج كبار يعانون من مرض كرون الذين إستجابوا بشكل غير كافٍ أو لم يكن بإمكانهم تحمل علاج سابق.

قد يساعد رينفوك في تقليل علامات وأعراض المرض التي تشمل الإلحاد وتكرار الذهاب إلى المرحاض، ألم في البطن وإلتهاب مخاطية الأمعاء لديك. يمكن أن تتيح هذه التأثيرات ممارسة الأنشطة اليومية بشكلٍ سليم والتحفيض من الإنهاك.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

 - كنت حساساً (اليرجي) - أو باداسيتنيب أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6)
 - وُجد لديك تلوث حاد (مثل إلتهاب الرئتين أو تلوث جلدي جرثومي)
 - وُجد لديك مرض السل النشط (TB)
 - وُجدت لديك مشاكل خطيرة في الكبد
 - كنت حاملاً (أنظري فقرة "الحمل، الإرضاع والخصوبة")

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج وخلال العلاج بـ رينفوك إحكِ للطبيب إذا:

 - وُجد لديك تلوث أو إذا تطورت لديك تلوثات بشكل متكرر. إحكِ طبيبك إذا تطورت لديك أعراض مثل سخونة، جروح، الشعور بإرهاق أكثر من المعتاد أو مشاكل في الأسنان، لأن هذه يمكن أن تكون علامات لتلوث. يمكن أن يضعف رينفوك من قدرة جسمك على محاربة التلوثات وقد يفاقم تلوث حالياً أو يزيد من خطورة تطور تلوث جديد. إذا كنت تعاني من السكري أو كنت بعمر 65 سنة وما فوق، قد تكون معرضاً لخطورة زائدة لتطور تلوثات.
 - عانيت من مرض السل أو كنت على إتصال قريب مع شخص مريض بالسل. سيجري طبيبك فحص لمرض السل قبل بدء العلاج بـ رينفوك ويمكن أن يكرر الفحص أثناء فترة العلاج.
 - عانيت من تلوث الهرس النطيلي (القوباء المنطقية)، لأن رينفوك يمكن أن يسمح بعودة التلوث. إحكِ طبيبك إذا وُجد لديك طفح مؤلم على الجلد مع حويصلات، لأن هذه يمكن أن تكون علامات القوباء المنطقية.
 - كان لديك ذات مرة إلتهاب الكبد (hepatitis) من نوع B أو C.
 - تلقيت مؤخرًا لقاحاً أو أنهى مقدم على تلقي لقاح - ذلك لأن اللقاحات الحية غير موصى بها خلال إستعمال رينفوك.
 - وُجد لديك سرطان أو عانيت في الماضي من سرطان، تدخّن أو قمت بالتدخين في الماضي، لأنه سيتناقش معك الطبيب فيما إذا كان رينفوك مناسب لك.
 - لوحظ سرطان جلد ليس ميلانوما لدى متعالجين يتناولون رينفوك.
 - من شأن الطبيب أن يوصيك بإجراء فحوص جلد بشكل منتظم خلال

- فترة تناول رينفوك. إذا تطورت خلال العلاج أو بعده آفات جلدية جديدة أو إذا تغير مظهر الآفات الحالية، إحك للطبيب. وُجدت لديك، أو كانت لديك مشاكل في القلب، لأنه سيتناقش معك الطبيب فيما إذا كان رينفوك مناسب لك.
- كبدك لا يعمل كما يجب.
- وُجدت لديك في الماضي جلطات دموية في أوردة الرجلين (خثار الأوردة العميق) أو في الرئتين (إنصمام رئوي) أو لديك خطورة زائدة في أن تتطور لديك خثرات دموية من هذا النوع (مثلاً: إذا إجتررت عملية جراحية كبيرة مؤخرًا، إذا كنت تسبِّعين وسائل منع حمل هورمونية/علاج هورموني بديل، إذا شخص إضطراب في تخثر الدم لديك أو لدى أحد من أفراد عائلتك المقربين). سيتناقش معك الطبيب فيما إذا كان رينفوك مناسب لك.

إِحْكِ طَبِيبِكِ، إِذَا تَطَوُّر لَدِيكِ ضَيقٌ مفاجئٌ فِي التنفس أَو صَعْوَدَةٌ فِي التنفس، أَلْمٌ فِي الصَّدْرِ أَوْ أَلْمٌ فِي أَعْلَى الظَّهَرِ، إِنْتَفَاخٌ فِي الرَّجُلِ أَوْ فِي الْبَدْنِ، أَلْمٌ فِي الرِّجْلِ، أَوْ حَسَاسِيَّةٌ، أَوْ إِحْمَارٌ أَوْ تَغَيُّرُ اللَّوْنِ فِي الرَّجُلِ أَوْ فِي الْبَدْنِ، لَأْنَ هَذِهِ يُمْكِن أَنْ تَكُونَ عَلَامَاتٍ لِخَثْرَاتٍ دَمَوِيَّةٍ فِي الْأَوْرَدَةِ.

- وُجِدَتْ لَدِيكِ مشاكلٌ فِي الْكَلِّ.
- وُجِدَ لَدِيكِ أَلْمٌ غَيْرُ مُشَخَّصٌ فِي الْبَطْنِ، يُوجَدُ لَدِيكِ حَالِيًّا أَوْ وُجِدَ لَدِيكِ إِلْتَهَابٌ الرِّتَجِ (*diverticulitis*)، إِلْتَهَابٌ مُؤْلِمٌ لِكَيْسَاتٍ صَغِيرَةٍ فِي جَدارِ الْأَمْعَاءِ (لَدِيكِ) أَوْ تَقْرَحَاتٍ فِي الْمَعْدَةِ أَوْ فِي الْأَمْعَاءِ، أَوْ كَنْتَ تَتَناولُ أَدْوِيَةً مُضَادَّةً لِلْإِلْتَهَابِ الْلَّاستِيروِيَّيِّدِيَّةِ.

إِذَا كُنْتَ تَقَاسِي مِنْ إِحْدَى الْأَعْرَاضِ الْجَانِبِيَّةِ الْخَطِيرَةِ التَّالِيَّةِ، تَوَجَّهْ فُورًا إِلَى طَبِيبِكِ:

- أَعْرَاضٌ مِثْلُ طَفْحِ (*شرِي*)، صَعْوَدَاتٌ فِي التنفسِ أَوْ إِنْتَفَاخٌ الشَّفَتَيْنِ،

اللسان او الحنجرة، من الجائز انك تقاسي من رد فعل تحسسي. بعض الاشخاص الذين تناولوا رينفوك قاسوا من ردود فعل تحسسية خطيرة. إذا كنت تقاسي من إحدى الاعراض خلال العلاج بـ رينفوك، توقف عن تناول رينفوك وتوجه لتلقي مساعدة طبية طارئة بشكل فوري.

- آلام شديدة في البطن، خاصة تلك المصحوبة بسخونة، غثيان وتقىؤات.

الفحوص والمتابعة

سوف تحتاج إلى إجراء فحوص دم قبل بدء العلاج بـ رينفوك أو أثناء تناول الدواء. ذلك لكي يتم فحص ما إذا كان هنالك تعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء (قلة العدلات أو قلة اللمفاويات)، نسبة عالية للشحوم في الدم (كوليسترول) أو نسب عالية من إنزيميات الكبد. الفحوص هي للتأكد من أن العلاج

المسنون
هناك معدل أعلى من التلوثات لدى مرضى بأعمار 65 سنة وما فوق.
إحكِ لطبيبك حال ملاحظتك علامات أو أعراض تلوث.
قد يكون المتعالجين بأعمار 65 سنة وما فوق أكثر عرضة لخطورة
حدوث تلوثات، مشاكل في القلب بما في ذلك نوبة قلبية وأنواع معينة
من السرطان. سيناقش معك الطبيب فيما إذا كان رينفوك مناسب لك.
الأطفال والمرأهقون
لا يوصى بإستعمال رينفوك لدى أطفال دون عمر 12 سنة أو لدى
مراهقين يزنون أقل من 30 كلغ الذين يعانون من إلتهاب الجلد التأتبي،
وهذا لأنه لم يتم بحثه لدى هؤلاء المرضى.
رينفوك غير موصى به للإستعمال لدى أطفال ومراهقين دون عمر

١٨ سنه الدين يعانون من إلتهاب المفاصل الروماتيزمي، إلتهاب المفاصل الصدفي، إلتهاب الفقار الرئيسي، إلتهاب القولون التقرحي، أو مرض كرون وهذا لأنه لم يتم بحثه لدى هذه الفئة العمرية.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إلحظ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. ذلك لأن أدوية معينة بإمكانها التقليل من نجاعة العلاج بـ رينفوك أو قد تزيد خطورة حصول أعراض جانبية.

- أدوية لعلاج التلوثات الفطرية (مثل إيتراكونازول، پوساكونازول أو ڤوريكونازول)
- أدوية لعلاج التلوثات الجرثومية (مثل كلاريثروميسين)
- أدوية لعلاج متلازمة كوشينغ (مثل كيتوكونازول)

- أدوية لعلاج مرض السل (مثل ريفامبيسين)
- أدوية لعلاج الإختلاجات أو النوبات (مثل فينيتوئين)
- أدوية التي تؤثر على جهازك المناعي (مثل أزاثيوپرین، ميركاپتوبورين، سيكلوسپورين وتاكروليموس)
- أدوية التي قد تزيد من خطورة حدوث إنثقاب (perforation) في الجهاز الهضمي أو إلتهاب الرّتّج (diverticulitis) مثل أدوية مضادة للإلتهاب اللاستيرونيدية (غالباً تستعمل لعلاج الألم و/أو حالات إلتهاب العضلات أو المفاصل)، و/أو المواد أفيونية المفعول (تستعمل لعلاج الآلام الشديدة)، و/أو الكورتيكosteroidات (غالباً تستعمل لعلاج حالات الإلتهاب)

إذا كنت تتناول إحدى الأدوية من القائمة أعلاه أو إذا لم تكن واثقاً، إحكِ للطبيب أو للصيادي الخاص بك قبل تناول رينثوك.

الحمل، الإرضاع والحصوبة
الحمل
لا يجوز إستعمال رينثوك أثناء فت
الإرضاع
لذا يمكن إنتظار تناول الأ

- إذا كنت مريضه او تحظى بارتفاع، تحدثي مع طبيبك قبل تناول هذا الدواء. لا يجوز إستعمال رينفوك أثناء فترة الإرتفاع لأنه من غير المعروف فيما إذا كان هذا الدواء ينتقل إلى حليب الأم. أنت وطبيبك سوف تقرران فيما إذا كنت سترضعين أو تستعملين رينفوك. لا تقومي بعمل الإثنين معا.

من الحمل

إذا كنت إمرأة في سن الخصوبة، يتوجب عليك إستعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل من أجل تجنب حصول حمل أثناء تناول رينفوك ولمدة 4 أسابيع على الأقل بعد الجرعة الدوائية الأخيرة الخاصة بك من رينفوك. إذا حملت خلال هذه الفترة، عليك التوجه مباشرة إلى طبيبك. إذا تلقت طفلك الدورة الشهرية الأولى خلال فترة تناول رينفوك، فعليك إطلاع الطبيب.

إلتهاب الجلد التأتبي

الكتاب: الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 15 ملغ أو 30 ملغ مرة واحدة

في اليوم، كما وُصف من قبل طبيبك. من شأن الطبيب أن يقرر رفع

أو خفض الجرعة الدوائية الخاصة بك وفقاً لعمل الدواء في الجسم.

المسنون: إذا كان عمرك 65 سنة وما فوق، فإن الجرعة الدوائية الإعتيادية هي

عادة 15 ملغ مرة واحدة في اليوم.

المرأهقون (بأعمر 12-17 سنة) الذين يزنون 30 كلغ على الأقل.

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 15 ملغ مرة واحدة في اليوم.

إلتهاب القولون التقرحي

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 45 ملغ مرة في اليوم لمدة

8 أسابيع. من شأن طبيبك أن يتخذ قراراً بإطالة مدة الجرعة الدوائية

الإبتدائية ذات 45 ملغ لمدة 8 أسابيع إضافية (بالإجمال 16 أسبوعاً).

بعد ذلك فإن الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 15 ملغ أو 30 ملغ

مرة في اليوم كعلاج طويل الأمد. من شأن الطبيب أن يقرر رفع أو

خفض الجرعة الدوائية وفقاً لكيفية إستجابتك للدواء.

المسنون: إذا كان عمرك 65 سنة وما فوق، فإن الجرعة الدوائية الإعتيادية هي

عادة 15 ملغ مرة في اليوم كعلاج طويل الأمد.

من شأن الطبيب أن يقرر خفض الجرعة الدوائية إذا وُجدت لديك

مشاكل في الكلى، أو إذا وُصفت لك أدوية معينة أخرى.

مرض كرون

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 45 ملغ مرة في اليوم لمدة 12

أسابيع. بعد ذلك الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 15 ملغ أو 30

ملغمرة في اليوم كعلاج طويل الأمد. من شأن الطبيب أن يقرر رفع

أو خفض الجرعة الدوائية وفقاً لكيفية إستجابتك للدواء.

المسنون: إذا كنت بعمر 65 وما فوق، فإن الجرعة الدوائية هي عادة 15 ملغ

مرة في اليوم كعلاج طويل الأمد.

من شأن طبيبك أن يقرر خفض الجرعة الدوائية إذا وُجدت لديك

مشاكل في الكلى، أو إذا وُصفت لك أدوية معينة أخرى.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها

طريقة التناول

• يجب بلع القرص كاملاً مع الماء. لا يجوز شطر، سحق، مضغ أو

كسر القرص قبل بلعه لأن هذا قد يغير من كمية الدواء التي تدخل

لجسمك.

• لمساعدةك على تذكر تناول رينثوك، تناوله كل يوم في نفس الوقت.

• بالإمكان تناول الأقراص مع أو بدون طعام.

• تجنب الطعام أو الشراب الذي يحتوي على الجريب فروت خلال

فترة تناولك (أو علاجك بـ) رينثوك لأن ذلك قد يزيد من إحتمال

ظهور أعراض جانبية، عن طريق زيادة كمية الدواء في جسمك.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر فعليك التوجّه لطبيبك. لربما

تقاسي بعضًا من الأعراض الجانبية المفصلة في الفقرة 4.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء،

توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر

معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

• إذا فوتت جرعة دوائية واحدة، فتناولها فور تذكر ذلك

• إذا نسيت الجرعة الدوائية الخاصة بك لمدة يوم كامل، قم بتفويت

الجرعة الدوائية التي خسرتها وتناول فقط جرعة دوائية واحدة

في اليوم التالي كالمعتاد

• لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتوعيض عن القرص المنسي

يجب المواطنة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا تتوقف عن تناول رينثوك إلا إذا أمرك طبيبك بالتوقف عن تناوله.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء

والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع

النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر

الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال رينثوك قد يسبب أعراضًا جانبية لدى

بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز

الأنتعاني أي منها.

أعراض جانبية خطيرة

تحدث مع طبيبك أو توجه فوراً للتلقى مساعدة طبية إذا كنت تقاسي

من أيّة علامات لـ:

• تلوث مثل القوباء المنطقية أو طفح جلدي مؤلم مع حويصلات

(الهريس النطاقي) - أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض

تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

• تلوث في الرئتين (التهاب الرئتين)، الذي بإمكانه أن يسبب ضيق

في التنفس، سخونة وسعال مع بلغم - أعراض جانبية شائعة

(common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

- تلوث في الدم (إنفان) - أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) -

أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

• أعراض جانبية أخرى

تحدث مع طبيبك إذا لاحظت إحدى الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض تظهر

لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة

• تلوث في الحنجرة والأنف

• حب الشباب

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 10-11

مستعملين من بين 100

• سرطان جلد ليس ميلانوما

• سعال

• سخونة

• جروح البرد (الهريس البسيط)

• غثيان

• إرتفاع في نسبة الإنزيم المُسمى كرياتين كيناز، الذي يظهر في

• تعدد مشكلات الكبد، الذي يظهر في فحوص الدم (علامة

لمشكلات الكبد)

• زيادة في الوزن

• إلتهاب (انتفاخ) بصيلات الشعر

• إنفلونزا

• فقر الدم

• آلام في البطن

• إرهاق (شعور بارهاق غير عادي وضعف)

• صداع

• شرى (urticaria)

• تلوث في المسالك البولية

• طفح

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10

مستعملين من بين 100

• فطريات في الفم (بقع بيضاء في الفم)

• إرتفاع في نسبة الدهون الثلاثية (نوع من الشحوم) في الدم كما

يظهر في الفحوص

والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع

النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر

الطبيب أو الصيدلي.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية واحدة، فتناولها فور تذكر ذلك

على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على

الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)

الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للت bliغ عن أعراض جانبية، أو عن

طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق

بعيداً عن متناول أيدي و المجالس والأطفال و/أو الرضع وذلك

لتفادى إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة

من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date)

الذي يظهر على ظهر العلبة الخارجية واللوحة (بليستر). يشير

تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر

• يجوز تخزين رينثوك 15 ملغ ورينثوك 30 ملغ في درجة مئوية

• وبالنسبة لـ رينثوك 45 ملغ في درجة حرارة الغرفة

لا توجد شروط تخزين خاصة. يوصى بالتخزين في درجة حرارة

الغرفة

• يجب التخزين في اللوحة الأصلية (بليستر) للحماية من الرطوبة

• لا يجوز إلقاء أية أدوية في المجالس أو في القمامات المنزلية. إسأل

الصيدلي الخاص بك حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد

الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

(6) معلومات إضافية

ماذا يحتوي رينثوك

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

رينثوك 15 ملغ أقراص ذات تحrir مطوى

• طلاء الفيلم:

microcrystalline cellulose, mannitol,

hypromellose, tartaric acid (powdered),

magnesium stearate, silica colloidal anhydrous/

colloidal silicon dioxide

• طلاء الفيلم:

polyvinyl alcohol, macrogol/polyethylene glycol,

talc, titanium dioxide (E171), black iron oxide

(E172) / ferrosoferric oxide, iron oxide red

(E172)

• طلاء الفيلم:

microcrystalline cellulose, mannitol,

hypromellose, tartaric acid (powdered),

magnesium stearate, silica colloidal anhydrous/

colloidal silicon dioxide

• طلاء الفيلم:

polyvinyl alcohol, macrogol/polyethylene glycol,

talc, titanium dioxide (E171), iron oxide yellow

(E172), iron oxide red (E172)

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

رينثوك 15 ملغ أقراص ذات تحrir مطوى

• محتوى العلبة:

رينثوك 30 ملغ أقراص ذات تحrir مطوى

• طلاء الفيلم: