

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תקשיירם) התשמ"ג – 1986

התרופה משוקחת על פי מרשם רופא בלבד

מקסיפן® פורטה 250 מ"ג אבקה להרחה

הרכב:

כל 5 מ"ל מכילים: אמוּקָסִיצְיָלִין (כטְרַיהִידְרָאֶט) 250 mg 250 מ"ג Amoxicillin (as trihydrate) 250 mg 250 מ"ג כל 5 מ"ל מכילים: אמוּקָסִיצְיָלִין (כטְרַיהִידְרָאֶט) 250 mg 250 מ"ג 6 - "מ"ידע חשוב על חלק מההרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מ"ידע נוספים". קרא בעין את העלון עד סוף בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול ב齊homים הנגרמים על ידי חיידקים הרגשיים לאמוּקָסִיצְיָלִין. כמו כן, התרופה מיועדת למניעת>Zיהום חיידקי בחולים הנמצאים בסיכון לפתוח דלקת פנים הלב על רקע חיידק.

קובצתה תרפואיית
אנטיביוטיקה מקובצת הפניצילינים.

ישנם Zיהום הנגרמים על ידי וירוסים, כגון הצטננות. מקסיפן פורטה 250 מ"ג אבקה להרחה אינו פוגע בוירוסים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מההרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
- אתה רגש למרכיבי האrizה של התרופה.
- יש לך רגשות לתרופות אחרות מקובצות הפניצילינים או הצפלואספורינים או לאנטיביוטיקה דומה כגון אמוּקָסִיצְיָלִין, אמפיקצילין, צפלקסין ואחרות.
- אתה סובל ממחלת הנשיקה או אם יש חשד לכך.

اذהרונות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול במקסיפן פורטה 250 מ"ג אבקה להרחה ספר לרופא אם:

- סבלת בעבר מתגובה אלרגית לאנטיביוטיקה מקובצת הבטא-לקטמינים (כגון אמפיקצילין, פיפורצצילין). ראה סעיף 4 - "תופעות לוואי".
- אתה נוטל תרופות לדילול הדם (כגון וורפרין וכדומה).
- סבלת בעבר משלשלולים או מדלקת של המעי הגס (קולייטיס) כתוצאה שימוש באנטיביוטיקה.
- אתה סובל מבעיות בכליות.

תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם لكחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות לטיפול בסרטן (כגון מטוטרקטוסאט)
- תרופות לצרבת או לשיגdon (פרובנציד או סימטידין)
- תרופות לדילול הדם (כגון וורפרין) - עלולות לגרום לדימומים גלולים למניעת הירין - אמוּקָסִיצְיָלִין עלול להפחית את יעילות הгалולות

• **אנטיביוטיקות (כגון טטרציקליינים) - עלולות להויריד את יעילות אמוקסיצילין**

מוקסיצילין עלולה להשפיע על תוצאות של בדיקות מעבדה. התייעץ עם הרופא שלך במידה הצורך.

שימוש בתרופה ומצוון
יש ליטול את התרופה בין הארוחות עם כוס מים.

הירioxין והנקה
אם את בהירioxין או מתכנתת להיכנס להירioxין, יש להיוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.
אם את מניקה או מתכנתת להניך, היועצי' ברופא בנוגע לאופן ההנקה בזמן השימוש בתרופה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

- תרופה זו מכילה פחתת מ-23 מ"ג גנטרכן בכפיה (5 מ"ל) ולפיכך נחשבת נטולת נתן.
- תרופה זו מכילה סוכרוז (כ-3 גרם ב-5 מ"ל תרחיף). אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי-סבירות (רגישות) לשוכרים מסוימים, היועץ' ברופא לפני נטילת התרופה.
- התרופה מכילה חומר צבע אדום (E129) FD&C red #40 שעלול לגרום לתגובה אלרגית.
- תרופה זו מכילה סודียม בנזואט (E211) 2.79 מ"ג ב-5 מ"ל תרחיף. סודียม בנזואט עלול להגבר צהבתה (הצהבה של העור והעיניהם) אצל ילדים (עד גיל 4 שבועות).
- תרופה זו מכילה בנזיל אלכוהול (כ-1.5 מ"ג ב-5 מ"ל תרחיף), העולג על לגרום לתגובה אלרגית. בנזיל אלכוהול נחשד כגורם סיכון לתופעות לוואי חמורות, לרבות בעיות נשימהobilim. אין להשתמש בילדים (עד גיל 4 שבועות) אלא בהמלצת הרופא. אין להשתמש למשך יותר משבוע בילדים צעירים (בני פחות מ-3 שנים), אלא בהמלצת הרופא, עקב עלייה בסיכון להצטברות החומר בגוף.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם איןך בטוח בטעות בטעות.
למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.
הרופא המטפל יקבע את מינון התרופה החדש ואות שך הזמן שיש ליטול את התרופה בהתאם לסוג ולהחומרת החזירום ממנו אתה או ילך' סובלים. ספר לרופא אם אין שיפור במצב.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

齊浩姆 בדרכי הנשימה העליונות, בריאות, בעור או ברקמות הרכות:

מבוגרים וילדים מעל גיל 10 שנים: 250-500 מ"ג, 3 פעמיים ביום, כל 8 שעות.
ילדים בגילאי 10-2 שנים: 125 מ"ג, 3 פעמיים ביום, כל 8 שעות. ב齐浩ムים חמורים ניתן להגדיל את המנה ל-250 מ"ג, 3 פעמיים ביום.

תינוקות מתחת לגיל שנתיים: 62.5 מ"ג, 3 פעמיים ביום, כל 8 שעות.

המינון המומלץ בהתאם למשקל גופו הינו 20 מ"ג/ק"ג ליום, מחולק למנת 8 שעות. ב齐浩ムים חמורים ניתן להגדיל את המינון ל-40 מ"ג/ק"ג ליום, מחולק למנת 8 שעות.

דלקת פשוטה של דרכי השתן או זיהבה:

מבוגרים: 3 גרם במתן יחיד.
ילדים: 100 מ"ג/ק"ג במתן יחיד.
טיפול מניעתי לדלקת פנים הלב על רקע חיידקי (בטיפולי שינויים):
מבוגרים וילדים מעל גיל 10 שנים: 3 גרם במתן יחיד, שעה לפני תחילת הטיפול.
ילדים מתחת לגיל 10 שנים: 1.5 גרם במתן יחיד, שעה לפני תחילת הטיפול.

יש להקפיד על מדידת מנת התרחיף בכפיה המדידה. יש ליטול את התרופה בין הארוחות עם כוס מים.
אין לעبور על המנה המומלצת.

אופן הכנת התרופה

יש להכין את התרחיף בהתאם להוראות ההכנה המופיעות על גבי תווית הבקבוק. יש להקיש על הבקבוק כדי לשרר את האבקה.
לבקבוק המכיל אבקה להכנת 60 מ"ל: יש להוסיף 36 מ"ל מים מזוקקים.

לבקבוק המכיל אבקה להכנת 100 מ"ל. יש להוסיף 60 מ"ל מים מזוקקים. יש לנער את הבקבוק היטב לפני כל שימוש.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעל יlid מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך, גם אם אתה לא חש בתסמים. תסמים של מנת יתר עלולים לכלול: סחרחות חמורה.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיעוד, יש ליטול מנה מייד כשנזכרת. אם נזכرت בסמור לפחות זמן הנטילה של המנה הבאה, דילג על המנה שנשכחה והמשך בטיפול כרגע. אין ליטול שני מנות יחד על מנת לפצצות על המנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה גם אם התסמים חלפו, חשוב לסיים את הטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. הפסקת הטיפול לפני הזמן, שימוש לא נכון או שימוש יתר עלולים לגרום להתקפות של עמידות חריגים לתרופה ולחזרת הזיהום. משמעות הדבר היא כי התרופה עלולה לא להועיל לך בעתיד.

אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהינך נוטל תרופה. **הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.**

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, **היוועץ ברופא או ברוקח.**

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש במוקסיפן פורטה 250 מ"ג אבקה להרפה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיחל למקרא רשימת תופעות הלואו. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

יש להפסיק את הטיפול ולפנות מייד לרופא במקרים הבאים:

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 מעתמדים מתוך 100):
פריחה; היסודות העור או השפעות אחרות על העור והעיניים; בחילה; הקאה; שלשול; צואה דםית.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב-1-10 מעתמדים מתוך 1,000):
אנפיאלקסיס (תגובה אלרגית חריפה כגון נפיחות באף, בעיניים, בגרון, קשי נשימה, שלפוחיות בעור, פריחה וקילופי עור); תסמים של בעיות בכליות (כגון שתן��ור); תסמים של בעיות בכבד (כגון בחילות והקאות חוזרות ונשנות, כאבי בטן, עייפות יצאת דופן, הצהבה של העיניים או העור, שתן כהה).

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-1-1 מעתמדים מתוך 10,000):
תגובה עורית חריפה (תסמים דמוני שפעת, שלפוחיות וקילופים בעור); **תופעות לוואי עוריות חמורות SCAR (Severe Cutaneous Adverse Reactions)** גורמות לאי-ברירים:

- קילופים, קשקסים או שלפוחיות בעור (עם או בלי מוגלה) אשר עלולים להשפיע גם על העיניים, הפה, האף או איברי המין, גרד, פריחה חריפה, בלוטות מתחת לעור, כאב בעור, שינוי בצבע העור (אדום, הצהבה או צבע ארגמני)
- נפיחות ואודם של העיניים או הפנים
- הרגשה דמוית שפעת, חום, צמרמות, כאבים בגוף, בלוטות לימפה נפוחות, שייעול
- קוצר נשימה, כאב או אי נוחות בחזה

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה:

דלקת קרום המוח אספטיית (שאינה נגרמת על ידי חריגים): בלבול, חום, בחילה, עייפות, כאבי ראש פתאומיים או מוקשות של הצואר, רגשות לאור, הקאות.

יש להיוועץ ברופא אם מופיעות תופעות הלואין הבאות:
תופעות לואין שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 מעתמשים מתוך 100):
 לשון שחורה הנראית שעירה (דלקת בלשון); שינויצבע השיניים בילדים (כתמים חומים, צהובים או אפורים);
 סחרחות; חרדה.

תופעות לואין שאין שכיחות (תופעות שמופיעות ב-1-1 מעתמשים מתוך 1,000):
 אלרגיה עורית (סרפדת), גרד; פריחה בפנים; נפיחות.

תופעות לואין נדירות (תופעות שמופיעות ב-1-1 מעתמשים מתוך 10,000):
 קושי להירדם (אינסומניה); בלבול או שינויים בהתנהגות; שינויים בתוצאות של בדיקות דם.

תופעות לואין שנצפו לאחר שימוש:
 סינדרום קונייס – תגובה אלרגית חמורה שלוללה לגרום לאוטם שריר הלב (התקף לב), יתכן שתופיע ככאב בחזה במקורה של תגובה אלרגית לאנטקוצילין.

אם הופעה תופעת לואין, אם אחת מתופעות הלואין חמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לואין שלא צינה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לואין
 ניתן לדוח על תופעות לואין למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לואין עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המქון לדוח על תופעות לואין, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה למפרשת מהרופא.
- אבקה יבשה: יש לאחסן את האבקה במקום יבש, מתחת ל-25°C.**
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תרחיף מוכן: יש לשמר במקרר או בטמפרטורת החדר ולהשתמש בו תוך 14 ימים.**
- אין להשליך תרופות לביב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאין בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמר על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Sucrose, spray dried artificial flavor (cherry raspberry type), silicon dioxide, sodium citrate anhydrous, xanthan gum, sodium benzoate, FD&C red # 40.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה
 בקבוק המכיל אבקה בזכב שמנת-ורוד בהיר. לאחר הוספת המים, יתקבל נוזל בזכב ורוד.
 קיימים 2 גגלי אריזה: אריזה המכילה אבקה להכנת 60 מ"ל תרחיף, אריזה המכילה אבקה להכנת 100 מ"ל תרחיף.
 יתכן שלא כל גגלי האריזות משוקקים.

שם בעל הרישום וכתובת
 טבע ישראל בע"מ, רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

שם הייצור וכתובתו
טבע קנדה בע"מ, טורונטו, אונטריו, קנדה.

עלון זה נערך באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 132.01.31050

לשם הפשטות ולהקלת הקירהה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.