

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) 1986

يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ريفاستيجمين لصقة دِكسل

4.6 ملغ/24 ساعة

ريفاستيجمين لصقة دِكسل

9.5 ملغ/24 ساعة

لصقة للاستعمال على الجلد

(لصقة عبر الجلد)

تحتوي كل لصقة على:

ريفاستيجمين لصقة دِكسل 4.6 ملغ/24 ساعة: لصقة مساحتها 4.6 سنتيمتر مربع للإعطاء عن طريق الجلد وتحتوي على 6.9 ملغ من ريفاستيجمين (Rivastigmine). وتيرة إطلاق الدواء هي: 4.6 ملغ في 24 ساعة.

ريفاستيجمين لصقة دِكسل 9.5 ملغ/24 ساعة: لصقة مساحتها 9.2 سنتيمتر مربع للإعطاء عن طريق الجلد وتحتوي على 13.8 ملغ من ريفاستيجمين (Rivastigmine). وتيرة إطلاق الدواء هي: 9.5 ملغ في 24 ساعة.

المواد غير الفعالة ومسببات الأريجة في الدواء – انظر البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة **بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصِف هذا الدواء لعلاج مرضك. فلا تُعطه للأخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن مرضهم مشابه.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

لعلاج الخرف (مشاكل الذاكرة) الخفيف إلى المتوسط من نوع الألزهايمر.

الفصيلة العلاجية: منطبات الإنزيم كولين إستيراز (anticholinesterases).

ينتقي ريفاستيجمين إلى فصيلة مواد تسمى منططات كولين إستيراز. تموت خلايا عصبية معينة في الدماغ لدى متلقي العلاج المصابين بالخرف (ديمينشيا) التابع من مرض الألزهايمر، وتؤدي إلى مستويات منخفضة من الناقل العصبي (نيوروترانسميوتن) أستيليل كولين (مادة تمكّن الخلايا العصبية من التواصل فيما بينها). يعمل ريفاستيجمين عن طريق حجب الإنزيمات التي تكفك أستيليل كولين؛ أستيليل كولين إستيراز وبوتيريل كولين إستيراز. من خلال حجب هذه الإنزيمات، يَنتِج ريفاستيجمين **لصقة دِكسل** لمستويات أستيليل كولين في الدماغ أن ترتفع، ويساهم في تقليل أعراض مرض الألزهايمر.

ريفاستيجمين لصقة دِكسل مخصص لعلاج المرضى البالغين المصابين بالخرف الخفيف والمتوسط، وهو مرض تقدمي من اضطرابات في الدماغ يؤثر تدريجياً على الذاكرة والقدرة الفكرية والسلوك.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وُجِدَت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (ريفاستيجمين) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).
- كان لديك ذات مرة رد فعل تحسسي لدواء من نوع مشابه (مشققات الكربامات-carbamate derivatives).
- كان لديك رد فعل جلدي انتشر إلى ما يجاوز مساحة اللصقة، إذا كان لديك رد فعل موضعي شديد (مثل الحويصلات، تزايد التهاب الجلد، الانتفاخ) وإذا لم يتحسن هذا الوضع خلال **48** ساعة بعد نزع اللصقة.

إذا طبقت هذه الأوضاع عليك، فيجب إبلام الطبيب ولا يجوز استعمال **ريفاستيجمين لصقة دِكسل**.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بريفاستيجمين لصقة دِكسل، أخبر الطبيب إذا:

- وُجِدَت لديك الأن أو كانت لديك في الماضي حالة قلبية، مثل نبض غير منتظم أو نبض بطيء، استطالة المقطع (QTc)، سوابق عائلية من استطالة المقطع QTc، اضطراب في النظم من نوع تسرع القلب الطبيعي (torsade de pointes)، أو أن لديك مستوى منخفض من البوتاسيوم أو المغنيزيوم في الدم
- وُجِدَت لديك الأن أو كانت لديك في الماضي فرجة نشطة في المعدة
- وُجِدَت لديك الأن أو كانت لديك في الماضي صعوبات في التبول
- وُجِدَت لديك الأن أو كانت لديك في الماضي اختلاجات
- وُجِدَ لديك الأن أو كان لديك في الماضي ربو أو مرض تنفسي خطير
- كنت تعاني من ارتجاع
- كان وزن جسمك منخفضاً
- وُجِدَت لديك ردود فعل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان، التقيؤ والإسهال. قد تعاني من تجفاف (فقدان كبير جدًا للسوائل) إذا استمر التقيؤ أو الإسهال
- وُجِدَ لديك خلل في وظيفة الكبد

في هذه الحالات، يُحتمل أن يتألع طبيبك وضعت بشكل أكثر كثيًّا خلال فترة العلاج بالدواء.

إذا لم تستعمل **ريفاستيجمين لصقة دِكسل** لأكثر من ثلاثة أيام، فلا تلتصق اللصقة التالية دون استشارة الطبيب المعالج.

الأولاد والمراهقون

ريفاستيجمين لصقة دِكسل غير مخصص للاستعمال لدى الأولاد والمراهقين دون الـ 18.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب **وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.**

قد يشوش ريفاستيجمين على أدوية مضادة للكولين، بعضها هي أدوية تُستعمل لتخفيف من تشنجات وتقلصات المعدة (مثل ديسكلوميون)، لعلاج مرض الباركينسون (مثل أمانتادين) أو لمنع داء الحركة (دوار السفر) (مثل ديفينيدرامين، سكوبولامين أو ميكليزين). لا يجوز استعمال **ريفاستيجمين لصقة دِكسل** في نفس الوقت مع ميتوكلوپراميد (دواء يُستعمل لتخفيف أو لمنع الغثيان والتقيؤات). استعمال الدواءين سوياً قد يسبب مشاكل مثل تصلب الأطراف وارتجاع البنين.

إذا كنت مُؤمَّما على الخضوع لعملية جراحية خلال فترة العلاج **بريفاستيجمين لصقة دِكسل**، فيجب إبلاغ طبيبك عن استعمال هذا الدواء، إذ إن **ريفاستيجمين لصقة دِكسل** قد يزيد من تأثير مَرخِيات عضلية معينة أثناء التخدير.

يجب توخي الحذر عند استعمال **ريفاستيجمين لصقة دِكسل** سوياً مع حاصرات بيتا (أدوية مثل أتينولول، وتُستعمل لعلاج فرط ضغط الدم، الذبحة الصدرية وحالات قلبية أخرى). استعمال الدواءين سوياً قد يسبب مشاكل مثل تباطؤ نظم القلب (بطء القلب) مما قد يؤدي إلى الإغماء أو فقدان الوعي.

يجب توخي الحذر عند استعمال **ريفاستيجمين لصقة دِكسل** سوياً مع أدوية أخرى يمكنها أن تؤثر على نظم قلبك أو على النظم الكهربائي القلبي (استطالة المقطع QT)

استعمال الدواء والطعام

يمكن استعمال ريفاستيجمين **لصقة دِكسل** مع الطعام والشراب.

استعمال الدواء وإستهلاك الكحول

يمكن استعمال **ريفاستيجمين لصقة دِكسل** مع الكحول.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، تظنين أنك حامل أو تخططين حملاً، فاستشيري طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

لا تتوفر معلومات عن استعمال **ريفاستيجمين لصقة دِكسل** لدى النساء الحوامل. إذا كنت حاملاً، فيجب النظر في أفضليات **ريفاستيجمين لصقة دِكسل** مقابل التأثيرات المحتملة على الجنين. لا يجوز استعمال **ريفاستيجمين لصقة دِكسل** في فترة الحمل إلا إذا كان من الواضح أن استعماله إجباري. لا يجوز الإرضاع خلال فترة العلاج **بريفاستيجمين لصقة دِكسل**. ليس معلوماً ما إذا كان ريفاستيجمين يفرز في حليب الأم.

السفالة واستعمال الماكينات

سيتم لك طبيبك المشورة عما إذا كان مرضك يتيح لك سبإقة السيارة وتشغيل الماكينات بشكل آمن. قد يسبب **ريفاستيجمين لصقة دِكسل** الإغماء أو الأرتباك الخطير.

إذا شعرت بإحساس بالإغماء أو بالارتباك، فلا يجوز سبإقة السيارة أو استعمال الماكينات أو القيام بأي نشاط يتطلب اليقظة.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دوماً بموجب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

هأم:

- يجب نزع اللصقة السابقة قبل الصاق لصقة واحدة جديدة.**
- لصقة واحدة فقط في اليوم.**
- لا يجوز قص اللصقة لي قطع.**
- يجب الضغط على اللصقة بقوة لمدة 30 ثانية على الأقل بواسطة كف اليد.**
- لااستعمال الخارجي فقط.**

كيف يتم البدء بالعلاج؟

سيخبرك الطبيب أي **ريفاستيجمين لصقة دِكسل** هو الأنسب لك.

- يبدأ العلاج عادة باستعمال **ريفاستيجمين لصقة دِكسل 4.6 ملغ/24 ساعة**.

الجرعة اليومية الاعتيادية الموصى بها هي **ريفاستيجمين لصقة دِكسل 9.5 ملغ/24 ساعة**. إذا كان التحمّل جيدًا، فقد يرفع الطبيب الجرعة الدوائية إلى 13.3 ملغ/24 ساعة (لا يمكن الوصول إلى جرعة 13.3 ملغ/24 ساعة بواسطة **ريفاستيجمين لصقة دِكسل**. في الحالات التي يتعين فيها استعمال هذه الجرعة الدوائية، يجب استعمال مستحضرات ريفاستيجمين أخرى توجد لها لصقات للإعطاء عن طريق الجلد بجرعة 13.3 ملغ/24 ساعة).

- يجب استعمال لصقة واحدة فقط في كل مرة واستبدال اللصقة بلصقة جديدة بعد 24 ساعة.

خلال فترة العلاج يُحتمل أن يلامن الطبيب الجرعة بحيث تتناسب احتياجاتك الشخصية.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا لم تستعمل **ريفاستيجمين لصقة دِكسل** طوال أكثر من ثلاثة أيام، فلا تلتصق اللصقة التالية قبل أن تستشير طبيبك. يمكن مواصلة العلاج بلصقة من نفس الجرعة، إذا لم يتم إيقاف العلاج لأكثر من ثلاثة أيام. وإلا، فسيبدأ الطبيب من جديد علاجًا **بريفاستيجمين لصقة دِكسل 4.6 ملغ/24 ساعة**.


أين ينبغي الصاق ريفاستيجمين لصقة دِكسل؟

- قبل الصاق لصقة، يجب التأكد من أن الجلد نظيف وجاف وخالٍ من الشعر، نظيف من أي مسحوق، زيت، كريم ترطيب أو مستحلب والتي من شأنها أن تعيق التصاق اللصقة على الجلد بشكل سليم، خالٍ من التشروخ، الطفوح الجلدية و/أو التهيجات.
- يجب نزع اللصقة الموجودة بحذر قبل الصاق لصقة جديدة.** إذا الصقت على جسمك عدة لصقات، فقد يكون جسمك معرضاً لكمية فائضة من الدواء، وهي حالة قد تكون خطيرة.
- يجب الصاق لصقة واحدة فقط في اليوم، **فقط في إحدى المناطق الممكنة المعروضة** في الرسوم التوضيحية أدناه:
- الجزء العلوي من الذراع اليسرى أو الجزء العلوي من الذراع اليمنى
- الجانب الأيسر العلوي من الصدر أو الجانب الأيمن العلوي من الصدر **(يجب الامتناع عن الإصصاق على الثدي)**

الجانب الأيسر العلوي من الظهر أو الجانب الأيمن العلوي من الظهر

– الجانب الأيسر السفلي من الظهر أو الجانب الأيمن السفلي من الظهر

يجب نزع اللصقة الموجودة كل 24 ساعة قبل الصاق لصقة واحدة جديدة على مكان واحد فقط من الأماكن الممكنة التالية:




عندما تقوم باستبدال اللصقة، فأنت ملزم بنزع لصقة اليوم السابق قبل أن تلتصق اللصقة الجديدة، كل مرة في مكان آخر على الجلد (مثلاً على الجانب الأيمن من الجسم في يوم واحد وعلى الجانب الأيسر في اليوم التالي، في الجزء العلوي من الجسم في يوم واحد وفي الجزء السفلي من الجسم في اليوم التالي).

لا يجوز إصصاق لصقة جديدة في نفس المكان المضببط مرتين خلال 14 يوماً.

كيف ينبغي الصاق ريفاستيجمين لصقة دِكسل؟

لصقة رقيقة، لوها بني فاتح وتلتصق بالجلد. كل لصقة معبأة في كيس مغلق يحميها إلى أن تصبح جاهزاً للإصصاق. لا يجوز فتح الكيس أو إخراج اللصقة إلا قبل إصصاقها مباشرة فقط.

يجب نزع اللصقة الموجودة بحذر قبل الإصاق لصقة جديدة. يرجي من متلقي العلاج الذين يبذون بالعلاج للمرة الأولى ومتلقي العلاج الذين يبذون بالعلاج من جديد بعد إيقافه، أن يبذؤوا من الرسم التوضيحي الثاني.




كل لصقة معبأة في كيس مغلق يحميها. يجب فتح الكيس فقط عندما تكون جاهزاً لاستعمال اللصقة.

يجب قص الكيس بحسب كلا تاشيرتي المقص، لكن لا تتجاوز الخط المشار إليه للفتح، مزق الكيس. لا يجوز القص على كل طول الكيس، من أجل الامتناع عن التسبب بالضرر للصقة. أخرج اللصقة من الكيس.




انزع طبقة الغطاء عن الجانب العلوي ذي اللون البني الفاتح من اللصقة وتخلص من الغطاء.

توجد طبقة واقية تحمي الجانب اللاصق من اللصقة. انزع جانباً واحداً من الطبقة الواقية ولا تلمس الجزء اللاصق من اللصقة بالأصابع.



ضع الجانب اللاصق من اللصقة على منطقة الجزء العلوي أو الجزء السفلي من الظهر، على الجزء العلوي من الذراع أو على الصدر وعندما انزع الجانب الآخر من الطبقة الواقية.



بعد ذلك، يجب الضغط على اللصقة بقوة لمدة **30 ثانية** على الأقل بواسطة كف اليد للتأكد من التصاق الأطراف كما ينبغي.



إذا كان ذلك يساعدك، فيإمكانك أن تكتب مثلاً اليوم من الأسبوع على اللصقة بقلم حبر كروي رفيع.

يجب إبقاء اللصقة في مكانها بشكل متواصل إلى أن يحين وقت استبدالها بلصقة جديدة. يُحتمل أن ترغب بتجريب أماكن مختلفة لإصصاق اللصقة الجديدة لكي تجد أريح الأماكن والأماكن التي لن تحتك فيها الملابس باللصقة.

كيف ينبغي نزع ريفاستيجمين لصقة دِكسل؟

يجب سحب طرف واحد من **ريفاستيجمين لصقة دِكسل** بلطف وبيبطه لنزع اللصقة عن الجلد.

في حالة بقاء آثار صمغ على الجلد، بلل المنطقة بلطف بالماء الدافئ والصابون اللطيف أو استعمل زيت الأطفال من أجل إزالتها. لا يجوز استعمال الكحول أو السوائل المنظية الأخرى (مزيل طلاء الأطفال أو المنظيات الأخرى).

يجب عليك غسل اليدين بالصابون والماء بعد نزع اللصقة. في حالة ملامسة العينين أو إذا ظهر احمرار في العينين بعد العلاج باللصقة، فيجب شطف العينين فوراً بالكثير من الماء والتوجه لتلقي الإسعاف الطبي إذا لم تكن الأعراض عابرة.

هل يمكن استعمال ريفاستيجمين لصقة دِكسل أثناء الاستحمام، السباحة أو عند المكوث تحت أشعة الشمس؟

- لا يُتَصرَّح على يؤثر الاستحمام في حوض الاستحمام (البانيو)، أو السباحة أو الاستحمام بالبحر على اللصقة. يجب مراقبة اللصقة لتلاّ تراخي عند القيام بهذه النشاطات.
- لا يجوز تعريض اللصقة لأي مصدر حرارة خارجي (مثل ضوء الأشعة الشديدة، حمام الجيار (ساونا)، غرفة التسمير) لفترات زمنية طويلة.

ما الذي ينبغي فعله إذا سقطت اللصقة؟

إذا سقطت اللصقة، فيجب الصاق لصقة جديدة لليقة اليوم، ثم استبدالها في اليوم التالي في الموعد المحدد.

متى ولأي مدة يجب استعمال ريفاستيجمين لصقة دِكسل؟

- للاستفادة من العلاج عليك استعمال لصقة جديدة كل يوم، يُفضَّل استبدال اللصقة في نفس الساعة كل يوم.
- يجب استعمال لصقة واحدة فقط في كل مرة واستبدالها بلصقة جديدة بعد 24 ساعة.

إذا استعملت خطأ أكثر مما يلزم من ريفاستيجمين لصقة دِكسل

إذا استعملت خطأ أكثر من لصقة واحدة، فيجب نزع جميع اللصقات عن جلدك ثم إبلام الطبيب المعالج. أنك استعملت خطأ أكثر من لصقة واحدة.

يُحتمل أن تحتاج إلى مراقبة طبية. لدى بعض الأشخاص الذين استعملوا خطأ أكثر من اللازم من ريفاستيجمين نشأ غثيان، تقيؤ، إسهال، ضغط دم مرتفع وهلوسات. قد يحدث أيضًا نبض بطيء وإغماء.

إذا استعملت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد بيلع الدواء خطأً أو بالصاق لصقة على جسمه، فتوجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأخضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت استعمال ريفاستيجمين لصقة دِكسل

إذا اكتشفت أنك نسيت استعمال **ريفاستيجمين لصقة دِكسل**، فألصق لصقة جديدة على الفور. بإمكانك إصصاق اللصقة التالية في الوقت الاعتيادي في يوم الغد. لا يجوز استعمال لصقتين معاً للتعويض عن تلك المنسية.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن استعمال ريفاستيجمين لصقة دِكسل

أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا توقفت عن استعمال اللصقة.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا توقرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال **ريفاستيجمين لصقة دِكسل** إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تلتق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يكون شيوع الأعراض الجانبية أعلى عند البدء بالعلاج أو عند رفع الجرعة الدوائية. في معظم الحالات تختفي الأعراض الجانبية بالتدرج، إذ إن الجسم يتكيف مع الدواء.

انزع العلاج وأعلم الطبيب المعالج فوراً إذا شعرت بوحد أو أكثر من بين الأعراض الجانبية التالية التي قد تصبح خطيرة:

- أعراض جانبية شائعة** (أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100):
- فقدان الشهية
- إحساس بالدوار
- إحساس بالهبجان أو بالميل إلى النوم
- عدم السيطرة على التبول (عدم القدرة على حبس البول كما ينبغي)

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1,000):

- مشاكل في دقات قلبك مثل تباطؤ دقات القلب

- رؤية أشياء غير موجودة في الواقع (هلوسات)
- فرجة المعدة
- تجفاف (فقدان كبير جدًا للسوائل)
- فرط النشاط (مستوى مرتفع من النشاط، تملل)
- عدوانية (ضراوة)

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 10,000):

- سقوط
- أعراض جانبية نادرة جدًا** (أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):
- تصلب الذراعين أو الرجلين
- ارتجاع البنين

أعراض جانبية مدى شيوعها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد):

- رد فعل تحسسي في مكان إصصاق اللصقة، مثل الحويصلات أو الجلد المتهدب
- تفاقم في أعراض مرض الباركينسون (الرعاش) – مثل الارتجاف، التصلب والهبجان في المشي
- التهاب في البنكرياس – تشتمل الأعراض على ألم شديد في الجزء العلوي من البطن، مصحوب غالباً بالغثيان أو التقيؤات
- دقات قلبية سريعة أو غير منتظمة
- ضغط دم مرتفع
- نوبات اختلاجات
- اضطرابات في الكبد (جلد أصفر، اصفرار بياض العينين، بول غامق بشكل شاذ أو غثيان، تقيؤ، تعب، وفقدان الشهية دون مبرر)
- تغيرات في نتائج الفحوص التي تدل على وظائف الكبد
- إحساس بعدم الهوء
- كوابيس ليلية

انزع اللصقة وراجع طبيبك فوراً إذا أحسست بأحد الأعراض الجانبية الواردة أعلاه.

أعراض جانبية إضافية لم يتم التلبيغ عنها بخصوص ريفاستيجمين كبسولات أو ريفاستيجمين محلول وقد تحدث عند استعمال اللصقات:

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100):

- فائض من اللعب
- فقدان الشهية
- إحساس بعدم الهوء
- شعور عام سيئ
- ارتجاع أو إحساس بالارتباك
- فرط التعرق

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1,000):

- نظم قلبي غير منتظم (مثل نظم القلب السريع)
- صعوبات في النوم
- حالات سقوط عارضة

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 10,000):

- نوبات اختلاجات
- فرجة في الأمعاء
- آلم في الصدر قد ينبع من تشنج في القلب

أعراض جانبية نادرة جدًا (أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):

التهاب البنكرياس – تشتمل الأعراض على ألم شديد في الجزء العلوي من البطن، مع الغثيان أو التقيؤات في أحيان متقاربة

- نزيف دموي في الجهاز الهضمي – يظهر على شكل دم في البراز أو في القيء
- رؤية أشياء غير موجودة في الحقيقة (هلوسات)

بعض متلقي العلاج الذين عانوا من تمزق في أنبوب المريء الذي يصل بين الفم والمعدة

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تلف أحد الأجزاء الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التلبيغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "டுוווו על תפועות לוווו" **עקב טיפול תרופותי** الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الامتارة المتصلة للتليغ عن أعراض جانبية، عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضع وعن مجال روثيهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (**תאריך תפוגה**) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- ظروف التخزين:** يجب التخزين فيما دون **25°C**. يجب التخزين في العبوة الأصلية. احفظ اللصقة داخل كيسها إلى أن تستعملها.
- لا يجوز استعمال اللصقة إذا كانت متضررة أو إذا وُجِدَت علامات على فتح العبوة.
- بعد نزع اللصقة، قم بظئها إلى طبقين بحيث تنجع الجوانب اللاصقة إلى الداخل، يجب الضغط عليها ورصها معاً. أرجع اللصقة المستعملة إلى كيسها وتخلص منها بحيث لا يستطيع الأولاد لمسها. لا يجوز لمس العينين بأصابعك، يجب شطف اليدين بالصابون والماء بعد نزع اللصقة. لا يجوز إقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة القبايات البيئية. أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الوسائل ستساهم في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على:

Polyester film, fluoropolymer-coated, polyethylene/thermoplastic resin/ aluminum coated polymer film, poly (2-ethylhexyl)acrylate, vinylacetate), high molecular weight polyisobutene, paraffin light liquid, medium molecular weight polyisobutene, silica colloidal anhydrous, orange printing color.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

لصقة مستديرة، الطبقة الخارجية لوونها بني فاتح وعليها التأثير:

"RIV-TDS 4.6 mg/24 h" لريفاستيجمين لصقة دِكسل **4.6 ملغ/24 ساعة**

"RIV-TDS 9.5 mg/24 h" لريفاستيجمين لصقة دِكسل **9.5 ملغ/24 ساعة**.

كل لصقة معبأة في كيس مغلق. تحتوي كل عبوة على 30 كيساً.

اسم المصنع **عنوانه:** لوبيي فارما أ.ج، ميبياج، ألمانيا

تم تحرير النشرة في آب/أغسطس 2023 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

ريفاستيجمين لصقة دِكسل **4.6 ملغ/24 ساعة:** 00-34462-87-158

ريفاستيجمين لصقة دِكسل **9.5 ملغ/24 ساعة:** 00-34452-87-158

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

صاحب التسجيل: دِكسل م. ض.

شارع دِكسل 1، أور عاكبًا 3060000، إسرائيل