

كوماچیس کریم

يحتوي كل 100 غرام من كوماچیس کریم على:
1 غرام بيفونازول (Bifonazole)
0.05 غرام فلواوسینونید (Fluocinonide)

المادة غير الفعالة ومولدات الحساسية في الدواء - أنظر
الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء"
والفقرة 6 "معلومات إضافية".

إنقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا
توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للأخرين.
 فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية
مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

كوماچیس کریم يخفف من حالات الإلتهاب التي تترافق
بتلوث فطري والتي تستجيب لعلاج كورتيکوئيدي.

الفصيلة العلاجية: مضاد للإلتهاب + مضاد للفطريات.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (أليلرجي) للمواد الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6).
- لعلاج طفح الحفاضات. إذا وجد لدى طفلك طفح الحفاضات، توجه إلى الطبيب للحصول على العلاج المناسب.
- لعلاج التلوثات في الأظافر أو فروة الرأس.
- لعلاج الإلتهابات في المهبل.
- لا يجوز إستعمال الدواء على مناطق واسعة من الجسم أو لمدة زمنية طويلة.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- لا يجوز السماح للدواء بلامسة العينين.
- لا يجوز تضمييد، تغطية أو تغليف منطقة العلاج بحيث تتشكل ضمادة سادة، إلا بتعليمات من الطبيب.

قبل العلاج بـ كوماچیس کریم إحكام الطبيب إذا

- قاسيت ذات مرة من رد فعل تحسسي لأي مادة مضادة للفطريات.

التفاعلات/التفاعلات بين الأدوية

- إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخصوص إذا كنت تستعمل وارفارين (مضاد التخثر).

الحمل، الإرضاع والخصوبة

- لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعة. إلا بتوصية الطبيب فقط. لا تتوفر معلومات بخصوص تأثير إستعمال كوماچیس کریم فيما يتعلق بمسألة الخصوبة. يجب إستشارة الطبيب قبل الإستعمال.

الإستعمال لدى الأطفال والرضع

- لا يجوز إستعمال الحفاضات الضيقة أو الملابس الداخلية البلاستيكية لدى الأطفال المتعالجين في منطقة الحفاضات، لأن هذه الملابس تشكل ضمادة سادة.

قد يمتص الأطفال بشكل نسبي كميات أكبر من الكورتيكosteroides الموضعية وبالتالي قد يكونوا أكثر حساسية لتسوس جهازي. إذا تطور تهيج فيجب إيقاف العلاج.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء
يحتوى الدواء على كحول ستيوستيريل (cetostearyl alcohol) الذي قد يسبب تهيجاً موضعاً في الجلد (مثل طفح، حكة أو إحمرار).

يحتوى الدواء على 10.36 ملغم كحول بنزيلي (benzyl alcohol) في 1 غرام كريم. قد يسبب الكحول البنزيلي رد فعل تحسسي وتهيجاً موضعاً طفيفاً.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

تعليمات الإستعمال:

- قبل إستعمال الدواء يجب ثقب ختم الأنبوبة عن طريق قلب الغطاء، والضغط عليه على سطح طرف الأنبوبة.
- قبل دهن الكريم، يجب غسل وتخفيف المنطقة المصابة جيداً، خاصة بين أصابع القدم، في حالة الإصابة بتلوث في راحتي القدمين.
- يجب دهن طبقة رقيقة ومتجانسة من الكريم على المنطقة المصابة مرة في اليوم، يفضل في الليل قبل النوم، والتقليل بلطف لداخل الجلد.
- سيتم تحديد مدة العلاج من قبل الطبيب.
- في حالة إصابة راحة القدم بتلوث، من المُحتمل أيضاً إستعمال مسحوق مضاد للفطريات. يستشر الطبيب أو الصيدلي للحصول على توصية بشأن مستحضر معين. من المفترض أن تتحسن أعراض التلوث في الجلد، مثل الحكة أو الألم، خلال عدة أيام من العلاج. مع ذلك، فإن العلامات مثل إحمرار وتقشر الجلد قد تختفي بعد فترة أطول. إذا لم تتحسن الأعراض خلال 7 أيام، توجه لإستشارة الطبيب.
- لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به. للإستعمال الخارجي فقط.
- لا يجوز إدخال الكريم إلى الفم أو بلعه.
- إذا لامس الدواء عن طريق الخطأ الفم أو العينين، يجب الشطف فوراً بالماء والتوجه إلى الطبيب.
- إذا بلع طفل أو شخص آخر بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.
- إذا نسيت دهن الدواء في الوقت المطلوب، إدhen الدواء في أقرب وقت ممكن وإستمر بالعلاج كالمعتاد. يجب المراقبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

كيف يمكنك المساهمة في نجاح العلاج؟
• على الرغم من أن المنطقة المصابة سوف تتغير الحكة، حاول الإمتناع عن حكها. سوف يسبب الحك ضرراً لسطح الجلد وبالتالي سوف يسبب انتشار التلوث بشكل أكبر.

- حافظ على المناطق المصابة نظيفة.
- الرطوبة تحت على نمو الفطريات. لذا يجب الحفاظ على الجفاف في المكان المناسب.
- يجب غسل المنطقة المصابة قبل كل عملية دهن للدوااء. بين علاج وعلاج - يمكن إستعمال مسحوق مضاد للفطريات للتخفيف المكان.

- إغسل دائمًا اليدين بعد علاج التلوث وذلك لمنع إنتشاره.
 - لا تشارك مع أشخاص آخرين المناشف، حصائر حوض الاستحمام وما شابه لأن التلوث قد ينتقل إليهم.
 - إذا كان العلاج في القدمين - يجب الحرص على الإغتسال جيداً والتجفيف خاصة بين أصابع القدم، لكن يجب تجنب الإفراط في الفرك. من المستحسن إستعمال جوارب قطنية؛ يجب الامتناع عن ارتداء جوارب من الصوف أو من مواد إصطناعية. من المستحسن إستبدالها عدة مرات في اليوم (بحسب كمية التعرق).
 - إغسل جيداً الجوارب، جوارب النايلون والجوارب الطولية بماء ساخن لإزالة كافة الجلد المتتشكل أو أيواغ الفطريات.
 - بدأ حذائك يومياً بقدر الإمكان.
 - في المواسم المناسبة يوصى بإنتقال صنادل بدون جوارب.
 - إذا كنت تخاطط للتوقف عن الدواء، نقاش عواقب ذلك مع الطبيب قبل التوقف.
 - لا يجوز إستعمال أنوبيه في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. وضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
 - إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.
- (4) الأعراض الجانبية**
- كما بكل دواء، إن إستعمال كوماجيس كريم قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تذهبش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها. يجب إبلاغ الطبيب عن أية علامة لحدث عرض جانبى موضعى، خاصة تحت الضمادة السادة.
- كما هو الحال مع جميع الأدوية، هنالك أشخاص قد يكونوا حساسين للدواء. إذا كنت حساساً، فإن رد الفعل سوف يتتطور مباشرةً بعد بدء الإستعمال. في حال قاسيت من رد فعل تحسسي فتوقف عن الإستعمال وتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في أقرب مستشفى.
- علامات رد الفعل التحسسي تشمل:
- طفح.
 - مشاكل في البلع أو في التنفس.
 - إنفاس الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.
 - ضعف، دوار أو إغماء.
 - غثيان.
- بعد دهن الكريم من الجائز أن تشعر بإحدى الأعراض التالية:
- تهيج طفيف أو كثي.
 - إحمرار الجلد.
 - تقشير (Peeling).
- إذا لم يكن بالإمكان تحمل الأعراض، فتوقف عن العلاج وتوجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن.
- قد يسبب الدواء تهيجاً موضعاً في الجلد الذي يشبه إلى حد كبير أعراض التلوث. إذا تفاقمت إحدى الأعراض، فتوقف عن العلاج وتوجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن.
- قد تشمل هذه الأعراض:
- كثي، ألم أو حكة.
 - طفح، إحمرار، جفاف.
 - مظهر لين أو رطب للجلد.
 - إنفاس، شرى (آفات حمراء، بارزة ومثيرة للحكة).
 - حويصلات.

يتم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية بأوقات متباudeة عند إستعمال الكورتيكوسيرتوناتات الموضعية، ولكنها قد تحدث بتواءٍ أعلى عند إستعمال ضمادة سادة:

كثي، حكة، تهيج، جفاف، إتهاب جريب الشعرة، فرط نمو الشعر لدى النساء (ليس من مصدر هورموني)، إضطرابات جلدية شبيهة بحب الشباب (acneiform eruptions)، نقص التصبغ (hypopigmentation)، إلتهاب الجلد حول الفم، إلتهاب الجلد التماسي التحسسي (contact dermatitis allergic)، طرأوة الجلد، تلوث ثانوي، ضمور الجلد، علامات شد، الدُّخينة (miliaria).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعانى من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبیة

بالإمكان التبلیغ عن اعراض جانبیة لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبیة عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية الموقع وزارة الصحة [[www.health.gov.il]] الذي يوجه إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبیة، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبلیغ شركة پاداجیس إسرائيل فارماستیکا م.ض. بواسطة العنوان التالي:

Padagis.co.il

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تنسى التقييم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. بعد فتحه لأول مرة، يمكن إستعمال الدواء لمدة 6 أشهر بما لا يتجاوز تاريخ إنتهاء الصلاحية.
- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.
- خذن في العبوة الأصلية.

- لا يجوز إلقاء أدوية في المجاري أو في القمامات المنزلية. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

- يحتوى الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً على:

Cetostearyl alcohol, 2-octyldecanoate, cetyl esters wax, sorbitan monostearate, polysorbate 60, benzyl alcohol, purified water.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: تحتوي أنوبية الألومينيوم على 7 أو 15 غرام كريم بلون أبيض.
- إسم المنتج وصاحب الإمتياز: پاداجیس إسرائيل فارماستیکا م.ض.، شارع راكيفيت 1 شوهام.
- تم إعدادها في أيار 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 063.04.26742

- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.