

كولوتال أقراص 135 ملغ

كل قرص يحتوي على 135 ملغ ميبيفيرين هيدروكلوريد (Mebeverine hydrochloride).

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر - أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" في هذه النشرة.

اقرأ النشرة بتعمن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. عليك تناول المستحضر بحسب التعليمات في فقرة المقدار الدوائي من هذه النشرة. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقم أو لم تحسن أعراض المرض.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لعلاج متلازمة تشنج الأمعاء (متلازمة المعوي المتوتج).

الفصيلة العلاجية: من مضادات الكولين.

المعي عبارة عن أنبوب طويل عضلي يسمح للطعام بالمرور عبره خلال عملية الهضم. إذا تقلص المعوي بقوة تزيد عن الحد، فسوف تشعر بألم. يعمل هذا الدواء على إرخاء التقلصات (التشنجات) وتخفيف الألم.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

كنت حساساً (ألبرجي) للمادة الفعالة ميبيفيرين هيدروكلوريد أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" في هذه النشرة).

الأطفال والمراهقون:

هذا الدواء غير مخصص عادة لرضع، لأطفال ولمرهقين دون عمر 18 سنة.

التداخلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إكح للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

الحمل والإرضاع:

- إستشيري الطبيب إذا كنت في فترة الحمل أو تخططين لحصول حمل. لا يوصى بإستعمال كولوتال خلال فترة الحمل من الجائز أن يوصيك الطبيب بالتوقف عن العلاج بـ كولوتال أو بتناول دواء آخر.
- إستشيري الطبيب إذا كنت مرضعة أو تبتئين في الإرضاع. لا يوصى بتناول كولوتال خلال فترة الرضاعة. من الجائز أن يوصيك الطبيب بالتوقف عن الإرضاع أو بتناول دواء آخر إذا كنت ترغبين في الإرضاع.

السياسة وإستعمال الماكنتات:

بقدر ما هو معروف ليس لـ كولوتال تأثير على السياسة أو إستعمال الماكنتات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي الدواء على لكتوز وسكروز. في حال وجود حساسية لسكريات معينة، فيجب إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

- عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.
- المقدار الدوائي الإعتيادي هو قرص واحد 3 مرات في اليوم.
- لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة تناول:

- يجب تناول القرص سوية مع كأس مليئة بالماء.
- يوصى بتناول القرص قبل 20 دقيقة تقريبا من وجبة الطعام.
- حاول تناول الأقراص في أوقات محددة من كل يوم وبفواصل زمنية متساوية بحيث يمتد تناول الأقراص على طيلة اليوم.
- لا يجوز مضغ، سحق أو شطر القرص.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالا إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الموعد المحدد فلا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف. تناول المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كولوتال قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهم من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أياً منها. عليك التوقف عن تناول الدواء ومراجعة الطبيب حالاً إذا ظهرت العلامات التالية، فمن الجائز أن تحتاج علاجاً طبياً:

- صعوبات في التنفس، إنتفاخ في الوجه، في العنق، في الشفتين، في اللسان أو في الحنجرة. من الجائز أنك تعاني من رد فعل تحسسي شديد للدواء.

أعراض جانبية إضافية:

من الجائز أن تعاني من رد فعل تحسسي طفيف للدواء، مثل طفح، إحمرار، تهيج في الجلد.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة باداجيس بواسطة الدخول إلى الرابط:

www.padagis.co.il

(5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر علبة الكرتون وعبوة اللويحة (بليستر). يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في مكان بارد، دون 25 درجة مئوية.

(6) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:
Lactose Monohydrate, Sucrose, Potato Starch, Talc, Povidone 25, Magnesium Stearate, Gelatin, Acacia, Carnauba Wax.
يحتوي كل قرص على 97 ملغ لكتوز و- 79 ملغ سكروز.
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:
الأقراص معبأة ضمن لويحات (بليستر). في كل لويحة يوجد 10 أقراص بيضاء. تتوفر أحجام علب تحوي 20، 50 أو 100 قرص. من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.
- إسم المنتج وصاحب الإمتياز وعنوانه: باداچيس إسرائيل
فارماسثيتيكا م.ض.، شارع راكيفيت 1، شوهام.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
كولوتال أقراص 00-25831-72-035.
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.
- تم تحديثها في شهر أيلول 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.