

تكفائلي (تكليستاماب) بطاقة للمعالج/ة

إحمل هذه البطاقة معك بشكل دائم.

إعرض هذه البطاقة لكافة أفراد الطاقم الطبي الذين يشاركون بعلاجك، وعند وصولك إلى المستشفى



قد يؤدي تكفائلي إلى أعراض جانبية، التي من شأنها أن تكون شديدة وتشكل خطراً على الحياة مثل متلازمة إفراز السيستوكينات (CRS)، رد فعل مناعي خطير الذي قد ينجم جراء عوامل مختلفة وعدة أنواع من الأدوية، بالإضافة لذلك، قد يؤثر تكفائلي على الجهاز العصبي، ويؤدي إلى متلازمة السُميّة العصبية المرتبطة بالخلايا المناعية الفعالة (ICANS).

إسم المتعالج/ة:

معلومات هامة للمعالجين حول الأمان

توجه فوراً لتلقي مساعدة طبية إذا كنت تقاسي واحداً مما يلي:

- سخونة (38°C وما فوق)
- إرتباك
- قشعريرة
- الشعور بضعف في اليقظة
- نظم قلب سريع
- صعوبة في النطق والكتابة (بما في ذلك تغيرات في خط اليد)
- صعوبة في التنفس
- غثيان
- ضعف عضلي، حركات بطيئة، صعوبة في المشي
- إختلاجات
- صداع
- ضعف الذاكرة
- الشعور بدوار

قد تكون هذه علامات وأعراض لرد فعل مناعي خطير (CRS) هذه بعض من التأثيرات المحتملة على الجهاز العصبي، بعضها قد يشكل علامات وأعراض لـ (ICANS)

إذا كنت تقاسي من أي عرض من تلك المذكورة في هذه البطاقة إتصل بالطبيب/ة خاصتك أو توجه لتلقي مساعدة طبية طارئة بشكل فوري! هذه ليست كافة الأعراض الجانبية المحتملة لـ تكفائلي. إحكِ للطبيب/ة خاصتك إذا وُجد لديك أي عرض جانبي يزعجك أو لا يزول.

من المهم أن تتذكر: أمكث قريباً من المكان الذي تلقيت فيه العلاج حتى يومين بعد تلقي المقادير الدوائية الثلاثة الأولى من تكفائلي (عادةً مقدارين دوائيين بمقدار دوائي تدريجي ومقدار دوائي داعم أول). من الجائز أن يرشدك طبيبك بالبقاء قريباً من المكان الذي تلقيت فيه العلاج حتى عند إعطاء مقادير دوائية إضافية.

الطبيب/ة المعالج/ة

رقم هاتف الطبيب/ة المعالج/ة:

إسم الطبيب/ة المعالج/ة:

رقم الهاتف:

إسم المستشفى وعنوانه:

معلومات للتعبئة من قبل الطاقم الطبي

الرجاء سَلِّم هذه البطاقة للطاقم الطبي الخاص بك من أجل تعبئة المعلومات وإعادتها إليك.
تواريخ حقن تكفائلي (جدول مواعيد الإعطاء التدريجي للمستحضر):

تاريخ المقدار الدوائي التدريجي الأول:

تاريخ المقدار الدوائي التدريجي الثاني:

تاريخ إعطاء المقدار الدوائي الداعم الأول*:

* هذا هو المقدار الدوائي الكامل الأول للعلاج (1.5 ملغ/كلغ)

معلومات هامة حول الأمان للطواقم الطبية

متلازمة إفراز السيروتونين (CRS)، أو سُمِّيَة عصبية (ICANS) بدرجة خطيرة مهددة للحياة، قد تحدث لدى متعالجين يتلقون تكفائلي. لمعلومات إضافية يجب قراءة نشرة الطبيب بتمعن.

غالبية حالات الـ CRS والسُمِّيَة العصبية التي لوحظت بعد إعطاء تكفائلي كانت بدرجة (Grade) 1 و-2. CRS من شأنها أن تُشرك عدة أجهزة في الجسم. هيئ المتعالج لعلامات وأعراض CRS وسُمِّيَة عصبية. إذا بلغ المتعالج الخاص بك عن أية علامات أو أعراض المذكورة في هذه البطاقة، الرجاء إتصل بالطبيب/ة المعالج/ة الخاص/ة به بشكل فوري من أجل الحصول على معلومات إضافية.

التبليغ عن أعراض جانبية

هذه الصيغة ومحتواها تم تحديثها والمصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في تشرين الأول 2023.

لمعلومات إضافية، يجب قراءة نشرة المستهلك بتمعن.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة: www.health.gov.il، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

بالإضافة لذلك، بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية مباشرة لشركة يانسن إسرائيل، عبر هاتف رقم: 09-9591111.