

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986
يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

قنتولين حُقن

محلول للحقن

تحتوي كل أمبولة ذات 1 ملل على المادة الفعالة:

سالبوتامول (كسولفات) 0.5 ملغ salbutamol (as sulfate) 0.5 mg

لقائمة المواد غير الفعالة والمثيرة للحساسية في المستحضر، انظر البند 2 - "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

قنتولين حُقن مخصص للبالغين ويُستعمل للتخفيف في حالة التشنج القسبي الشديد (severe bronchospasm).
يعمل قنتولين حُقن كموسع القصبات الهوائية عند الانسداد العكوس للطرق التنفسية.
يتم توسع القصبات الهوائية خلال وقت قصير (بدء الفعالية خلال 5 دقائق) ولفترة قصيرة الأمد (4-6 ساعات).

المجموعة العلاجية: ناهض انتقائي للمستقبل الأدرينالي بيتا-2.

يحتوي قنتولين حُقن على المادة الفعالة سالبوتامول التي تنتمي لفصيلة الأدوية المسماة موسعات القصبات الهوائية.
• تساعد موسعات القصبات الهوائية على بقاء الطرق الهوائية في الرئتين مفتوحة، الأمر الذي يسهل دخول وخروج الهواء.
• تساعد في تخفيف الضغط داخل الصدر، الصفير والسعال.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (ألرجي) لـ سالبوتامول سولفات، أو لأي مركب من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصل في البند 6).

إذا كنت تعتقد أن ما ورد أعلاه ينطبق عليك، فلا تستعمل قنتولين حُقن. إذا لم تكن متأكدًا، استشر الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال قنتولين حُقن.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بـ قنتولين حُقن، أخبر الطبيب إذا:

- كان لديك ضغط دم مرتفع.
- كان لديك سكري.
- كان لديك فرط في نشاط الغدة الدرقية.
- وجدت لديك سابقة لمشاكل في القلب مثل نبض غير منتظم، نبض سريع أو ذبحة صدرية.
- كنت تتناول مشتقات الكسانثين (مثل ثيوفيلين) أو ستيروئيدات لعلاج الربو.
- كنت تتناول مدرات بولية، التي تستعمل أحياناً لعلاج ضغط الدم المرتفع أو مرض القلب.
- تناولت أدوية أخرى تُستعمل لتخفيف احتقان الأنف (مثل إيفيدرين أو سودوإيفيدرين) أو أدوية أخرى تستعمل لعلاج الربو.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

- إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بشكل خاص يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:
- أدوية لنبض القلب غير المنتظم أو السريع (خصوصًا من مجموعة حاصرات البيتا مثل پروبرانولول).
 - أدوية أخرى لعلاج الربو لديك.

لا يتم إعطاء قنطولين حُقن في نفس المحقنة مع أي دواء آخر.

استعمال الدواء والطعام

يمكن استعمال قنطولين حُقن في أي ساعة على مدار 24 ساعة، مع أو بدون طعام.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تظنين أنك قد تكونين حاملاً أو إذا كنت تخططين للحمل، استشيرى الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء.

السياقة واستعمال الماكينات

من غير المحتمل أن يؤثر قنطولين حُقن على قدرتك على السياقة أو استعمال أي أدوات أو ماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليومول من الصوديوم (23 ملغ) لكل أمبولة ذات 5 ملل، لذلك يمكن القول إنه عملياً خالي من الصوديوم.

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بالنسبة للمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

كيف يتم إعطاء الحقنة

عادة ما يتم إعطاء قنطولين حُقن من قبل الطبيب أو الممرضة. يمكن حقنه تحت الجلد (إعطاء تحت الجلد [S.C.]، مباشرة في الوريد أو في العضل (إعطاء في الوريد [I.V.] أو في العضل [I.M.]).
لن يتطلب منك أبداً حقن الدواء لنفسك. سيتم إعطاؤه لك دائماً من قبل شخص مؤهل لذلك.

تشتمل الأمبولات على نظام فتح من نوع OPC (One Point Cut) ويجب فتحها باستعمال الإرشادات التالية:

- أمسك الجزء السفلي من الأمبولة بيد واحدة.
- ضع اليد الأخرى على الجزء العلوي من الأمبولة، بحيث يتم وضع الإبهام فوق نقطة اللون، واضغط.

الإعطاء تحت الجلد (S.C.) أو الإعطاء في العضل (I.M.)

• المقدار الدوائي المتبع عادة هو 8 مكغ لكل كغم من وزن الجسم كل 4 ساعات.

الإعطاء البطني في الوريد (I.V.)

- المقدار الدوائي المتبع عادة هو 4 مكغ لكل كغم من وزن الجسم.
- سيتم إجراء الحقنة ببطء وقد يتطلب الأمر تكرار الإعطاء.
- يمكن تخفيف قنطولين حُقن في 10 ملل من ماء للحقن (Water for Injection).
- يمكن حقن 5 ملل من المحلول المحضّر المخفف (250 مكغ في 5 ملل) ببطء في الوريد.

يُمنع تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا تناولت بالخطأ مقدارًا دوائياً أكبر سيتم دائماً إعطاء قنطولين حُقن تحت ظروف خاضعة للرقابة وبحذر. مع ذلك، إذا كنت تعتقد أنك قد تلقيت مقدارًا دوائياً مفرطاً من قنطولين حُقن، أخبر الطبيب أو الممرضة عن ذلك في أقرب وقت ممكن. قد تحدث الأعراض التالية:

- سينبض قلبك بشكل أسرع من المعتاد.
- ستشعر بارتجاف.
- فرط نشاط (hyperactivity).
- يمكن أن يؤدي تراكم الحمض في جسمك إلى أن يكون تنفسك أسرع. عادة ما تختفي هذه الأعراض خلال ساعات معدودة.

إذا تناولت مقدارًا دوائياً مفرطاً أو إذا قام طفل ببلع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا توقفت عن تناول الدواء لا يجوز التوقف عن تناول الدواء بدون استشارة الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال قنطولين حُقن قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًا منها.

الأعراض الجانبية التالية قد تظهر مع هذا الدواء:

ردود فعل تحسسية (هذه قد تظهر لدى أقل من 1 من كل 10,000 شخص):
إذا حصل لديك رد فعل تحسسي، توقف عن استعمال قنطولين حُقن وراجع الطبيب حالاً.
علامات رد فعل تحسسي تشمل: انتفاخ الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحنجرة الذي قد يؤدي إلى صعوبات في البلع أو صعوبات في التنفس، طفح حاك، شعور بإغماء ودوار وانهيار.

راجع الطبيب بأسرع ما يمكن إذا:

- كنت تشعر بأن قلبك ينبض بشكل أسرع أو أقوى من المعتاد (خفقان القلب). هذا العرض عادة لا يسبب الضرر وغالباً ما يزول بعد استعمالك للدواء لفترة من الزمن.
- من الجائز أن تشعر أن نبضك غير منتظم أو أنه ينبض نبضة إضافية.
- هذه الأعراض قد تظهر لدى أقل من 1 من كل 10 أشخاص.

إذا ظهر لديك أحد هذه الأعراض، راجع الطبيب بأسرع ما يمكن. لا تتوقف عن استعمال هذا الدواء إلا إذا قيل لك بأن تفعل ذلك.

أخبر الطبيب إذا كان لديك أحد الأعراض الجانبية التالية، والتي قد تظهر هي أيضاً خلال استعمال هذا الدواء:

أعراض جانبية شائعة جدًا
قد تظهر هذه لدى أكثر من 1 من كل 10 أشخاص:
• الشعور بارتجاف.

أعراض جانبية شائعة
هذه قد تظهر لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص:
• صداع.
• تقلصات عضلية.

أعراض جانبية نادرة
هذه قد تظهر لدى حتى 1 من كل 1,000 شخص:
• انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم.
• جريان دم متزايد إلى الأطراف (توسع محيطي).

أعراض جانبية نادرة جدًا
هذه قد تظهر لدى حتى 1 من كل 10,000 شخص:
• تغيرات في أنماط النوم وتغيرات في السلوك، مثل قلة الراحة وانفعال مفرط.

قد تظهر أيضًا الأعراض الجانبية التالية لكن شيوعها غير معروف:
• وخز أو ألم عند إعطاء الحقنة مباشرة في العضل.
• الشعور بوعكة (غثيان وتقيؤات).
• ألم في الصدر بسبب مشاكل في القلب مثل ذبحة صدرية (angina). بلغ الطبيب، الممرضة أو الصيدلي إذا حدث ذلك. لا تتوقف عن استعمال هذا الدواء إلا إذا قيل لك بأن تقوم بذلك.
• حالة تسمى "حمض لكتيكي" (Lactic acidosis) والتي قد تسبب آلام في البطن، فرط التنفس (فرط التهوية)، ضيق في التنفس، برودة القدمين واليدين، عدم انتظام النبض أو الشعور بالعطش.

إذا كنت تعتقد بأن هذا الدواء لا يعمل جيدًا بشكل كافٍ بالنسبة لك
إذا بدا لك بأن دواءك لا يعمل كالمعتاد، راجع الطبيب بأسرع وقت ممكن.
من الجائز بأن مشكلة التنفس لديك تتفاقم ومن الجائز أنك تحتاج لدواء آخر. لا تتناول مقدارًا دوائيًا إضافيًا من فنتولين حُقن إلا إذا أخبرك الطبيب بفعل ذلك.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن مجال رؤية ومنتناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين تحت الـ 30°C.
- يجب حفظ الأمبولات داخل عبوة الكرتون للحماية من الضوء.

- يجب التخلص من المحلول خلال 24 ساعة بعد التحضير.
- إذا قيل لك التوقف عن استعمال الدواء، قم بإعادة الدواء فنتولين حُقن غير المستعملة إلى الصيدلي بهدف التخلص منه.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات في البيت. قم باستشارة الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلّص من أدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. هذه الخطوات ستساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- بالإضافة إلى المركب الفعّال، يحتوي الدواء أيضًا على:
Sodium chloride, sodium hydroxide, dilute sulfuric acid, water for injection, nitrogen.
- كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:
تحتوي عبوة الكرتون على 5 أمبولات زجاجية (كل أمبولة تحتوي على 1 ملل) الموجودة في عبوة بلاستيكية، تحتوي 5 ملل على 2.5 ملغ من سالبوتامول (كسولفات) في محلول ملحي قياسي معقم تم ضبطه على pH بقيمة 3.5.
- صاحب التسجيل: جالكوسميثكالين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتح تكفا.
- المنتج: جالكوسميثكالين مانوفاكتورينج S.P.A، پارما، إيطاليا.
- رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسميّ في وزارة الصحة: 027-64-21556-05.
- من أجل سهولة وتُهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم تحريرها في تشرين الأول 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

العلامات التجارية بملكية أو بامتياز مجموعة شركات GSK.
©2023 مجموعة شركات GSK أو صاحب الامتياز الخاص بها.

Ven Inj PT v1D