כאשר אתה רואה את המספר "8" בחלון למעקב מנות , עדיין קיימת תרופה בתוך הבקבוקון ויש להוציא אותה:

- עליך ללחוץ ולשחרר לחץ עוד 4 פעמים נוספות כאשר התרסיס מכוון בכיוון אחר ממך (ומאנשים אחרים).
- אתה תרגיש התנגדות מעט מוגברת בעת הלחיצה והמקום המיועד לאצבעות ינוע מטה רק מעט.
- אתה לא תשמע "קליק" בעת הלחיצה מטה.
- בחלון למעקב מנות יישאר מספר "8" ללא שינוי.

סגור את התרסיס עם המכסה המגן.

הכנס את התרסיס למארז המגן מפני ילדים.

- שמור את התרופה במארז אחסון המגן מפני ילדים כל הזמן, אפילו אחרי סוף השימוש או סיום התכולה.
- אין להשליך את התרופה לביוב או לאשפה הביתית.
- את כל הבקבוקים הריקים יש להחזיר למארז המגן מפני ילדים.

יש להיפטר מבקבוקון הפקפנט ולהשתמש בבקבוקון חדש אם: חלפו 60 ימים או יותר מאז שהכנת את בקבוקון הפקפנט לשימוש או השתמשת בבקבוקון שלך לראשונה

היוועץ בבית המרקחת כיצד להיפטר מבקבוקונים ריקים.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הפורטל לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות: www.health.gov.il
או ע"י כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il.
כמו כן, ניתן לדווח על תופעות לוואי לחברת מדיסון פארמה בע"מ
בדואר אלקטרוני: PVIsrael@medisonpharma.com
או בפקס: 03-9234218

PEC0018

כרטיס מידע למטופלים עבור

PecFent®
FENTANYL (CITRATE) NASAL SPRAY

אנא קרא את כרטיס מידע זה בתשומת לב רבה והקפד על ההוראות המופיעות בהמשך על מנת להבטיח את יעילות ובטיחות הטיפול. יש לעיין בעלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר.
אם יש לך שאלות נוספות, אנא פנה לרופא המטפל.
הכרטיס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לשני המינים.
כרטיס זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות באפריל 2023

הרופא רשם לך תרופה בשם פקפנט,
המכילה את החומר הפעיל פנטניל.
פקפנט מיועד לטיפול בחולי סרטן מבוגרים אשר סובלים מכאב מתפרץ.
כאב מתפרץ הינו כאב אשר מופיע באופן פתאומי, אפילו כאשר המטופל נמצא תחת טיפול רגיל בתרופות אופיואידיות לשיכוך כאבים קבועים (כמו מורפין, פנטניל, אוקסיקודון או הידרומורפון).
עליך לקרוא את הוראות השימוש המדויקות המצוינות בעלון לצרכן, על מנת להבטיח אופן שימוש נכון בתכשיר.

שים לב:
בכל בקבוקון יש אפשרות ל- 8 לחיצות משחררות תרופה בלבד!

בכמה התזות יש להשתמש:

- המנה לטיפול באירוע כאב מתפרץ יכולה להיות לחיצה אחת או שתי לחיצות (אחת בכל נחיר).
- הרופא ינחה אותך בכמה לחיצות (1 או 2) עליך להשתמש לטיפול באירוע כאב מתפרץ.
- אם הרופא הורה על מינון של שתי לחיצות, יש לבצע לחיצה אחת בכל נחיר ולא שתי לחיצות בנחיר אחד!!
- אל תשתמש מעבר למנה שהרופא רשם לכל אירוע בודד של כאב מתפרץ.
- אין להשתמש בפקפנט יותר מ- 4 פעמים ביום.
- המתן לפחות 4 שעות עד לשימוש במנה הבאה של פקפנט.
- אין לעבור על המנה המומלצת או לשנות את המינון על דעת עצמך.
- ספר מיד לרופא אם אתה חווה מעל 4 אירועים של כאב מתפרץ ביום.
- אם אינך בטוח בנוגע למינון המתאים או בכמה לחיצות פקפנט להשתמש, פנה לרופא .

מומלץ לבצע מעקב כתוב של שעה ותאריך הנטילה של פקפנט, על מנת למנוע מינון יתר.

לנוחיותך, להלן טבלת מעקב:

תאריך נטילת הפקפנט xx/xx/xxxx	שעת נטילת הפקפנט xx:xx	מינון	מספר לחיצות
		100 / 400	1 / 2
		100 / 400	1 / 2
		100 / 400	1 / 2