

עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים (תקנירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

ווריקונאצול טבּע חדש
טבליות מצופות

הרכב
כל טבלייה מצופה מכילה:
ווריקונאצול 200 מ"ג
Voriconazole 200 mg

למייד על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 "מייד חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מייד נוטף".
קרה בעין את העלון עד סופו בטרם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מייד תמציתו על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספנות,
פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם גם אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

ווריקונאצול טבּע הינה תרופה אנטיפטריתית רחבה טווח המיועדת לטיפול ב:

- אספרגילוזיס פולשני (זיהום הנגרם על ידי פטריות מסווג אספרגילוזיס).
- זיהומיים של קנדידיה במערכת הדם (קנדידמיה) בחולים שאינם ניטרופינים.
- זיהומיים פולשניים של קנדידיה שעמידים לפוליקונאצול (תרופה אנטיפטריתית אחרת) כולל *C. Krusei*.
- זיהומיים פטריתיים חמורים הנגרמים על ידי פטריות מסווגים *Fusarium*-*Scedosporium* ו-*I.*

ווריקונאצול טבּע מיועדת לחולים עם זיהומיים פטריתיים חמורים, אולי אף מסכני חיים.
ווריקונאצול טבּע מיועדת למניעת זיהומיים פטריתיים פולשניים אצל מושתלי מח עצם הנמצאים בסיכון גבוה.

קבוצה רפואייתית:
אנטי פטריתיי מקבוצת הטרייזוליים. פועל באמצעות הריגה או עצירת הצמיחה של פטריות שונות הגורמות לԶיהומיים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה, ראה סעיף 6. | • אין ליטול תרופה זו עם טרפנדין (אלרגיה), אסטמיוזול (אלרגיה), ציספריד (לביעות בקיבה), פימוזיד (לביעות נפשיות), כינידין (לביעות בקצב הלב), איבברדין (לטיפול באיספיקת לב כרונית), ריפאמיצין (לטיפול בשחפת), ריפמפניין (לטיפול בשחפת), קרbamזפין (לטיפול בפרקופים), פונברטיל (לטיפול בפרקופים ובנדוזו שינה חמורים), נגזרות של ארגוטמין, דיאידרארגוטמין; לטיפול במיגרנות), סירולימוס (בחולים שעברו השתלה), אפאירין במינון של 400 מ"ג ו יותר הניתן פעם ביום (טיפול ב-HIV), ריטונאברין במינון של 400 מ"ג ו יותר בכל פעם הניתן פעמיים ביום (טיפול ב-HIV), צמח ההייריקום (Wort St. John's Wort) (טליפול בעצירות הנגרמת בעיקר משימוש במשכך כאבים מסווג אופיאידים (למשל מורפין, אוקסיקודון, פנטניל, טרמדול, קודאין)), טולבפטן (המשמש לטיפול בהיפונתרמיה (רמות נמוכות של נתרן בدم) או משמש להאטת הירידה בתפקוד הכליות במתופלים עם מחלת כלות פוליציטית), לורסידון (טיפול בדיכאון), נוטקלקס (טיפול במטופלים עם לוקמיה למפוציטית כרונית-CLL). |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

לא לפני הטיפול בווריקונאצול טבּע, ספר לרופא אם:

- הין סובל או סבלת בעבר מתגובה אלרגית לתרופות מקבוצת האזוליים.
- הין סובל ממחלת של שריר הלב (קדימיופתיה), קצב לב לא סדר או איטי או חריגה באלקטרוקרדיוגרם (אק"ג) המכונה 'תסומונת QTc מואר'.
- הין סובל או סבלת בעבר ממחלה כבד. הרופא ינטר את תפקודי הכבד על ידי ביצוע בדיקות דם.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- יש להימנע מכל אור שמש וחיפוי לשמש במשך זמן השימוש בתרופה. חשוב לכנות איזורי עור חשופים לשמש ולהשתמש בקרם הגנה עם מקדם הגנה (SPF) גבוה, מכיוון שעלולה להיות עליה ברגשות העור לקרינת الشمس (UV). רגשות זו עלולה להתגבר עוד יותר על ידי תרופות אחרות המעלות את הרגישות לאור, כגון מטוטרקסאט. זהירה זו מתיחסת גם לילדים.
- בזמן השימוש בתרופה, ספר לרופא באפן מיידי אם אתה מפתח: כוויות שימוש, פריחה חמורה או שלפוחיות עור, כאבים בעצמות.
- אם הופעה אחת מהຕופעות העוריות הללו, הרופא עשוי להפנות אותך לרופא עור. ישנו סיכוי קטן להתקפות סרטן העור בשימוש אחר טווח בווריקונאצול טבּע.

- אם אתה מפתח סימנים של 'כשל יותרת הכליה', מצב רפואי בו בלוטות יותרת הכליה אין מייצרות כמויות מספיקות של הורמוניים סטרואידים מסוימים כגון קורטיזול, העולג לגורם לתסמים כגון עייפות כרונית או מתמשכת, חולשת שרירים, אובדן תיאבון, רידיה במשקל, כאבי בטן, أنا ספר לרופא.
- אם אתה מפתח תסמים של "תסמונת קושינג'" בה הגוף מייצר עודף של ההורמון קורטיזול אשר עלול להוביל לתסמים כגון: עליה במשקל, רקמה שומנית בין הכתפיים, פנים מעוגלות, התכהות העור בבטן, בירכיים, בשדיים ובזרועות, עור דק, נתיחה לחבותות בклות, סוכר גבוה בדם, שיעור יתר, הצעת יתר, أنا ספר לרופא.
- הרופא ינטר את תפקודו הכבד והכלאי על ידי ביצוע בדיקות דם במהלך הטיפול בווריקונזול טبع.
- לפני התחלת הטיפול ובמהלכו יש לבצע ניטור להפרעות ברמות אלקטROLיטיים כגון רמות נמוכות של אשלגן, מגנזיום וסידן.

ילדים ומתבגרים

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולתינוקות מתחת לגיל שנתיים.

בדיקות ומעקב

麥cioן וויריקונזול טבע משפיעה על הכבד והכלאיות, הרופא ינטר את תפקוד הכבד והכלאי על ידי ביצוע בדיקות דם. أنا ספר לרופא אם אתה חש בכאבי בטן או אם יש שינוי במרקם הצואה.

תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לך תחת לאחרונה, **תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במקרה אם אתה לוקח:

תרופות שיש להימנע מלקחת בשילוב עם וויריקונזול טבע במידת האפשר ונדרשת התאמת מינן אם ניתן יחד:

- פניטואין (טיפול באפילפסיה). אם הינך מטל תרופה זו יש לנטר את רמת הפניטואין בדם.
- ריטונאביר (טיפול ב-VIH) במינן נמוך של 100 מ"ג פעמיים ביום. לא ניתן ליטול מינונים מסוימים של ריטונאביר עם וויריקונזול טבע. ראה "אין להשתמש בתרופה אם" בסעיף זה.
- גולדגיב (טיפול בסרטן) – אם הינך נדרש להשתמש בשתי התרופות, הרופא ינטר את קצב הלב לעתים קרובות יותר.

שילוב של וויריקונזול טבע עם התרופות הבאות, יתכן שידרוש התאמת מינן ומעקב כדי לוודא שהתרופות / או וויריקונזול טבע עדין בעלות האפקט הרצוי:

- ואפרין ונווגדי קריישה אחרים (כגון פנפרוקומון, אסנוקומרול)
- ציקלוספורין, טקרולימוס (לטמותם שעברו השתלה)
- תרופות מסווג שלפוני-אוראה (כגון טולבטמיך, ג'ליפיזיד וג'ליבוריד) (טיפול בסוכרת)
- סטטינים (כגון אטוברסטטין, סימבסטטין, לובסטטין) (להורדת רמות כולסטרול)
- בנזודיאזפינים (כגון מיזולאמ, אלפרוזולאמ וטריאזולאמ) (טיפול בנזודי' שינה חמורים ולהרגעה)
- אומפריזול (טיפול בכיב קיבת)
- גלאולות למניעת הירין (יתכנו תופעותלוואי כגון בחילה והפרעות במחזור החודשי)
- נגזרות יינקה (כגון יינקריסtin, ייגבלסtin) (טיפול בסרטן)
- מעכבי טירוזין קינаз (כגון: אקסיטיניב, בוסוטיניב, קבוצנטיניב, סריטיניב, קוביומטיניב, דברפניב, דזטיניב, נילוטיניב, סונייטיניב, איברוטיניב, ריבוציקליב) (טיפול בסרטן)
- טרטיטיניב (טיפול בלוקמיה)
- אינידיאנביר ומכבי האנדומים HIV פרוטאז אחרים (טיפול ב-VIH)
- תרופות ממפחחת NNRTI לטיפול ב-VIH (כגון דלאוירידין, נוירא芬, אפאירן) (מינונים מסוימים של אפאירן לא ניתן ליטול עם וויריקונזול טבע, ראה "אין להשתמש בתרופה אם" בסעיף זה)
- מתדוון (טיפול בהתקרכות)
- אופיאטים קצר טוח (כגון אלפנטניל, פנטניל, סופנטניל) (משככי כאבים בהלייכים כירוגיים)
- אוקסיקודון והידרוקודון (לשיכוך כאביםBINOCINS עד חזקים)
- תרופות נוגדות דלקת שאין סטרואידים (כגון איבופרופן ודיקלופנק) (טיפול בכאב ובלקמת)
- פלוקונזול (טיפול בזיהומיים פטריטיים)
- אוורולימוס (טיפול בסרטן מתקדם בcliffe ובמטופלים שעברו השתלה)
- לטרומוביל (למנעה של מחלה הנגרמת על ידי ציטומגל-וירוס (CMV) לאחר השתלת מה עצם)
- איבקפטור (טיפול בסיסטי פיברוזיס (CF))
- פלוקולוקסצילין (אנטיבiotיקה המשמשת לטיפול בziehomiים CHYDKEIM)

לרשימת תרופות שאין ליטול בו זמינות עם וויריקונזול טבע, أنا ראה "אין להשתמש בתרופה אם" בסעיף זה.

הירין והנקה

אין להשתמש בתרופה אם הינך בהירין, אלא אם קובלת הוראה מפורשת מהרופא. נשים בגיל הפוריות צרכות להשתמש באמצעות מנעה ייעלים בזמן השימוש בתרופה. אם כניסה להירין בזמן נטילת וויריקונזול טבע פני לרופא מייד.

אם הינך בהירין או מניקה, חושבת שאתה בהירין או מתכוננת להכנס להירין, התיעצי לרופא לפני Nutzung תרופה זו.

נהיגה ושימוש במכונות

וויריקונזול טבע עלול לגורם לטעוטה בראיה או לריגישות לאור. אם אתה מושפע מכך אין לנו או להפעיל מכונות מסוימות. באשר לילדיים, יש להזהיר מרכיביה על אופניים או מושחקים בקרבת הכביש וכדומה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

- הטבילה מכילה לקטוז וכן אמר לר' ידי הרופא שיש לך א-סבילות לסתוררים מסוימים, פנה לרופא לפני נטילת התרופה.
- הטבילה מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן, כלומר נחשבת "נטולת נתרן".

3. כיצד משתמש בתרופה?

יש לשימוש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין לך בטוח לגבי מגע למינון ולאופן הטיפול בתרופה.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון יקבע כתלות במשקלך ובסוג הדיזומ.

כתלות בתגובהך לטיפול, הרופא עשוי להעלות או להוריד את המינון היומי.

אם יש לך מחלת כבד, הרופא עשוי להפחית לך את המינון.

אין לעבור על המנה המומלצת!

אם אתה או ילך נוטלים ו/orיקונזול טבע למניעת זיהומים פטריטיים, יתכן כי הרופא יפסיק את הטיפול אם אתה או ילך מפתחים תופעות לוואי נלוות לטיפול.

- יש לתת טבליות רק אם הילד מסוגל לבלווע טבליות.
יש ליטול את הטבילה לפחות שעה לפני או שעה אחריו הארוחה. יש לבלווע את הטבילה בשלהותה עם מעט מים.
בהעדך קוו ח齊יה – אסור לחצות את הטבילה. אין מידע לגבי כתישה/עליסה.

אם נטלת בטיעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטיעות בעליל מין התרופה, פנה מייד לחדר מין של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך. יתכן שתתחוש רגישות מוגברת לאור כתוצאה מנטיילת יתר.

אם שכחת ליטול את התרופה

חשוב ליטול את התרופה בכל יום בשעה קבועה.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד, קח את המנה הבאה בזמן הרגיל, אך בשום אופן אין ליטול מנה כפולה כדי לפצצות על המנה שנשכחה.

יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

יש להפסיק לפחות את התרופה עד שהרופא ינחה אותך להפסיק. אם אתה מפסיק את נטילת התרופה מוקדם, הדיזום עלול להימשך או לחזור. במטופלים עם מערכת חיסון מוחלשת או עם זיהומים קשים יתכן שיידרש טיפול ארוך יותר כדי למנוע את חזרת הדיזום.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהירק נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הירק זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בו/orikonazol טبع עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הללו. יתכן שלא תסבול מ אף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות – יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא במקרים הבאים:

- פריחה
- צהבת; שינוי בתוצאות בדיקת תפקוד כבד בבדיקה דם
- דלקת בלבלב (פנקריאטיטיס)

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות מאוד (עשויות להופיע ביותר מ-1 מתוך 10 אנשים):

- ליקוי בראייה (שינויים בראייה, כולל: ראייה מטושטשת, שינויים בצבעים, רגישות מוגברת לאור, עיורון צבעים, ליקוי בעין, ראיית הליה, עיורון לילה, תנודות בראייה, ראיית ניצוצות, ראיית אורה, ריאית הראייה, סינור, צמצום שדה הראייה, כתמים/נקודות בשדה הראייה)
- חום גבוה
- פריחה

- בחילה, הקאה, שלשול
- כאב ראש
- נפיחות בגפיים
- כאבי בטן
- קשיי נשימה
- עליה באמזי מכך

תופעות לוואי שכיחות (עשויות להופיע ב – עד 1 מתוך 10 אנשים):

- סינוסיטיס, דלקת בחונכיים, צמרמותה, חולשה
- רמה נמוכה, כולל נמוכה באופן חמור, של חלק מתאי הדם האדומים ו/או הלבנים (לעתים מלאה בחום), רמה נמוכה של טסיות העוזרות בקרישת הדם
- רמה נמוכה של סוכר בدم, רמה נמוכה של אשגן בדם, רמה נמוכה של נתן בדם חרדה, חוסר מנוחה, דיכאון, בלבול, קשיי שינה, הזיות
- פרוכסיטיס, רעד או תנועות שריריים לא רציניות, תחששות עקצוץ או תחששות עוריות לא רגילות, עליה בטומוס (מתח) שרירים, ישמניות, סחרחוות
- דימום בעין
- בעיות בקצב הלב כולל דופק מהיר/איטי מאוד, עילפון לחץ דם נמוך, דלקת ורידים (פלביטיס)
- קשיי נשימה חמורים, כאב בחזה, נפיחות בפנים (פה, שפתיים ומסביב לעיניים), אצירת נזלים בריאות עצירות, קשיי עיכול, דלקת בשפטאים
- אזהבת, דלקת בכבד (הפטיטיס) ופגעה בכבד
- פריחות בעור העוללות לגרום לקילוף חמור ולשלפוחיות בעור המתאפיינות באחור אדום ושטוח בעור המכוסה בבליטות קטנות מוחבות, אדומות מوطבעו
- גירוד
- נשירת שיער
- כאבגב
- כשל כליתי, דם בשתן, שינויים בבדיקות תפוקוד הכליות
- כוויות ששמש או תגובה עורית חמורה כתוצאה מחשיפה לאור או לשמש
- סרטן העור

תופעות לוואי שאין שכיחות (עשויות להופיע ב – עד 1 מתוך 100 אנשים):

- תסמים דמוני שפעת, גירוי ודלקת במערכת העיכול, דלקת במערכת העיכול הגורמת לששלול, דלקת של כל הלייפה
- דלקת ברקמה הדקה הנמצאת בדופן הפנימית של הבطن ומcosa את חלל הבطن
- בלוטות לימפה מוגדלות (לעתים כואבות), ככל מה העצם, עליה ברמת האוזניפילים בדם
- ירידה בתפקוד בלוטת יותרת-הכליה, תחת פעילות של בלוטת התannis
- תפוקוד מוחי לא תקין, תסמים דמוני פרקינסון, פגעה עצבית הגורמת לחסור תחששה, כאב, עקצוץ או תחששות בעירה בגפיים
- בעיה בשינוי משקל או בקואורדינציה
- נפיחות במוח
- ראייה כפולה, מצבים חמורים בעין הcoliilit: כאב ודלקת בעיניים ובעפעפים, תנועות לא רגילה של העין, נזק לעצב הראייה
- הגורם להפרעה בראייה, נפיחות בדיסק האופטי
- ירידה ברגשות למגע
- שינוי בחוש הטעם
- הפרעות בשמיעה, צלצלים באוזניים, ורטיגו (תשחששת סחרור)
- דלקות באיברים פנימיים מסוימים – לבלב ומעי, נפיחות ודלקת בלשון
- הגידלת הכבד, ככל כבד, אבנים או מחלת בכיס המרת
- דלקת מפרקים, דלקת ורידים המלאה ביצירת קרייש דם (פקחת)
- דלקת בכליה, חלבון בשתן, נזק לכליה
- קצב לב מאד מהיר או החסורת פעימות – לעתים מלאה באימפוולסים חשמליים לא קבועים
- שינויים באלקטרוקרדיוגרם (אקס'ג)
- עליה ברמת הcoliosterol בדם, עליה ברמת האוריאה בדם
- תגובות אלרגיות בעור (לעתים חמורות) כולל מצבים מסכני חיים בעור הגורמים להופעת שלפוחיות כואבות, פצעים/יבולות בעור ובמברנות ריריות, במיחך בפה, דלקת בעור, חרלה, כוויות שמש או תגובות עוריות חמורות כתוצאה מחשיפה לאור או לשמש, עור אדמוני ומוגורה, כתמים אדומים או סגולים בעור עקב ירידה בספירית טסיות הדם, אקזמה
- תגובה אלרגית או תגובה חריגה של מערכת החיסון
- דלקת של הרקמה המקיפה את העצם

תופעות לוואי נדירות (עשויות להופיע ב – עד 1 מתוך 1,000 אנשים):

- פעילות יתר של בלוטת התannis
- הדדרדות בתפקוד המוח (סיבוך חמור של מחלת כבד)
- נזק חמור לעצב הראייה, עכירות בקרנית, תנועות עיניים לא רציניות
- הופעת שלפוחיות כתוצאה מרגישות/חשיפה לאור

- הפרעה שבה מערכת החיסון של הגוף תוקפת חלק מערכות העצבים ההיקפית בעיות בקცב או בהוללה של הלב (לעתים מסכנות חיים)
- תגובה אלרגית מסכנת חיים
- הפרעה במערכת הקרישה בדם
- תגבות אלרגיות בעור (לעתים חמורות) כולל התנפחות מהירה (בצקת) בעור, כתמי מגדים או כאבים של עור עבה, אדמוניים קשישים, גרד בעור ובמברנות ריריות – מצב עורי מסכן חיים אשר גורם לחלקים נרחבים של האפידרמיס (השכבה החיצונית של העור) להיפך משכבות העור התחתונות כתמי עור קטנים, יבשים וקשישים, לעתים מעובים עם "קרכינים"
- תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה)
- נמשים וכתמי פיגמנטציה

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה), אך הן משמעותיות ויש לדוח עליהן לרופא המטפל באופן מיידי:

- אזרום אדומיים ומתקלפים בעור או חבורות בעור לצורה דמוית טבעת העולמים להסמן למחלת אוטואימונית הנקראט זבת אדרמנית עורית

ק"י מים דיווחים על התפתחות סרטן העור במטופלים אשר נטלו ווריקונזול במשך תקופה ארוכה. כוויות שימוש או תגובה עורית חמורה, כתוצאה מחשיפה לאור או לשמש, נצפתה בשכיחות גבוהה יותר אצל ילדים. אם אתה/לך מפתח הפרעות בעור, יתכן שתופנה על ידי הרופא המטפל לרופא עור, אשר לאחר ייעוץ יחולץ האם חשוב שאתה/לך תגיעו למעקב על בסיס קבוע. עליה באמני כבד גם כן נצפתה בשכיחות גבוהה יותר אצל ילדים.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוזאי חמירה, או כאשר אתה סובל מהתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנעו הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (date exp) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חדש.
- יש לאחסן מתחת ל-25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, pregelatinised maize starch, croscarmellose sodium, povidone, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide, glycerol

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האrizה:

טבליה מצופה, לבנה, מוארכת, בצדיה האחד מוטבע "V" ובצדיה השני "200".
התרופה משווקת באריזת בליסטר המכילה 14, 28 או 30 טבליות מצופות.

יתכן שלא כל גדי הארץות משוקקים.

שם בעל הרישום והיצרן וכתוותנו:

טבע ישראל בע"מ
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

נערך בינואר ספטמבר 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00-36179-68-168

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.