

עלון לצרכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיים) התשמ"ג - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

שם התרופה, צורתה והחוזקה

רמיTMיקד

100 מ"ג אבקה להכנת תמיסה מרוכצת לתמיסת עירוי
חוואר פועל וכמותו: כל בקבוקון מכיל 100 מ"ג אינפליקסימאב
אינפליקסימאב, 100 מ"ג

Infliximab 100 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוספת".

קראו בעיון את העلون עד סוף לפני שימוש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

בנוסף לעalon, לתכשיר רמייקד קיימים כרטיסים תזכורת למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב שעiliar לדעת לפני הchèלה הטיפול ובמהלך הטיפול ברמייקד ולפעול על פיו. יש לעיון בכרטיס התזכורת למטופל ובעalon לצרכן לפני השימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במידה הצורך.

עבור מבוגרים:

لتשומת לך, משרד הבריאות אישר החלפה חד-פעמית בין תרופה מקור לבין תרופה ביוא-סימילאר ולהיפר.

הרופא יספק לך הסבר אודוט התרופה ומשמעות החלפה. כל החלפה בתרופה ביולוגית חייבת להתבצע על-ידי הרופא המטפל. השם המסחרי של התרופה המופיע במרשם צריך להיות זהה לשם המסחרי המופיע על אריזת התרופה שסופקה לך בבית המרקחת. בכל מקרה של ספק, יש לפנות לרוקח או לרופא המטפל.

עבור ילדים:

لتשומת לך, חשוב שבל פעם שאתה מקבל את התרופה בבית המרקחת, תזודא שאתה מקבל את אותה התרופה שרשם לך הרופא המומחה המטפל בך. אם התרופה שקיבלת נראית שונה מזה שאתה מקבל בדרך כלל או שהנחיות השימוש השתנו, אנא פנה מיד לרוקח לוודא שקיבלת את התרופה הנכונה. כל החלפה או שינויomin של תרופה המכילה אינפליקסימאב (החומר הפעיל בתרופה) חייבת להתבצע אך ורק על-ידי הרופא המומחה המטפל.

אנא בדוק כי השם המסחרי של התכשיר שרשם לך הרופא המומחה במרשם, הינו זהה לשם התרופה שקיבלת מהרוקח.

1. למה מיועדת התרופה?

מחלה קרוון במבוגרים (Crohn's disease):

טיפול במחלה קרוון פעילה, בדרגת חומרה בינונית עד חמורה, בחולים אשר לא הגיעו

לטיפול מלא ומתאים בקורטיקוסטרואידים ו/או מדכאי מערכת החיסון.
 לטיפול במחלת קrhohn פיסטולית (Fistulizing Crohn's disease), בחולים אשר לא הגיעו
 לטיפול קונבנציונלי מלא ומתאים.

מחלות קrhohn בילדים:

לטיפול במחלת קrhohn בדרגה חמורה ילדים בני 17-6 אשר לא הגיעו לטיפול קונבנציונלי
 הכלול קורטיקוסטרואידים, אימונומודולטורים, טיפול תזונתי ראשוני, או שניני, או שאינם יכולים לסייע
 או שיש להם התווית נגד לטיפוליים אלו.
 רמייק נבדקה רק בשילוב עם טיפול אימונוסופרטיבי קונבנציונלי.

דלקת חוליות מקשחת (Ankylosing spondylitis):

לטיפול בדלקת חוליות מקשחת בחולים שיש להם תסמינים אקסיאליים חמורים, רמה מוגברת
 של סמנים לפיעילות דלקתית אשר לא הגיעו באופן מספק לטיפול קונבנציונלי.

דלקת מפרקים ספחתית (Psoriatic arthritis):

לטיפול בדלקת מפרקים ספחתית פעילה ומתקדמת במוגרים אשר הtagובה לטיפול קודם ב-
 DMARDs (Disease-modifying antirheumatic drugs) לא הייתה מספקת. רמייק
 ניתנת בשילוב עם מתוטרקסאט או בלבד בחולים שאינם יכולים לסייע מתוטרקסאט או שיש
 להם התווית נגד למוטרקסאט. רמייק שיפורה את התפקוד הפיזי בחולים עם דלקת מפרקים
 ספחתית והורידה את קצב התקדמות הנזק להיפקי למפרקים, אשר נמדד בצלום רנטגן
 בחולים עם תת-סוג מחלת פוליארטירוקולירית סימטרית.

דלקת מפרקים שגרונית (Rheumatoid arthritis):

רמייק, בשילוב עם מתוטרקסאט, מיועדת להורדת הסימנים והתסמינים ולשיפור התפקוד
 הפיזי בחולים עם מחלת פעילה, אשר לא הגיעו באופן מספק ל-DMARDs כולל מתוטרקסאט.
 בחולים במחלת מתקדמת, פעילה וחמורה אשר לא טופלו בלבד لكن במתוטרקסאט או ב-
 DMARDs אחרים, הودגמה ירידת קצב התקדמות הנזק למפרקים, אשר נמדד בצלום
 רנטגן באוכלוסיות אלו.

פסוריאדים (Psoriasis):

לטיפול במחלת פסוריאדים רבודית בדרגת חומרה בינונית עד חמורה במוגרים אשר טיפול
 סיסטמי אחר, בכלל זה ציקלוספורין, מתוטרקסאט או AUVAC, נכשל או שיש להם אי סבילות
 או התווית נגד לטיפוליים אלה.

דלקת כיבית של המעי הגס (Ulcerative colitis):

לטיפול במחלת פעילה בדרגה בינונית עד חמורה בחולים בקוליטיס כיבית אשר לא הגיעו
 באופן מספק, או שיש להם אי סבילות או התווית נגד לטיפול קונבנציונלי כולל
 קורטיקוסטרואידים, MP-6, או AZA.

דלקת כיבית של המעי הגס בילדים:

לטיפול במחלת פעילה בדרגה חמורה בקוליטיס כיבית ילדים בני 17-6 שנים, אשר לא הגיעו
 באופן מספק, או שיש להם אי סבילות או התווית נגד לטיפול קונבנציונלי כולל
 קורטיקוסטרואידים, MP-6, או AZA.

החומר הפעיל אינפליקסימאב שיר לקבוצת מדכאי המערכת החיסונית, חוסמי TNF
 ATC code: L04AB02

קבוצה Terapeutic: רמייק מכילה את החומר הפעיל אינפליקסימאב. אינפליקסימאב הוא נוגדן

חץ שבטי, סוג של חלבון אשר נקשר למטרה ספציפית בגוף, הנקראת α-TNF (Tumour necrosis factor).

רמייקד פועלת באמצעות קישור סלקטיבי ל-α-TNF וחסימת פועלתו. α-TNF מעורב בתהליכיים דלקטיבים בגוף כך שהסימטו גורמת להפחחת הדלקת בגוף.

דלקת מפרקים שגרונית - (Rheumatoid arthritis)

דלקת מפרקים שגרונית היא מחלת דלקטיבית של המפרקים. אם הינך סובל מדלקת מפרקים שגרונית פעילה, טיפול קודם בתרופות אחרות. אם תרופות אלו לא יפלו באופן מספק טוב, תקבל רמייקד, בשילוב עם תרופה נוספת הנקראת מתוטרבקסאט כדי:

- להפחית את סימני ותסמיני המחלת.
- להאט את הנזק למפרקים.
- לשפר את התפקוד הפיזי.

דלקת מפרקים ספחיתית - (Psoriatic arthritis)

דלקת מפרקים ספחיתית היא מחלת דלקטיבית של המפרקים המלוויה בדרך כלל בפסוריאדים. אם הינך סובל מדלקת מפרקים ספחיתית פעילה, טיפול קודם בתרופות אחרות. אם תרופות אלו לא יפלו באופן מספק טוב, תקבל רמייקד כדי:

- להפחית את סימני ותסמיני המחלת.
- להאט את הנזק למפרקים.
- לשפר את התפקוד הפיזי.

דלקת חוליות מקשחת - (Ankylosing spondylitis)

דלקת חוליות מקשחת היא מחלת דלקטיבית של עמוד השדרה. אם הינך סובל מדלקת חוליות מקשחת, טיפול קודם בתרופות אחרות. אם תרופות אלו לא יפלו באופן מספק טוב, תקבל רמייקד כדי:

- להפחית את סימני ותסמיני המחלת.
- לשפר את התפקוד הפיזי.

ספחת (Psoriasis)

ספרחת היא מחלת דלקטיבית של העור. אם הינך סובל מספחת בדרגה בינונית עד חמורה, טיפול קודם בתרופות אחרות או בטיפול כמו פוטותרפיה. אם תרופות או טיפולים אלו לא יפלו באופן מספק טוב, תקבל רמייקד כדי להפחית את סימני ותסמיני המחלת.

דלקת כיבית של המעי הגס - (Ulcerative colitis)

דלקת כיבית של המעי הגס היא מחלת דלקטיבית של המעיים. אם הינך סובל מדלקת כיבית של המעי הגס, טיפול קודם בתרופות אחרות. אם תרופות אלו לא יפלו באופן מספק טוב, תקבל רמייקד כדי לטפל במחלת.

מחלה קרוון - (Crohn's disease)

מחלה קרוון היא מחלת דלקטיבית של המעיים. אם הינך סובל ממחלה קרוון, טיפול קודם בתרופות אחרות. אם תרופות אלו לא יפלו באופן מספק טוב, תקבל רמייקד כדי:

- לטפל במחלה קרוון פעילה.
- להפחית את מספר הפיסטולות בין המעיים לעור, אשר לא טופלו בהצלחה באמצעות תרופות אחרות או ניתוח.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאינפליקסימאב או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה. לרשותה המרכיבים הננספים, ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
- אתה אלרגי לחלבוניים ממוקור עכברי.
- אתה סובל משחפת או מזיהום חמוץ אחר, כגון דלקת ריאות או אלח דם (ספסיס).
- אתה סובל מאין ספיקת לב בגיןית עד חמורה.
- אין להשתמש ברמייקד אם אתה סובל מאחד מהמצבים המפורטים מעלה. אם אין בטוח, פנה לרופא לפני שאתה מקבל רמייקד.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול ברמייקד, ספר לרופא אם הין סובל מהמצבים הבאים:

טופלת ברמייקד בעבר

ספר לרופא אם קיבלת בעבר טיפול ברמייקד וכעת אתה מתחילשוב טיפול ברמייקד. אם הייתה הפסקה של 16 שבועות או יותר הטיפול ברמייקד, ישנו סיכון גבוה יותר לתגובה אלרגיות כשתתחל את הטיפולשוב.

ziehominim

- טרם התחלה הטיפול ברמייקד, ספר לרופא אם אתה סובל מזיהום כלשהו, גם אם זה זיהום קל מאוד.
- טרם התחלה הטיפול ברמייקד, ספר לרופא אם אי פעם גרת או טיילת באזורי בו ziehominim הבאים נפוצים: היסטופלזמוזיס (Histoplasmosis), קוקסידיוםיקוזיס (Blastomycosis) או בלסטומיקוזיס (Coccidioidomycosis) או על-ידי סוגים ספציפיים אשר עלולות להזיק לריאות או לאיברים אחרים בגוף.
- אתה עלול לסבול ביותר קלות מזיהומים בתקופת הטיפול עם רמייקד. אם הין בן 65 שנים או יותר, הין בסיכון גבוה יותר.
- ziehominim אלו עלולים להיות חמורים וכוללים שחפת, ziehominim הנגרמים על ידי וירוסים, פטריות, חיידקים, או ארגניזמים אחרים שבسبביה ואלח דם (sepsis) אשר עלולים להיות מסכני חיים.

דווח מיד לרופא אם אתה סובל מסימני זיהום במהלך הטיפול עם רמייקד. הסימנים כוללים חום, שיעול, סימנים דמווי שפעת, הרגשה כללית רעה, עור אדום או חם, פצעים או בעיות שניינן. יתכן שהרופא ימליץ על הפסקה זמנית הטיפול ברמייקד.

שחפת

- חשוב מאוד שתספר לרופא אם חליית אי פעם בשחפת או אם הייתה ברגע קרוב עם מישחה שחולה או שחלה בעבר בשחפת.
- הרופא יבדוק אותך כדי לראות אם יש לך שחפת. מקרי שחפת דווחו במטופלים שטופלו ברמייקד, אפילו בחולים שכבר לטפו תרופתיות נגד שחפת. הרופא יתעד את תוצאות הבדיקות בכרטיס התזכיר למטופל שברשותך.
- אם הרופא חשש שאתה נמצא בסיכון לחילות בשחפת, יתכן שתטופל בתרופות נגד שחפת לפני שתתחל את השימוש ברמייקד.

דווח מיד לרופא אם מופיעים סימנים של שחפת במהלך הטיפול ברמייקד. סימנים אלו כוללים שיעול מתמשך, ירידת משקל, עייפות, חום, הצעות לילה.

(הפטיטיס B) מסוג נגיף צהבת נגיפית

- טרם התחלה הטיפול ברמייקד, ספר לרופא אם אתה נשא של הפטיטיס B או הייתה בעבר.
- ספר לרופא אם אתה חושב שאתה עלול להיות בסיכון להדבק במחלה נגיפית מסווג B.
- הרופא אמר לבודק אותך להימצאות של צחבת נגיפית מסווג B.
- הטיפול בחוסמי TNF דוגמת רמייקד עלול לגרום להתרצות מחדש של צחבת נגיפית מסווג B במטופלים הנושאים נגיף זה, ועלול להיות מסכן חיים במקרים מסוימים.

בעיות לב

- ספר לרופא אם הינך סובל מבעיות לב כלשהן, כגון אי ספיקת לב קלה.
- הרופא ירצה לעקוב באופן קבוע קפדי אחר תפקוד הלב שלך.
- דוח מיד לרופא אם הינך חווית תסמינים חדשים או החמרה בתסמינים קיימים של אי ספיקת לב במהלך הטיפול ברמייקד. תסמינים אלו כוללים קוצר נשימה או נפיחות ברגליים.

سرطان ולימפומה

- לפני תחילת הטיפול ברמייקד, ספר לרופא אם הינך חוליה או שאי פעם חלית בלימפומה (סוג של סרטן דם) או בכל סוג אחר של סרטן.
- מטופלים החולים בדלקת מפרקים שగורונית חמורה, וסובלים מהמחלה מזה זמן רב, עלולים להיות בסיכון גבוהה יותר לפתח לимפומה.
- ילדים ובוגרים המטופלים ברמייקד עלולים להיות בסיכון גבוהה יותר לפתח לимפומה או סרטן מסווג אחר.
- חולים מסוימים אשר טיפולו בחוסמי TNF כולל רמייקד פיתחו סוג נדיר של סרטן הנקרא Hepatosplenic T-cell lymphoma. מתוור החולים האלו, הרוב היו בניים בגיל עשרה או גברים צעירים ולרובם הייתה מחלת קrhoן או דלקת כיבית של המעי הגס. סרטן מסווג זה בדרך כלל הסתיים במות. כמעט כל החולים נטלו גם תרופות המכילות Azathioprine או mercaptopurine-6-בנוטס' לחוסמי ה-TNF.
- חולים מסוימים אשר טיפולו באינפליקסימאב, פיתחו סוגים מסוימים של סרטן העור. אם הינך מבחין בשינויים בעור שלך או בגידולים על העור במהלך הטיפול ברמייקד, דוח לרופא.
- נשים מסוימות אשר טיפולו ברמייקד לדלקת מפרקים שగורונית פיתחו סרטן צואר הרחם. בנשים המטופלות ברמייקד, כולל נשים מעל גיל 60 שנים, יתכן שהרופא ימליץ להיבדק בקביעות לסרטן צואר הרחם.

מחילות ריאה או עישון Cbd

- לפני תחילת הטיפול ברמייקד, ספר לרופא אם אתה סובל מחילת ריאות הנקראת מחילת ריאות חסימתית כרונית (COPD) או אם אתה מעשן Cbd.
- חולים הסובלים מחילת ריאות חסימתית כרונית וחולים שהם מעשנים Cbd, עלולים להיות בסיכון גבוהה יותר לפתח סרטן במהלך הטיפול ברמייקד.

מחילות של מערכת העצבים

- ספר לרופא אם הינך סובל או סבלת בעבר מבעיות המשפיות על מערכת העצבים לפני תחילת הטיפול עם רמייקד. בעיות אלה כוללות טרשת נפוצה, תסמנות גיליאן-ברה, אם הינך סובל מפרכוים או שאובחנה דלקת בעצב הראייה.
- דוח מיד לרופא אם הינך מפתח תסמינים של מחילת עצבים במהלך הטיפול ברמייקד. התסמינים כוללים שינויים בראיה, חולשה בזרועות או ברגליים, חוסר תחושה או עקצוץ בכל אחד מחלקי הגוף.

פתחים חריגיים בעור (פיסטולות)

- דוח לרופא אם הינך סובל מפתחים חריגיים בעור (פיסטולות) לפני תחילת הטיפול ברמייקד.

חיסונים

- ספר לרופא אם קיבלת לאחרונה או שעלייך לקבל חיסון.
- לפני התחלת הטיפול ברמייקד, עליך לקבל חיסונים מומלצים. אתה יכול לקבל חיסונים מסוימים במהלך הטיפול ברמייקד, אולם אין יכול לקבל חיסונים חיים (חיסונים אשר מכילים גורם מזוהם חי אך מוחלש) בזמן הטיפול ברמייקד, מכיוון שהם יכולים לגרום לזמן.
- אם קיבלת רמייקד במהלך הירionario, גם תינוקך עשוי להיות בסיכון גבוה יותר ללקות בזמן. כתוצאה מקבלת חיסון חי BCG (Bacillus Calmette-Guérin) במהלך שנת החיים הראשונה וכל החיסונים האחרים במהלך 6 החודשים הראשונים לאחר הלידה. חשוב שתספר לרופאים של תינוקך ולאנשי צוות רפואי אחרים שהשתמשה במהלך ההריון כדי שיכלו להחליט מתי לתינוק חיסון כלשהו, כולל חיסונים חיים כגון חיסון ה-BCG (משמש למניעת שחפת).
- למידע נוסף ראי סעיף "הירionario, הנקה ופוריות".

טיפול בגין טיפולי העשי לגורם לזמן

- ספר לרופא אם קיבלת לאחרונה או אם נקבע לך טיפול בגין טיפולי העשי לגורם לזמן (כגון החדרת BCG לטיפול בסרטן).

ניתוחים או הליכים דנטליים

- ספר לרופא אם אתה עומד לעבר ניתוח או הליך דנטלי כלשהו.
- ספר למנתח או לרופא השני שאתה מטופל ברמייקד והציג את "כרטיס התזכורת למטופל" שלך.

בעיות בכבד

- חולים מסוימים המקבלים רמייקד פיתחו בעיות כבד חמורות. ספר מייד לרופא אם הבחנת בתסמינים של בעיות בכבד במהלך הטיפול ברמייקד. תסמינים הכלולים הכאב והעינויים, שタン בצעב חום כהה, כאבים או נפיחות מצד הימני העליון של אזור הבطن, כאבים במפרקים, פריחה בעור או חום.

ספירת דם נמוכה

- בחולים מסוימים המקבלים רמייקד, הגוף עשוי לא לייצר מספיק תא דם שעוזרים להילחם בזמן או שעוזרים לעזר דמים.
- ספר מייד לרופא אם יש לך תסמינים של ספירת דם נמוכה במהלך הטיפול ברמייקד. סימנים הכלולים חום שאינו עובר, דימות, נתיחה לחבורות ביתר קלות, כתמים קטנים אדומים או סגולים הנגזרים מדים מתחת העור או מראה חיוור.

הפרעה במערכת החיסון

- חולים מסוימים המטופלים ברמייקד פיתחו תסמינים של הפרעה במערכת החיסון הנקראית לופואו.

- ספר מייד לרופא אם פיתחת תסמינים של לופואו במהלך הטיפול ברמייקד. סימנים הכלולים כאב במפרק או פריחה בלחיים או בזרועות שרגישה לשמש.

ילדים ומתבגרים

המידע מעלה מתיחס גם לילדים ומתבגרים. בנוסף:

- חלק מהילדים ומהמתבגרים המטופלים שקיבלו חוסמי FNT כגון רמייקד פיתחו סרטן, כולל סוגים חריגיים, אשר לעיתים הביאו למותות.

- בהתואה למבוגרים, יותר ילדים המטופלים ברמייקד פיתחו ציהומיים.
- יש לתת לילדים חיסונים מומלצים לפני התחלת הטיפול ברמייקד.
- ניתן לתת לילדים חיסונים מסוימים במהלך הטיפול ברמייקד, אך הם אינם יכולים לקבל חיסון חி במהלך הטיפול.

אם אין בטוח אם אחד או יותר מהמטופר מעלה חל עלייר, שוחח עם הרופא לפני השימוש ברמייקד.

אינטראקציות/תגובהות בין תרופות

חולמים במחלה דלקתיות כבר נוטלים תרופות לטיפול בעיותיהם. התרופות הללו עלולות לגרום לתופעות לוואי. הרופא שלך ייעץ לך באילו תרופות אחרות עלייר להמשיך לשימוש במהלך הטיפול ברמייקד.

אם אתה לוקח או אם לוקחת לאחרונה תרופות אחרות, **כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עלך לרופא או ברוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:

תרופות אחרות שהינך משתמש בהן או שהשתמשת לאחרונה לטיפול במהלך קrhohn (Crohn's disease) ובדלקת כבית של המעי הגס (Ulcerative colitis), בדלקת מפרקים (Ankylosing spondylitis), בדלקת חוליות מקשחת (Rheumatoid arthritis), ושגרונית (Psoriasis) או בספקת (Psoriatic arthritis), או תרופות שניתנות ללא מרשם רפואי, כגון ויטמינים וצמחי מרפא.

במיוחד ספר לרופא אם אתה משתמש באחת מהתרופות הבאות:

- טרופות המשפיעות על מערכת החיסון.
- קינרט (אנקינרוה). אין להשתמש ברמייקד יחד עם קינרט.
- אורנסיה (אבטספט). אין להשתמש ברמייקד יחד עם אורנסיה.

אין לקבל חיסונים חיים בזמן הטיפול ברמייקד. אם השתמשת ברמייקד במהלך ההריון, ידעת את הרופא של התינוק או אנשי צוות רפואי אחרים המטפלים בתינוקך כי השתמשת ברמייקד לפני שהתינוק מקבל חיסון כלשהו.

אם אין בטוח אם הכתוב מעלה נוגע לך, היועץ לרופא או ברוקח לפני השימוש ברמייקד.

הריון, הנקה ופוריות

- יש להיוועץ לרופא לפני השימוש ברמייקד אם אתה בהריון, מניקה, חושבת שעת בהריון או מתכוננת להיכנס להריון. ניתן להשתמש ברמייקד במהלך הריון או הנקה רק אם הרופא חושב כי זה הכרחי עבורך.
- יש להימנע מהיכנס להריון במהלך השימוש ברמייקד ובמהלך 6 חודשים לאחר הפסקת הטיפול. היועץ לרופא לגבי שימוש באמצעות צנעה במהלך תקופה זו.
- אם קיבלת רמייקד במהלך הריון, תינוקך עלול להיות בסיכון גבוה יותר ללקות ב齊חיםם. חשוב שתספר לרופאים של תינוקך ולאנשי צוות רפואי אחרים על השימוש שלך ברמייקד במהלך ההריון, לפני שתינוקך מקבל כל חיסון. אם קיבלת רמייקד במהלך ההריון, מתן חיסון BCG (הניתן למניעת שחפת) לתינוקך תוך 12 חודשים מהלידה עלול לגרום ל齐חיםם עם סיבוכים חמורים, כולל מוות. אין לתת חיסון G-BCG לתינוקך במשך 12 חודשים מהלידה, ואין לתת את כל החיסונים האחרים במהלך 6 החודשים הראשונים לאחר הלידה, אלא אם הרופא של תינוקך ממליץ אחרת. למידע נוספת ראה סעיף "חיסונים".
- ירידה חמורה במספר תאי הדם הלבנים דוחה בתינוקות שנולדו לנשים שטופלו ברמייקד במהלך ההריון. אם תינוקך סובל מחום מתמשך או מ齐חים מתמככים, יש לפנות מיד

לרופא המטפל בתינוקך.

נהיגה ושימוש במכונות

לא סביר כי רמייקד תשפייע על היכולת לנוהג, להשתמש בכלים או להפעיל מכונות. אם אתה חש עייף, מסוחרר או חש לא טוב לאחר קבלת הטיפול ברמייקד, אל ת נהג, אל תשמש בכלים ואל תפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרפיה

רמייקד מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למנה, כלומר היא נחשבת למעsha "נטולת נתרן". למורדות זאת, לפני שרמייקד ניתנת לך, היא מעורבתת בתמיישה אשר מכילה נתרן. היועץ ברופא אם אתה בדיאטה דלת נתרן.

3. כיצד תשמש בתרפיה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

- רמייקד ניתן לך על-ידי רופא או אחות.

- הרופא או האחות יכינו את התרפיה לעירוי.

- התמיישה ניתנת עירוי (מעל שעתיים) לאחד הוורידים שלך, בדרך כלל לצורע. לאחר הטיפול השלישי הרופא עשוי להחליט לתת את מנת הרמייקד מעל שעה.

- עליך להשאר להשגחה רפואית במהלך מתן רמייקד ולמשך שעה עד שעתיים לאחר מכן.

- הרופא יקבע את המינון ותדירות הטיפול. הדבר יהיה תלוי במצבה, במשקל ובתגובה לרמייקד.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבלווע.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרפיה ללא התיעצות עם הרופא.

שימוש בילדים:

ניתן לתת רמייקד לילדים לטיפול במצבם קrhoון ובдолקמת כיבית של המעי הגס בלבד. על הילדים להיות בני 6 שנים או יותר.

אם קיבלת מינון גבוה מדי של רמייקד:

מאחר שהתרופה ניתנת לך על-ידי אחות או רופא, אין זה סביר שתתקבל מינון גבוה מדי של התרפיה. לא ידועות תופעות לוואי הקשורות במתן גובה מדי של רמייקד.

אם שכחת או פספסת מתן רמייקד:

אם שכחת או פספסת את מתן התרפיה במועד שנקבע, קבע תור חדש במהירות האפשרית.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהינך נוטל תרפיה. הרכב משקפיים אם הינך זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרפיה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרפיה, השימוש ברמייקד עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. "תכן שלא תסבול מכך אחת מהן. רוב תופעות הלואוי קלות עד בינוניות. מטופלים מסוימים עלולים לסבול מטופעות לוואי חמורות ועלולים להזדקק לטיפול. תופעות לוואי עשוויות להופיע גם לאחר הפסקת הטיפול עם רמייקד.

יש לפנות מיד לרופא אם הבדיקה באחד מה הבאים:

- **סימנים של תגובה אלרגית:** כגון התנפחות של הפנים, השפתיים, הפה או הגרון העולוה לגרום לקושי בבליעה או בנשימה, פריחה בעור, סרפתת, התנפחות של הידיים, הרגליים או הקרטולים. חלק מתגובה אלו עלולות להיות חמורות או מסכנות חיים. תגובה אלרגית יכולה להתרכש תוך שעתים מקבלת הזריקה או לאחר יותר. תסמינים נוספים של תגובה אלרגית העולוה להתרכש עד 12 ימים לאחר קבלת הזריקה כוללם כאב שרירים, חום, כאב בלוטה או במפרקים, כאב גרון או כאב ראש.
- **סימנים של בעיות לב:** כגון אי-נוחות או כאב בחזה, כאב בזרען, כאבי בטן, קוצר נשימה, חרדה, תחושת סחרור, סחרורת, עילפון, הצעה, בחילה, הקאה, תחושת פרפורים או דפיקות בחזה, דופק מהיר או איטי ונפיחות בכפות הרגליים.
- **סימנים של דיזומ (כולל שחפת):** כגון חום, עייפות, שיעול אשר עלול להיות מתמשך, קוצר נשימה, תסמינים דמו' שפעת, ירידה במשקל, הצעות לילה, שלשול, פצעים, הצלברות של מוגלה במעיים או סביב פ' הטעבת (אבל), בעיות בשיניים או תחושת צריבה בזמן מתן שתן.
- **סימנים אפשריים של סרטן:** הכוללים, אך לא מוגבלים, לתנפחות של בלוטות למפה, ירידה במשקל, חום, גושים חריגים על גבי העור, שינויים בשומות או בצעב העור, דימום נרתיקי שאינו רגיל.
- **סימנים של בעיות בריאות:** כגון שיעול, קשי נשימה או לחץ בחזה.
- **סימנים של בעיות במערכת העצבים (כולל בעיות עיניים):** כגון סימנים של שבץ (חוסר תחושה או חולשה פתאומיים בפנים, בזרוע או ברגל במיוחד מצד אחד של הגוף, בלבול פתאומי, קושי בדיור או בהבנה, קושי בראיה בעין אחת או בשתי העיניים, קושי בהליכה, סחרחות, אובדן שיווי משקל או קווארדינציה או כאב ראש חמוץ), פרוכיסם, עקצוץ/חוסר תחושה בחלקי גוף שונים או חולשה בזרועות או ברגליים, שינויים בראיה כגון ראייה כפולה או בעיות עיניים אחרות.
- **סימנים של בעית בכבד (כולל דיזומ בהפטיטיס B כשהיא לך הפטיטיס B בעבר):** כגון הצהבת העור או העיניים, שタン בצעב חום כהה, כאב או נפיחות לצד הימני העליון של אזור הבطن, כאב במפרק, פריחה בעור או חום.
- **סימנים של הפרעה במערכת החיסונית:** כגון כאב במפרק או פריחה רגישה לשמש על הלחים או הזרועות (לופו - זابت) או שיעול, קוצר נשימה, חום או פריחה בעור (סרוקואידוזיס).
- **סימנים של ספירתدم נמוכה:** כגון חום מתמשך, דימום או פציעה ביתר קלות, כתמים אדומים או סגולים הנגרמים מדימום תחת העור או מראה חיוור.
- **סימנים לבעיות עור חמורות:** כגון כתמים אדמדמים דמו' מטרה או כתמים עגולים לעתים קרובות עם שלפוחיות במרכזן, בפלג גוף עליון, אזורים נרחבים של התקלפות עור, כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין ובעיניים או בליטות קטנות מלאות מוגלה שיכולות להתפשט בגוף. תגובות עוריות אלו יכולות להיות מלאות בחום.

ספר לרופא מייד אם אתה מב Hin באחת מההתופעות המפורטות מעלה.

תופעות הללו הבאות נצפו עם רמייקד:

- תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) - יכולות להופיע אצל יותר מאשר אחד מתוונ עשרה משתמשים:**
- כאב בטן, בחילה
 - דיזומ ויראל, כגון הרפס או שפעת

• זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, כגון סינוסיטיס

• כאב ראש

• תופעות לוואי כתוצאה מהעירי

• כאב

תופעות לוואי שכיחות (common) - יכולות להופיע אצל עד אחד מתוך עשרה משתמשים:

- שינויים בתפקוד הכבד, עליה באנזימי הכבד (מאובחן בבדיקה דם)
- זיהום ריאות או חזה, כגון דלקת של הסمفונות (ברונכיטיס) או דלקת ריאות קושי בנשימה או כאבים בנשימה, כאב בחזה
- דימום בבטן או בעור, שלשול, בעיות עיכול, צרבת, עצירות סרפה, פריחה מגרדת או עור יבש בעיות בשינוי המסקל או תחשות סחרחוורת חום, הצעה מוגברת בעיות בזרימת הדם, כגון לחץ דם נמוך או גבוה
- חבורות, גלי חום או דימום מן האף, עור חם ואדם (הסמקה) תחשות עייפות או חולשה
- זיהום חידקן, כגון אלח דם, אבצס או זיהום של העור (צלוליטיס)
- זיהום בעור כתוצאה מפטריות בעיות בדם, כגון אנדמייה או ספירה נמוכה של תא דם לבנים נפיחות של בלוטות הלימפה
- דיאנון, בעיות שינה בעיות בעיניים, כולל עיניים אדומות וziehoms קצב לב מהיר (טאכיקרדיה) או דפיקות לב
- כאב במפרקים, בשרירים או בגב זיהום בדרכי השתן ספחת (פסורייזיס), בעיות בעור, כגון אקזמה ונשירת שיער
- תגבות במקום ההזרקה, כגון כאב, נפיחות, אדומות או גרד צמרמות, הצטברות נזלים מתחת לעור הגורמת לנפיחות
- חוסר תחושה או תחשות עקצוץ

תופעות לוואי שאין שכיחות (uncommon) - יכולות להופיע אצל עד אחד מתוך 100

משתמשים:

- מחסור באספקת דם, נפיחות ורידים
- הצטברות דם מחוץ לכל הדם (המטומה) או חבורות בעיות בעור כמו שלפוחיות, יבלות, צבע עור חריג או פיגמנטציה, או נפיחות בשפטים או התעבותות של העור, או עור אדום עם קשחת וקילופים
- תגבות אלרגיות חמורות (אנפילקטיים), הפרעה במערכת החיסונית הנקראת צבתת (לופוֹן), תגובה אלרגית לחלבונים זרים
- זמן רפואי ממושך יותר של פצעים
- התנפחות של הכבד (הפטיטיס) או CIS המרה, נזק לכבד
- פיזור דעת, רגשות, בלבול, עצבנות בעיות עיניים הכלולות לטשטוש ראייה או ירידת בראייה, נפיחות בעיניים או שעורה
- אי ספיקת לב חדשה או החמרה של אי ספיקת לב קיימת, קצב לב איטי
- התעלפות

- פרכויסים, בעיות עצביות
- חור במעיים או חסימת מעיים, כאב בטן או התכווצויות בבطن
- התנפחות של הלבלב (דלקת הלבלב)
- זיהומיים פטריאתיים, כגון קנדידה או זיהום פטריאתי של הציפורניים
- בעיות בריאה (כגון בזקפת)
- הצטברות נזלים סביב הריאה (תפליט קרום ריאה)
- היצרות נתיב האויר בריאות הגורם לכאבים חדשים בחזה המורוגשים יותר עם הנשימה
- רירית מודלקת של הריאה, הגורמת לכאבים חדשים בחזה המורוגשים יותר עם הנשימה
(דלקת קרום הראות)
- שחפת
- זיהומיים בכליות
- ספירת טסיות נמוכה, ריבוי כדוריות דם לבנות
- זיהומיים בנוירטיק
- תוצאות בדיקות דם המראות נוגדים עצמים
- שינויים ברמות כולסטרול וושומנים בדם
- עלייה במשקל (עבור רוב החולים, העלייה במשקל הייתה קטנה)

תופעות לוואי נדירות (rare) – יכולות להופיע אצל עד אחד מתוך 1,000 משתמשים:

- סוג של סרטן דם (לימפומה)
- אספקת החמצןמן הדם לגוף אינה מספקת, בעיות במערכת הדם, כגון היצרות של כלי דם
- דלקת קרום המוח
- זיהום כתוצאה מהיחלשות מערכת החיסון
- דלקת נגיפית מסוג B (Hepatitis B infection), אם הייתה לך דלקת בעבר
- כבד מודלק הנגרם כתוצאה מבועה במערכת החיסונית (הפטיטיס אוטואימוני)
- בעיה בכבד הגורמת להצהבה של העור או העיניים (צחבת)
- נפיחות או גדילה חריגה של רקמות
- תגובה אלרגית חמורה שעלולה לגרום לאיבוד הכרה ועלולה להיות מסכנת חיים (שוק אנafilקטי)
- התנפחות של כלי דם קטנים (ווקוליטיס)
- בעיות במערכת החיסונית אשר עלולות להשפיע על הריאות, העור ובולות הלימפה (כמו סרקיואידוזיס)
- הצטברות של תאי מערכת החיסון בעקבות תגובה דלקתית (נגעים גרנולומטיים)
- אפתייה
- בעיות עור חמורות, כגון מחלת ליל (Toxic epidermal necrolysis), תסמונת סטיבנס-ג'ונסון ו-isis Acute generalised exanthematous pustulosis
- בעיות עור אחרות, כגון אדמנת רב צורתית (erythema multiforme), תגובות ליכנואידיות (Lichenoid reactions) (פריחה עורית אדמדמה-סגולת מגדרת ו/או קווים לבנים-אפורים דמווי חוט על מברנות ריריות), שלפוחיות עור מתקלף או boils (פורונקולוזיס)
- בעיות חמורות של מערכת העצבים, כגון דלקת של חוט השדרה (Transverse myelitis), מחלת דמוית טרשת נפוצה, דלקת של עצב הראייה וتسمונת גיליין-ברה
- דלקת בעין אשר עלולה לגרום לשינויים בראייה כולל עיוורון

- נוזל בקרכומי הלב (Pericardial effusion)
- בעיות חמורות בריאות (כגון מחלת ריאות אינטרסטיציאלית)
- מלנומה (סוג של סרטן עור)
- סרטן צואר הרחם
- ספירת דם נמוכה, כולל ירידה חמורה במספר תאי הדם הלבנים
- כתמים קטנים אדומים או סגולים הנגרמים מדימום מתחת לעור
- עורכים לא תקין של חלבון בדם הנקרא 'מערכת המשלים', שהוא חלק מערכות החיסון

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה – התדריות אינה יכולה להיקבע מהמידע הקיים:

- סרטן ילדים ובוגרים
- סרטן דם נדיר המופיע בעיקר אצל נערים בגיל העשרה או גברים
- **צעירים T-cell lymphoma (Hepatosplenic T-cell lymphoma)**
- אי ספיקת לב
- קרצינומה של תאי מרקל (סוג של סרטן עור)
- סרקומה על שם קפושי (Kaposi's sarcoma), סרטן נדיר הקשור לזרימת בנגיף ההרפס הומני 8 (human herpes virus 8). סרקומה על שם קפושי מופיעה לרוב כנגעים סגולים על העור.
- החמרה של מצב הנקרא דלקת עור ושרירים Dermatomyositis (נראת כפריחה בעור המלאוה בחולשת שרירים)
- התקף לב
- שbez
- אובדן ראייה זמני במהלך או תוך שעתים מהעירוי
- זיהום כתוצאה מחיסון ח' בגל מערכת חיסונית מוחלשת

תופעות לוואי נוספות לילדים וمتבגרים

בילדים אשר קיבלו רמייקד לטיפול במחלת קrhohn נראו הבדלים מסוימים בתופעות הלוואי בהשוואה למבוגרים שקיבלו רמייקד למחלת קrhohn. תופעות הלוואי שהופיעו יותר בילדים הן: רמה נמוכה של תאי דם אדומים (אנמיה), דם בצוואה, רמה כללית נמוכה של תאי דם לבנים (לויקופניה), אדמומיות או הסמקה, זיהומים ויראליט, רמות נמוכות של תאי דם לבנים אשר נלחמים בזיהומים (נויטרופניה), שברים בעצמות, זיהומים חידקניים, תגובה אלרגיות של דרכי הנשימה.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא מצוינת בעлонך זהה, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- רמייקד לרוב תואחסן על-ידי אנשי הצוות הרפואי בבית חולים או במרפאה.
- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה

מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן בקירור (C-8°C-2°C).
- מומלץ להשתמש ברמייקד שהוכנה לעירוי בהקדם האפשרי (תוך 3 שעות מההכנה). אם התמיסה הוכנה בסביבה נטולת חיידקים, ניתן לשמר את התמיסה בקירור, (C-8°C-2°C) למשך 24 שעות. אין להשתמש בתמיסה אם היא שנינה צבע או שיש בה חלקיקים.

6. מידע נוסף

נוסך על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sucrose, sodium phosphate dibasic dihydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, polysorbate 80

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

רמייקד משוקה בקבוקן זכוכית המכיל אבקה להכנת Tamishe מרכזת לתמיסת עירוי. האבקה במצבה כדורים לבנים שיובשו בבקפה. בכל אריזה בקבוקן אחד.

יצרן: יאנסן ביולוגיקס ב.יו., איינסטיטיוג 101, 233, ליידן, הולנד.

בעל רישיון: ג'י-ס' הלט' קר בע"מ, קיבוץ שפיים, 6099000, ישראל.

נערך בינואר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

137-18-29865-05

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון ذכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

Instructions for use and handling – reconstitution, dilution and administration

- Calculate the dose and the number of Remicade vials needed. Each Remicade vial contains 100 mg infliximab. Calculate the total volume of reconstituted Remicade solution required.
- Under aseptic conditions, reconstitute each Remicade vial with 10 ml of water for injections, using a syringe equipped with a 21-gauge (0.8 mm) or smaller needle. Remove flip-top from the vial and wipe the top with a 70% alcohol swab. Insert the syringe needle into the vial through the centre of the rubber stopper and direct the stream of water for injections to the glass wall of the vial. Gently swirl the solution by rotating the vial to dissolve the lyophilised powder. Avoid prolonged or vigorous agitation. DO NOT SHAKE. Foaming of the solution on reconstitution is not unusual. Allow the reconstituted solution to stand for 5 minutes. Check that the solution is colourless to light yellow and opalescent. The solution may develop a few fine translucent particles, as infliximab is a protein. Do not

use if opaque particles, discolouration, or other foreign particles are present.

3. Dilute the total volume of the reconstituted Remicade solution dose to 250 ml with sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) solution for infusion. Do not dilute the reconstituted Remicade solution with any other diluent. The dilution can be accomplished by withdrawing a volume of the sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) solution for infusion from the 250 ml glass bottle or infusion bag equal to the volume of reconstituted Remicade. Slowly add the total volume of reconstituted Remicade solution to the 250 ml infusion bottle or bag. Gently mix. For volumes greater than 250 ml, either use a larger infusion bag (e.g., 500 ml, 1000 ml) or use multiple 250 ml infusion bags to ensure that the concentration of the infusion solution does not exceed 4 mg/ml..
4. Administer the infusion solution over a period of not less than the infusion time recommended (see section 4.2). Use only an infusion set with an in-line, sterile, non-pyrogenic, low protein-binding filter (pore size 1.2 micrometer or less). Since no preservative is present, it is recommended that the administration of the solution for infusion is to be started as soon as possible and within 3 hours of reconstitution and dilution. When reconstitution and dilution are performed under aseptic conditions, Remicade infusion solution can be used within 24 hours if stored at 2° C to 8° C. Do not store any unused portion of the infusion solution for reuse.
5. No physical biochemical compatibility studies have been conducted to evaluate the co-administration of Remicade with other agents. Do not infuse Remicade concomitantly in the same intravenous line with other agents.
6. Visually inspect Remicade for particulate matter or discolouration prior to administration. Do not use if visibly opaque particles, discolouration or foreign particles are observed.
7. Any unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

מבוסס על עליון EU מ 10-2023