

## **نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986**

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

# **مليان**

## **أقراص مطليّة**

يحتوي كل قرص على:

جستودين 0.075 ملغ (gestodene 0.075 mg)  
إثينيل إستراديول 0.02 ملغ (ethinylestradiol 0.02 mg)

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية: أنظري الفصل 2 بند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرئي النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجعي الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاجك. لا تعطيه للأخريات. فهو قد يضرهن حتى ولو بدا لك أن حالتهن الطبية مشابهة لحالتك.

### **معلومات هامة عن وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة وعن الدواء**

- بالاستعمال الصحيح، تعتبر وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة إحدى الطرق العكوسية والأكثر موثوقية لمنع الحمل.
- هي ترفع بقليل من خطورة حدوث خثرة دموية في الأوردة وفي الشرايين، خاصة في السنة الأولى أو عند تجديد العلاج بوسيلة منع حمل هرمونية مركبة بعد فترة توقف ذات 4 أسابيع أو أكثر.
- يتوجب عليك أن تكوني واعية ومراجعة الطبيب إذا كنت تعانين بأن لديك أعراض لحدث خثرة دموية (أنظري البند 2 "خرارات دموية").
- إذا تم تناول أقراص منع الحمل خلال فترة طويلة، فمن شأنها أن تقلل من خطورة إصابتك بسرطان المبايض والرحم.
- أقراص منع الحمل لا تحمي من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي مثل الإيدز أو الكلاميديا، فقط الكوندوم يمكنه أن يساعد بهذا الأمر.
- من شأن هذا الدواء أن يزيد من خطورة حدوث أعراض لديك مثل خثرات دموية وسرطان الثدي.
- هناك نساء لا يناسبهن استعمال أقراص منع الحمل بسبب حالتهن الطبية. الرجاء قراءة النشرة للتأكد من أن مليان يناسبك.
- من أجل منع الحمل، من المهم تناول مليان حسب التعليمات والبدء بعلبة جديدة في الوقت. الرجاء تأكيد من أنك مدربة لكيفية التصرف في حال نسيت قرصاً أو إذا كنت تعانين بذلك حامل.

### **(1) لأى غرض مخصص الدواء؟**

مليان مخصص لمنع الحمل.

**الفصيلة العلاجية:** ينتمي مليان إلى فصيلة الأدوية المسماة الأقراص المركبة (أقراص لمنع الحمل) والحاوية على نوعين من الهرمونات الأنثوية: إستروجين وبروجستوجين. هذه الهرمونات تمنع الحمل بـ 3 طرق: عن طريق منع تحرر بويضة من المبيض، كثافة الإفراز من عنق الرحم الذي يصعب من دخول النطاف إلى الرحم، ومنع سماكة جدران الرحم المطلوبة من أجل انغراس البويضة.

- بالاستعمال الصحيح، تعتبر أقراص منع الحمل إحدى الطرق العكوسية والأكثر موثوقية لمنع الحمل.
- أقراص منع الحمل لا تسبب الإزعاج أثناء ممارسة علاقات جنسية.
- على الأغلب إن أقراص منع الحمل تؤدي إلى انتظام الدورة الشهرية، أن تصبح أخف ومؤلمة بشكل أقل.
- من شأن أقراص منع الحمل أن تخفف من الأعراض ما قبل الطمث.

### **(2) قبل استعمال الدواء**

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسة (لديك اليرجية) لـ جستودين أو لـ إثنين إستراديول أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. قائمة المركبات غير الفعالة، أنظر إلى البند 6 "معلومات إضافية".
  - كنت تعانين أو عانيت في الماضي من خثرة دموية في الأوعية الدموية لرجليك (خثار [جلطة] الأوردة العميق، DVT)، في رئتيك (انصمام رئوي، PE) أو في أعضاء أخرى من الجسم.
  - كنت تعلمين بأنك تعانين من اضطراب في تخثر الدم (مثلاً، من نقص في البروتين من نوع C، من نقص في البروتين من نوع S، من نقص في مضاد الخثرين III)، عامل 5 لايدن أو من المثلازمة المضادة للفوسفوليبيد).
  - كنت مضطربة لإجراء عملية جراحية أو إذا كنت غير قادرة على الحركة لفترة طويلة (أنظر إلى البند 2 "الخثارات الدموية").
  - عانيت في الماضي من نوبة قلبية أو من سكتة دماغية.
  - كنت تعانين أو عانيت في الماضي من ذبحة صدرية (خناق صدري)، حالة تسبب ألماً شديداً في الصدر ويمكن أن تشكل علامة أولية لنوبة قلبية) أو من نوبة إقفارية عابرة (TIA - أعراض لسكتة دماغية عابرة).
  - كنت تعانين من إحدى الأمراض التي قد تزيد من خطورة حدوث خثرة دموية في الشرايين لديك:
    - سكري شديد مع تضرر الأوعية الدموية
    - ضغط دم مرتفع جداً
    - نسب مرتفعة جداً للشحوم في الدم (كولستيrol أو تريجيليسيريدات)  - حالة طيبة تتميز بارتفاع نسب الهوموسيستين في الدم (hyperhomocysteinemia)
  - كنت تعانين أو عانيت في الماضي من نوع لتشخيص المسمى "شققية مع هالة".
  - كنت تعانين أو عانيت في الماضي من سرطان الثدي.
  - عانيت في الماضي من مرض كبدي خطير، وقيل لك من قبل الطبيب بأن وظائف كبدك لم تعد حتى الآن إلى مستواها السليم.
  - كنت تعانين أو عانيت في الماضي من أورام في الكبد.
  - كنت تعانين من التهاب كبد من نوع C (التهاب الكبد C) وتتناولين مستحضرات طيبة تحتوي على أمبيتاسفير/باريتاپرېچېر/ريتونافير، داسابوڤير، چۈلکارپېچېر/پېرىپېتساسفير أو سوفوسبيوڤير/فيلىپاتاسفير / ۋۆكسىلاپېچېر (أنظر إلى أيضاً البند "تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية").

إذا كنت تعانين من إحدى الحالات التي ذكرت أعلاه، أو إذا ظهر لديك واحد منها للمرة الأولى، توقفي عن العلاج وبلغي الطبيب عن ذلك. ينافسك الطبيب بالنسبة لوسائل منع الحمل الأخرى التي من شأنها أن تناسبك بشكل أكثر.

تحذيرات خاصة تتuelle باستعمال الدواء

- قبل أن تبدأ بتناول مليان، اقرئي المعلومات عن الخثرات الدموية في سياق هذا البند. من المهم بشكل خاص قراءة ما هي أعراض الخثرة الدموية المفصلة في البند 2 "الخثرات الدموية".
  - من المهم أن تدركى الفوائد والمساوى من تناول أفراد منع الحمل قبل بدء الاستعمال، أو من أجل القرار فيما إذا يتوجب عليك مواصلة تناولها. على الرغم من أن أفراد منع الحمل تناسب غالبية النساء الأصحاء، فهي لا تناسب الجميع.
  - بلغى الطبيب إذا كنت تعانين من الحالات الطبية أو من عوامل الخطورة المذكورة في هذه النشرة.
  - إذا كنت بحاجة لإجراء فحص دم، بلغى الطبيب بأنك تتناولين قرص لمنع الحمل، لأن أفراد منع الحمل المركبة يمكنها أن تؤثر على نتائج فحوص معينة.

متى يتوجه عليك التوجّه إلى الطيب؟

طيبة مساعدة لتأقى بسرعة توجهي

- إذا كنت تلاحظين علامات ممكناً لحدوث خثرة دموية التي قد تدل على تشكيل خثرة دموية بجسمك في الرجل (أي جلطة الأوردة العميقة)، خثرة دموية في الرئتين (أي انصمام رئوي)، نوبة قلبية أو سكتة دماغية (أنظري إلى البند 2 "الخثرات الدموية").

لوصف علامات تلك الأعراض الحانئية الخطيرة، الرجاء أنظري البند 2 "كيفية تشخيص خثرة دموية".

- إذا شعرت بأعراض الوزمة الوعائية مثل انتفاخ الوجه، اللسان و/or الحلق و/or صعوبة في البلع أو شرى (شرية) والتي قد تكون مصحوبة بصعوبات بالتنفس، توجهي للطبيب فوراً. من شأن المستحضرات التي تحتوي على الأستروجين أن تسبب أو قبل استعمال ملیان بلغى الطبيب إذا كانت إحدى الحالات التالية تخصك، تتطور أو تتفاقم أثناء تناول ملیان:
  - قد تتفاقم بعض الحالات المذكورة لاحقاً أثناء تناول أقراص منع الحمل، أو يمكنها أن تدل على أن ملیان غير مناسب لك. من الجائز أن بإمكانك استعمال ملیان ولكن يتطلب الأمر إجراء مراقبة حثيثة بشكل أكثر لدى طبيبك.

تفاقم أعراض الوذمة الوعائية الوراثية أو الوذمة الوعائية المكتسبة.

- إذا كنت تعاني من داء كرون أو من التهاب القولون التقرحي (مرض معوي التهابي مزمن)
- إذا كنت تعاني من الذئبة الحمامية الجهازية (لوبوس - مرض يؤثر على جهازك المناعي)
- إذا كنت تعاني من متلازمة إنجلال الدم اليلوري (اضطراب في تخثر الدم الذي يؤدي إلى فشل كلوي)
- إذا كنت تعاني من فقر الدم المنجلي (مرض وراثي لخلايا الدم الحمراء)
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (pancreatitis)
- إذا كنت تعاني من ارتفاع نسب الشحوم في الدم (فرط الشحوم الثلاثية في الدم) أو لديك سابقة عائلية لهذه الحالة. وجد أن فرط الشحوم الثلاثية في الدم له علاقة بزيادة الخطورة لتطور التهاب البنكرياس
- إذا كنت مضطربة لإجراء عملية جراحية أو إذا كنت عديمة الحرارة لفترة طويلة (أنظري البند 2 "الخثرات الدموية")
- إذا أجبت مؤخرًا فأنت معرضة لخطورة زائدة لتطور خثرات دموية. استشيري طبيبك بخصوص كم من الوقت بعد الولادة يسمح لك ببدء تناول مليون
- إذا كنت تعاني من التهاب الأوردة تحت الجلد (التهاب الأوردة الخثاري السطحي)
- إذا كنت تعاني من دوالي في الأوردة
- إذا كنت تعاني من السكري
- إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك المقربين عانيتم ذات مرة من مشاكل في القلب أو من مشاكل في الدورة الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم
- إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك المقربين عانيتم ذات مرة من مشاكل في التخثر
- إذا كنت تعاني من مرض وراثي يسمى پورفيريا
- إذا كنت تعاني من فرط البدانة
- إذا كنت تعاني من الشقيقة
- إذا كنت تعاني من أي مرض قد تفاقم خلال الحمل أو خلال استعمال سابق لأقراص منع الحمل (أنظري البند 4 "الأعراض الجانبية")

#### الخثرات الدموية

إن استعمال وسيلة منع حمل هورمونية مركبة، مثل مليون، يزيد من خطورة تطور خثرة دموية لديك بالمقارنة لعدم الاستعمال. في حالات نادرة قد تسد الخثرة الدموية أو عية دموية وتؤدي لحدوث مشاكل خطيرة.

الخثرات الدموية قد تتشكل:

- في الأوردة (حالة تسمى "جلطة وريدية"، "خثار وريدي" أو (VTE)
- في الشرايين (حالة تسمى "جلطة شريانية"، "خثار شرياني" أو (ATE))

إن الشفاء من الخثرات الدموية هو غير تمام دائمًا. في أوقات نادرة، من الجائز أن تحدث أعراض خطيرة مطولة أو في أوقات نادرة جدًا، من الجائز أن تحدث حالات تشكل خطراً على الحياة.

من المهم التذكر بأن الخطورة الإجمالية لحدوث خثرة دموية صارت نتيجة تناول مليون، هي ضئيلة.

#### كيفية تشخيص خثرة دموية

تجهزي بسرعة لتلقي مساعدة طبية إذا كنت تلاحظين إحدى العلامات أو الأعراض التالية.

هل تشعرين بإحدى العلامات التالية؟	من أي شيء من الجائز أنك تعاني؟
<ul style="list-style-type: none"><li>• انفاس بطيء</li><li>• إذا ترافق به:<ul style="list-style-type: none"><li>○ ألم أو حساسية في الرجل التي من الجائز أن يتم الشعور بها فقط أثناء الوقوف أو المشي</li><li>○ ارتفاع حرارة الرجل المتأثر</li><li>○ تغير لون جلد الرجل مثل شحوب، أحمرار أو إزرقان</li></ul></li></ul>	<p>جلطة الأوردة العميقية</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• انتفاخ بإحدى الرجلين أو على طول وريد في الرجل أو في القدم، خاصة إذا ترافق به:<ul style="list-style-type: none"><li>○ ألم أو حساسية في الرجل التي من الجائز أن يتم الشعور بها فقط أثناء الوقوف أو المشي</li><li>○ ارتفاع حرارة الرجل المتأثر</li><li>○ تغير لون جلد الرجل مثل شحوب، أحمرار أو إزرقان</li></ul></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• ضيق مفاجئ في التنفس مجهول السبب أو تسارع التنفس</li><li>• سعال مفاجئ مجهول السبب، الذي قد يترافق بدم</li><li>• ألم حاد في الصدر الذي يشتد أثناء التنفس بعمق</li><li>• الشعور بدوخة شديدة أو دوار</li></ul>	انصمام رئوي

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• نبض سريع أو غير منظم</li> <li>• ألم شديد في البطن</li> </ul> <p>إذا لم تكوني واثقة، تحدي مع الطبيب لأنه بالإمكان الخطأ والظن بأن بعض الأعراض مثل السعال أو صيق التنفس، تنسب لمشاكل أبسط مثل تلوث الطرق التنفسية (الرشح مثلاً).</p>
جلطة في أوردة شبكيّة العين (خثرة دموية في العين)	نوبة قلبية	<p>أعراض التي تظهر على الأغلب في عين واحدة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• فقدان رؤية مفاجئ أو تشوّش رؤية غير مترافق بألم، الذي قد يتفاقم لدرجة فقدان الرؤية</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ألم، إزاعاج، ضغط، أو ثقل في الصدر</li> <li>• شعور بضغط أو امتلاء في الصدر، في الذراع أو من تحت عظم الصدر</li> <li>• الشعور بامتلاء، اختناق أو عسر هضم</li> <li>• الشعور بازاعاج في القسم العلوي من الجسم الذي يمتد إلى الظهر، الفك، الحنجرة، الذراع والبطن</li> <li>• تعرق، غثيان، تقيؤ أو دوار</li> <li>• ضعف شديد، فلاق أو ضيق تنفس</li> <li>• نبض سريع أو غير منظم</li> </ul>
سكتة دماغية		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ضعف مفاجئ أو تتملّل الوجه، الذراع أو الرجل، خاصة في جانب واحد من الجسم</li> <li>• ارتباك، صعوبات مفاجئة في النطق أو الإدراك</li> <li>• صعوبات مفاجئة في الرؤية بعين واحدة أو بكلا العينين</li> <li>• صعوبات في المشي، دوار، فقدان مفاجئ للتوازن أو للتنسيق</li> <li>• صداع مفاجئ، شديد أو متواصل بسبب مجهول</li> <li>• فقدان الوعي أو الإغماء مع أو بدون اختلالات</li> </ul> <p>أحياناً يمكن أن تكون أعراض السكتة الدماغية قصيرة، ذات شفاء فوري تقريباً وكامل، ولكن لا يزال عليك التوجّه للتالي علاج طبي فوري، نظراً لأنك قد تكوني معرضة لخطورة حدوث سكتة إضافية.</p>
خثرات دموية تسدّ أوّعية دموية أخرى		<ul style="list-style-type: none"> <li>• انتفاخ وتغيير بسيط في لون أطراف الجسم إلى الأزرق</li> <li>• ألم شديد في البطن</li> </ul>

إذا كنت تعانين من إحدى الحالات التالية، توجّهي بسرعة إلى الطبيب. توقّفي عن تناول ملیان إلى أن تتلقّي تعليمات أخرى من الطبيب. في غضون ذلك، استعملّي وسيلة أخرى لمنع الحمل مثل الكوندوم.

#### خثرات دموية في الوريد

ما الذي قد يحدث إذا تشكّلت خثرة دموية في الوريد؟

- لقد وجد أن استعمال وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة له علاقة بزيادة الخطورة لتشكل خثرات دموية في الوريد (جلطة وريدية). مع ذلك، فإن تلك الأعراض الجانبية هي نادرة وتحدث بالأخص في السنة الأولى لاستعمال وسيلة منع الحمل الهرمونية المركبة.
- إذا تشكّلت خثرة دموية في وريد الرجل أو في القدم، فهي قد تسبّب جلطة الأوردة العميقـة (DVT).
- إذا تحركت خثرة دموية من الرجل ووصلت إلى الرئة فقد يتشكّل انصمام رئوي.
- في أحيان نادرة قد تتشكل خثرة دموية في الوريد ببعض آخر مثل العين (جلطة وريدية في شبكيّة العين).

متى يكون الخطر أعظمي لتطور خثرة دموية في الوريد؟

الخطر الأعظمي لتطور خثرة دموية في الوريد هو خلال السنة الأولى لتناول وسيلة منع حمل هرمونية مركبة للمرة الأولى. إضافة لذلك، قد يزيد الخطر إذا بدأت بتناول وسيلة منع حمل هرمونية مركبة من جديد (نفس الدواء أو دواء آخر) بعد فترة قدرها 4 أسابيع أو أكثر.

بعد السنة الأولى، تتحسن الخطورة، ولكنها تكون دائمًا أكبر بقليل مما هو عليه في حال عدم استعمالك لوسيلة منع حمل هormونية مركبة.

عندما تتوقفين عن استعمال مليان، فإن الخطورة لتطور خثرة دموية لديك تعود إلى مستواها الاعتيادي خلال عدة أسابيع.

#### ما هي الخطورة لتطور خثرة دموية؟

تعلق الخطورة بمستوى الخطورة الطبيعي لتطور جلطة وريدية لديك (VTE) وبنوع وسيلة منع الحمل الهرمونية المركبة التي تتناولينها.

إن الخطورة الإجمالية لتطور خثرة دموية في الرجل أو في الرئتين (DVT أو PE) عند استعمال مليان، هي ضئيلة.

- من بين 10,000 امرأة لا تستعملن وسيلة منع حمل هormونية مركبة ولسن حوامل، فإن حوالي 2 ستتطور لديهن خثرة دموية في السنة.
- من بين 10,000 امرأة تستعملن وسيلة منع حمل هormونية مركبة الحاوية ليقونورجسترين، نوريثيسيرون أو نوروجستيمات، فإن حوالي 7 - 5 ستتطور لديهن خثرة دموية في السنة.
- من بين 10,000 امرأة تستعملن وسيلة منع حمل هormونية مركبة الحاوية جستودين مثل مليان، فإن حوالي 9 إلى 12 امرأة ستتطور لديهن خثرة دموية في السنة.
- إن الخطورة لتطور خثرة دموية تختلف كأمر متعلق بالسابق الطبية الشخصية لديك (أنظري البند 2 "العوامل التي تزيد من خطورة تطور خثرة دموية في الوريد لديك").

الخطورة لتطور خثرة دموية في السنة	
حوالي 2 من بين 10,000 امرأة	النساء اللواتي لا تستعملن قرص هormوني مركب لمنع الحمل ولسن حوامل
حوالي 7-5 من بين 10,000 امرأة	النساء اللواتي تستعملن قرص هormوني مركب لمنع الحمل الحاوي ليقونورجسترين، نوريثيسيرون أو نوروجستيمات
حوالي 9-12 من بين 10,000 امرأة	النساء اللواتي تستعملن مليان

#### العوامل التي تزيد من خطورة تطور خثرة دموية في الوريد لديك

إن الخطورة لتطور خثرة دموية عند استعمال مليان هو ضئيل، ولكن حالات معينة تزيد من الخطورة. تكون الخطورة لديك أكبر:

- إذا كنت تعانيين من وزن زائد بشكل ملحوظ (BMI أكثر من 30 كغ/متر<sup>2</sup>)
- إذا كان لأحد أفراد عائلتك المقربين حالة لظهور خثرة دموية بالرجل في سن مبكرة (مثلاً دون عمر 50 سنة)، في الرئة أو في عضو آخر. في مثل هذه الحالة من الجائز أن يكون لديك اضطراب وراثي في ت inher الدم
- إذا توجب عليك إجراء عملية جراحية أو إذا كنت عديمة الحركة لفترة طويلة بسبب إصابة أو مرض، أو إذا تم وضع رجلك بالجس. من الجائز أن يحتاج الأمر التوقف عن استعمال مليان قبل 4 أسابيع على الأقل من العملية الجراحية أو خلال فترة كونك قليلة الحركة. إذا توجب عليك التوقف عن استعمال مليان، استشيري طبيبك متى يمكنك بدء استعمال الدواء ثانية مع التقدم في السن (خاصة إذا تجاوزت عمر 35 سنة تقريبًا)
- إذا أجبت في الأسابيع الأخيرة

تزداد الخطورة لتطور خثرة دموية كلما وجد لديك أكثر من تلك الحالات.

إن الطيران (الأكثر من 4 ساعات) قد يزيد بشكل مؤقت من خطورة حدوث خثرة دموية لديك، خاصة إذا وجد لديك قسم من قائمة العوامل الأخرى.

من المهم أن تبلغي الطبيب إذا كانت إحدى تلك الحالات تخصك، حتى ولو لم تكوني واثقة. من الجائز أن يقرر الطبيب أنه يتوجب عليك التوقف عن تناول مليان.

إذا تغيرت إحدى الحالات التي ذكرت آنفًا خلال استعمال مليان، مثلاً إذا كان أحد أفراد عائلتك المقربة يعاني من جلطة لسبب غير معروف أو إذا طرأ ارتفاع ملحوظ على وزن جسمك، بلغ الطبيب عن ذلك.

## **خثرات دموية في الشريان**

ما الذي قد يحدث إذا تشكلت خثرة دموية في الشريان؟

بالمشابه للخثرة الدموية في الوريد، فإن الخثرة الدموية في الشريان قد تسبب مشاكل خطيرة. مثلاً، خثرة دموية شريانية قد تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

العوامل التي تزيد من خطورة تطور خثرة دموية شريانية لديك

من المهم التذكير بأن خطورة حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية نتيجة استعمال مليان هي ضئيلة جداً، ولكنها قد تزداد:

- مع التقدم في السن (إذا تجاوزت عمر 35 سنة تقريباً)

إذا كنت من المدخنات. يوصى بالتوقف عن التدخين أثناء استعمال وسيلة هورمونية مركبة لمنع الحمل مثل مليان. إذا كنت غير قادرة عن التوقف عن التدخين وتتجاوزت عمر 35 سنة، فمن الجائز أن يوصي طبيبك باستعمال وسيلة منع حمل من نوع آخر إذا كنت تعانين من وزن زائد

- إذا كنت تعانين من ارتفاع ضغط الدم

إذا حدث ضمن عائلتك المقربة حالة لنوبة قلبية أو سكتة دماغية في سن مبكرة (دون عمر 50 سنة تقريباً). في مثل هذه الحالة من الجائز أن تكوني أيضاً معرضة لخطورة أكبر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية

- إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك المقربة تعانين من ارتفاع بنسن الشحوم في الدم (كوليسترول أو تريجيليسيريدات)

إذا كنت تعانين من الشقيقة، خاصة "شقيقة مع هالة"

إذا كنت تعانين من مشكلة في الأداء الوظيفي للقلب (اضطراب في صمامات القلب، اضطراب في نظم القلب المسمى الرجافان الأذيني)

- إذا كنت تعانين من السكري

إذا وجد لديك أكثر من واحد من تلك الحالات أو إذا كان أحدها شديد لديك بشكل خاص، فإن الخطورة لتطور خثرة دموية قد تزداد بشكل أكثر.

إذا تغيرت إحدى الحالات التي ذكرت آنفأً خلال استعمال مليان، مثلاً إذا بدأت بالتدخين، أحد أفراد عائلتك المقربة يعني من جلطة لسبب غير معروف أو إذا طرأ ارتفاع ملحوظ على وزن جسمك، بلغي طبيبك عن ذلك.

## **أقراص منع الحمل والسرطان**

في حين أن أقراص منع الحمل بعيار دوائي مرتفع، تقلل من خطورة تطور سرطان المبايض والرحم بالاستعمال طويلاً الأمد، فمن غير الواضح فيما إذا كانت أيضاً أقراص منع الحمل بعيار دوائي منخفض مثل مليان تؤدي إلى نفس التأثير الواقعي. مع ذلك، لوحظ أيضاً أن تناول أقراص منع الحمل تزيد بقليل من خطورة تطور سرطان عنق الرحم - على الرغم من أن سبب ذلك قد يكون ممارسة علاقات جنسية من دون كوندوم أكثر من استعمال أقراص منع الحمل. توصي كافة النساء بإجراء فحص لطاقة عنق الرحم بشكل روتيني.

إذا كنت تعانين أو عانيت في الماضي من سرطان الثدي، فيوصى بـلا تستعمل أقراص لمنع الحمل. إن أقراص منع الحمل ترفع بقليل من خطورة إصابتك بسرطان الثدي. تستمر الزيادة بالخطورة طالما أنك تتناولين أقراص لمنع الحمل، ولكنها تعود إلى طبيعتها خلال 10 سنتين من التوقف عن الاستعمال. بما أن سرطان الثدي هو نادر لدى نساء دون عمر 40 سنة، فإن الحالات الإضافية التي تم تشخيصها لدى النساء اللواتي تتناولن أو تناولن مؤخرأً أقراص لمنع الحمل هي قليلة. مثلاً:

- من بين 10,000 امرأة اللواتي لم تتناولن أبداً أقراص لمنع الحمل، حوالي 16 سترمزن بسرطان الثدي حتى بلوغهن عمر 35 سنة.

من بين 10,000 امرأة اللواتي تناولن أقراص لمنع الحمل لمدة 5 سنين في بداية سن الـ 20 من العمر، حوالي 17-18 سترمزن بسرطان الثدي حتى بلوغهن عمر 35 سنة.

من بين 10,000 امرأة اللواتي لم تتناولن أبداً أقراص لمنع الحمل، حوالي 100 سترمزن بسرطان الثدي حتى بلوغهن عمر 45 سنة.

من بين 10,000 امرأة اللواتي تناولن أقراص لمنع الحمل لمدة 5 سنين في بداية سن الـ 30 من العمر، حوالي 110 سترمزن بسرطان الثدي حتى بلوغهن عمر 45 سنة.

## **تزداد الخطورة لإصابتك بسرطان الثدي:**

- إذا وجدت لديك قريبة عائلة (أم، اخت أو جدة) قد مرضت بسرطان الثدي.
- إذا كنت تعانين من فرط بدانة خطير.

توجهي حالاً إلى الطبيب إذا كنت تلاحظين تغيرات في الثديين، مثل حفر في الجلد، تغيرات في الحلمة أو إذا كنت تلاحظين أو تشعرين بكلٍّ.

لقد وجد أن تناول أقراص منع الحمل له علاقة أيضاً بأمراض الكبد مثل اليرقان وظهور أورام غير سرطانية في الكبد، ولكن هذه الحالات هي نادرة. في حالات نادرة أكثر، وجد أن أقراص منع الحمل لها علاقة بأنواع معينة لسرطان الكبد لدى النساء اللواتي تناولن الدواء لفترة زمنية طويلة.

توجهي حالاً إلى الطبيب إذا كنت تشعرين بألم شديد في البطن أو إصفرار بياض العينين (يرقان). من الجائز أن تضطري للتوقف عن استعمال مليان.

#### اضطرابات نفسية

بلغت بعض النساء اللواتي يستعملن وسائل منع حمل هورمونية بما في ذلك مليان عن اكتئاب أو مزاج اكتئابي. قد يكون الاكتئاب جدياً وقد يؤدي إلى أفكار انتحارية. إذا كنت تقاسي من تغيرات في الحالة النفسية ومن أعراض اكتئاب فاتصل بطبيبك لاستشارة طبية إضافية بأسرع ما يمكن.

#### التدخين

إن خطرة حدوث جلطة شريانية وأعراض جانبية جدية متعلقة بالقلب والأوعية الدموية، ذات الصلة بتناول قرص لمنع الحمل، تزداد مع التقدم بالعمر. تزداد هذه الخطرة لدى النساء المدخنات لكميات كبيرة من السجائر، خاصة إذا تجاوزن عمر 35 سنة. لذلك، يوصى بعدم التدخين أثناء استعمال الدواء. إذا كنت غير قادرة على التوقف عن التدخين وتتجاوزت عمر 35 سنة، فمن الجائز أن يوصيك طبيبك باستعمال وسيلة لمنع الحمل من نوع آخر.

#### الفحوص والمتتابعة

- قبل بدء استعمال قرص منع الحمل، يسأل الطبيب حول السوابق الطبية لك ولعائلتك، ويفحص ضغط دمك وينفي إمكانية كونك حامل. من الجائز أن يحتاج الأمر فحوصات إضافية مثل فحص الثديين، ولكن فقط إذا كانت هناك ضرورة بذلك الفحوصات من أجلك أو إذا كانت لديك أية مخاوف خاصة.
- خلال فترة العلاج يجب إجراء زيارات روتينية لدى طبيبك، تشمل فحص لطاقة عنق الرحم. افحصي كل شهر فيما إذا طرأت أي تغيرات في الثديين والحلمين، بلغي الطبيب إذا كنت تلاحظين أو تشعررين بأي تغير مثل كتل أو حفر في الجلد.
- إذا كان من المفترض أن تجتازي عملية جراحية، تأكدي من أن الطبيب يعلم بأنك تتناولين مليان. من الجائز أن يطلب منك التوقف عن تناول قرص منع الحمل قبل 4 أسابيع على الأقل من العملية الجراحية. وذلك من أجل تقليل خطرة حدوث خثرة دموية (أنظر إلى البند 2 "الخثرات الدموية"). يرشدك الطبيب متى يمكنك بدء تناول قرص منع الحمل ثانية.

#### التدخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناولين، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طيبة وإضافات غذائية، احكي للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناولين واحداً من الأدوية التالية التي قد تؤثر على مستويات مليان في الدم وبالتالي تتضاعف من تأثيره:

- أدوية لعلاج الصرع مثل باربيتورات، بريميدون، فينيتوئين، كاربامازيبين، أو كسكاربازيبين، توبيرامات
- أدوية معينة لعلاج مرض الإيدز والإلتهاب الكبد من نوع C (تسمى مثبطات الپروتياز و- non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors) مثل ريتونافير، نفينافير، نيفيرافير
- چريزوفولفين لعلاج التلوثات الفطرية
- مثبطات الإنزيم CYP3A4 مثل إيتراكونازول، ڤوريكونازول وفلوكونازول (لعلاج التلوثات الفطرية) ومضادات حيوية من فصيلة الماكروليدات (مثل إبريزتروميسين) التي قد ترفع مستوى الإستروجينين وأو الپروجستوجين في الدم
- مضادات حيوية معينة لعلاج الأمراض الإنترانية مثل ريفامېسيين
- النبات St. John's wort (هېپېرېکوم) لمعالجة الحالات النفسية الاكتئابية
- إنوريوكسيب (مضاد للالتهاب ومسكن للألام)
- أدوية قد يرتفع تركيزها في الدم عند استعمالها مع مليان - سيكلوسپورين، تيزانيدين، ثيوفيلين
- أدوية قد ينخفض تركيزها في الدم عند استعمالها مع مليان - لاموتريجين

إذا كنت تتناولين واحداً من الأدوية التي ذكرت آنفاً، فمن الجائز أن مليان غير مناسب لك وستضطرين لاستعمال وسيلة إضافية لمنع الحمل لفترة من الزمن. يرشدك الطبيب إذا دعت الحاجة بذلك ولا يقتصر ذلك على فترة من الزمن. إضافة لذلك، يوصى بفحص نشرات الأدوية التي تتناولينها فيما إذا كان مسموح استعمالها بالتزامن لوسيلة لمنع الحمل الهرمونية.

كما أن، مليان قد يؤثر على عمل أدوية أخرى. من الجائز أن يقوم طبيبك بتغيير المقدار الدوائي للأدوية التي تتناولينها بالتزامن مع

مليان.

لا تستعمل مليان إذا كنت تعاني من التهاب كبد من نوع C (التهاب الكبد C) وتتناولين مستحضرات طبية تحتوي على أو ميبيتاسفير/باريتاپريفير/ريتونافير، داسابوغير، چليكاپريغير/پيرينتسافير أو سوفوسبوغير/فيلاپاتاسافير/فوكسيلاپريغير، لأن الاستعمال قد يؤدي إلى ارتفاع في نتائج فحوص الدم لوظائف الكبد (ارتفاع إنزيم كبدي من نوع ALT). يصف لك الطبيب نوع آخر من وسائل منع الحمل قبل بدء العلاج بهذه المستحضرات الطبية. بالإمكان استئناف استعمال مليان بعد حوالي أسبوعين من انتهاء العلاج. أنظر إلى البند "لا يجوز استعمال الدواء إذا".

#### استعمال الدواء والطعام بالإمكان بلع الدواء على معدة خاوية أو مع طعام.

الحمل، الإرضاع والخصوبة  
لا يجوز تناول مليان إذا كنت في فترة الحمل.

إذا كنت تعتقدين بأنك من الجائز أن تكوني حامل، قومي بإجراء فحص الحمل قبل أن تتوقفي عن تناول الدواء. إن استعمال مليان خلال فترة الرضاعة قد يؤدي إلى خفض حجم الحليب الناتج وأن يغير من تركيبه. إن كميات ضئيلة من المواد الفعالة تطرح في حليب الأم. قد تؤثر هذه الكميات على الرضيع، خاصة خلال الأسابيع الـ 6 الأولى بعد الولادة.  
إذا كنت مرضعة، من الجائز أن ينصحك طبيبك بعدم تناول مليان. يمكنه مساعدتك باختيار وسيلة منع حمل بديلة. الإرضاع لا يمنع حدوث الحمل.

#### السياقة واستعمال الماكينات لا يوجد لـ مليان تأثير على القدرة على السياقة وتشغيل الماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء  
الدواء يحوي لكتوز وسكروز. إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، إستشيري الطبيب قبل بدء العلاج بـ مليان.

### (3) كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستفادة من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكوني واثقة بما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

• المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الاعتيادي عادة هو قرص واحد في اليوم بساعة محددة لمدة 21 يوم. بعد 21 يوم من تناول الأقراص، يجب إجراء فاصل قدره 7 أيام.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

#### • طريقة التناول

يجب بلع القرص بأكمله، مع الماء إذا دعت الحاجة.  
من النوع سحق/شطر/مضغ القرص، وذلك من أجل عدم إلحاق الضرر بطلاء القرص.

#### • فترة العلاج

##### تناول مليان كل يوم لمدة 21 يومًا

بعلبة مليان هناك 21 قرصاً. على ظهر العلبة، بظاهر كل قرص مدون اليوم من الأسبوع وسهم يرشدك على اتجاه التقدم. ابتدئ بتناول القرص المعلم باليوم الملائم من الأسبوع، واصلي تناول الأقراص حسب اتجاه الأسهم. تناولي قرص واحد كل يوم حتى انتهاء العلبة.

#### قومي بإجراء فاصل قدره 7 أيام

بعد 21 يوماً من تناول الأقراص، قومي بإجراء فاصل قدره 7 أيام، بحيث إذا تناولت القرص الأخير من العلبة في يوم الجمعة، فتناول القرص الأول من العلبة التالية في يوم السبت من الأسبوع الذي يليه. خلال عدة أيام من تناول القرص الأخير، سيظهر نزف الطمت. من الجائز ألا يتوقف النزف حتى الآن عندما تبدئين بعلبة أقراص جديدة. لا حاجة بوسيلة حماية إضافية خلال 7 أيام التوقف - وذلك إذا تناولت الأقراص حسب الإرشادات وبدأت العلبة الجديدة في الوقت.

## ابدئي بعلبة جديدة

ابدئي بعلبة جديدة - حتى ولو لم يتوقف النزف الطمثي بعد. ابدي دائمًا بعلبة جديدة في الوقت. ستبدئين دائمًا بعلبة جديدة في نفس اليوم من الأسبوع، طالما أنك تستعملين مليان حسب الإرشادات.

### • بدء استعمال مليان

تناول مليان للمرة الأولى أو بعد فترة توقف عن الاستعمال يوصى بتناول القرص الأول في اليوم الأول من النزف الطمثي. على هذا النحو، أنت محمية من الحمل بدءاً من تناول القرص الأول.

## الانتقال إلى مليان بعد استعمال قرص آخر لمنع الحمل

- إذا كنت تتناولين قرصاً من علبة ذات 21 قرصاً: ابدي مليان في اليوم الذي يلي انتهاءك من تناول القرص الآخر لمنع الحمل. على هذا النحو، أنت محمية من الحمل بدءاً من تناول القرص الأول. سيظهر النزف الطمثي فقط بعد انتهاء علبة مليان.
- إذا كنت تتناولين قرصاً من علبة ذات 28 قرصاً: ابدي مليان في اليوم الذي يلي تناول القرص الفعال الأخير من العلبة الأخرى. على هذا النحو أنت محمية من الحمل بدءاً من تناول القرص الأول. سيظهر النزف الطمثي فقط بعد انتهاء علبة مليان.
- إذا كنت تتناولين قرص لمنع الحمل الحاوي فقط بروجستوجين (POP): ابدي مليان في اليوم الأول من النزف الطمثي، حتى ولو تناولت قرص بروجستوجين بنفس اليوم. على هذا النحو أنت محمية من الحمل في الحال.

## بدء مليان بعد إجهاض طبيعي أو إيقاف حمل

إذا اجترت إجهاضاً طبيعياً أو إيقاف حمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى للحمل، فمن الجائز أن يرشدك الطبيب بتناول مليان في الحال، في مثل هذه الحالة أنت محمية من الحمل بدءاً من تناول القرص الأول.

إذا اجترت إجهاضاً طبيعياً أو إيقاف حمل بعد الشهر الثالث للحمل، استشيري الطبيب. من الجائز أن تضطري لاستعمال وسيلة إضافية لمنع الحمل، مثل الكوندوم، لفترة قصيرة.

## استعمال وسائل منع الحمل بعد الولادة

إذا أجبت مؤخرًا، يرشدك الطبيب بتناول مليان بعد 21 يوم من الولادة بشرط كونك طلقة الحركة. لا حاجة بالانتظار للدورة الشهرية. يتوجب عليك استعمال وسيلة إضافية لمنع الحمل، مثل الكوندوم، حتى بدء تناول مليان وخلال الأيام الـ 7 الأولى من الاستعمال.

## إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

من غير المحتمل أن يسبب تناول أكثر من قرص واحد ضرراً، ولكن من الجائز أن يظهر غثيان، تققيبات أو نزف مهبلي. قد يظهر مثل هذا النزف أيضاً لدى فتیات لم يحدث لديهن بعد طمث وتناولن الدواء بالخطأ. استشيري الطبيب إذا كنت تشعرين بإحدى تلك الأعراض.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجهي حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضرري معك علبة الدواء.

## إذا نسيت تناول الدواء

إذا كان التأخير بتناول قرص واحد أقل من 12 ساعة، تناولي القرص بأسرع ما يمكن واستمري بتناول باقي الأقراص كالمعتاد. من الجائز أن يعني الأمر تناول قرصين بنفس اليوم. لا تتفافي - فإن الحماية من الحمل لم تتضرر.

إذا كان التأخير بتناول قرص واحد أكثر من 12 ساعة، أو نسيت أكثر من قرص واحد، فمن الجائز أن الحماية من الحمل تضررت.

- تناولي القرص المنسي الأخير بأسرع ما يمكن، حتى ولو أن ذلك يعني تناول قرصين سوية. في حال نسيت أقراص سابقة، أبقيها في العلبة.

• واصلي تناول قرص في اليوم لمدة الأيام الـ 7 التالية، في الوقت الاعتيادي.

• إذا أنهيت العلبة خلال الأيام الـ 7 تلك، فابدئي بعلبة جديدة من دون فاصل قدره 7 أيام. من المفترض ألا يظهر نزف طمثي إلا بعد انتهاء العلبة الثانية فقط، ولكن لا حاجة للقلق. إذا أنهيت العلبة الثانية ولم يظهر نزف بعد، قومي بإجراء فحص الحمل قبل أن تبدئي علبة إضافية.

• استعملني وسيلة إضافية لمنع الحمل مثل الكوندوم خلال الأيام الـ 7 القادمة التي تلي نسيانك للقرص.

• إذا نسيت تناول قرص واحد أو أكثر من الأسبوع الأول من العلبة (الأيام 1-7) ومارست علاقات جنسية خلال هذا الأسبوع، فهناك احتمال بأن تكوني حامل. استشيري الطبيب بأسرع ما يمكن. سيسألك بخصوص وسائل منع الحمل للأوقات الطارئة.

إذا نسيت تناول أي قرص من العلبة، ولم يظهر نزف طمثي خلال أيام التوقف، فهناك احتمال بأن تكوني حامل. اتصلى بالطبيب بأسرع ما يمكن، أو قومي بإجراء فحص بيتي للحمل.

إذا بدأت عملية جديدة بتأخر، أو قمت باطالة أيام التوقف لأكثر من 7 أيام، فهناك احتمال بـألا تكوني محمية من الحمل. إذا مارست علاقات جنسية خلال الأيام الـ 7 الأخيرة، استشيري الطبيب. من الجائز أن تحتاجي لوسيلة منع حمل للأوقات الطارئة. إضافة لذلك، استعملى وسيلة لمنع الحمل مثل الكوندوم في الأيام الـ 7 القادمة.

إذا فقدت قرصاً

تصر في بحسب احدى الامكانتين التاليتين:

تناول القرص الأخير من العلبة عوضاً عن القرص المفقود. واصلي تناول باقي الأقراص في الأيام المخصصة لها كالمعتاد. ستتصرّد دورتك الشهرية بيوم واحد عن المعتاد، ولكن الحماية من الحمل لم تتضرر. بعد 7 أيام التوقف، سيعتّبر يوم بدء العلبة وسيبدأ قبل يوم من العلبة السابقة.

أو إذا كان بحوزتك علبة إضافية و كنت لا ترغبين بتغيير يوم بدء دورتك الشهرية، تناولي قرص من العلبة الإضافية. واصلي تناول باقي الأقراص من العلبة الحالية كالمعنداد. يمكنك حفظ العلبة المفتوحة كعلبة إضافية (احتياطية)، وذلك لحالة فقدانك أقراص إضافية.

في حال التقى أو الاسهال

في حال معاييرك من تقيؤات أو إسهالات شديدة خلال 4 ساعات من لحظة تناول قرص، فليس هناك ضمان تام بأن يمتص القرص اليومي بأكمله من جهاز الهضم.

**في حال شفائه خلال 12 ساعة من تناول ملیان، تابعي الإرشادات في هذا البند "إذا فقدت قرص"، الذي يشرح كيف يتوجب عليك تناول قرص إضافي.**

في حال معاناتك من تقيّبات أو إسهالات لمدة أكثر من 12 ساعة متقدمة من تناول القرص، تابعي الإرشادات في هذا البند "إذا نسيت تناول الدواء".

**بلغى الطبيب في حال استمرار أو تفاقم الإضطرابات الهضمية.** من الجائز أن يوصيتك باستعمال وسيلة بديلة لمنع الحمل.

**غياب الدورة الشهرية - هل هناك احتمال بأنك حامل؟**

أحياناً، من الجائز لا يظهر نزف طمثي. هذه الحالة يمكن أن تدل على أنك حامل، ولكن مستبعد جداً احتمال حدوث هذا الأمر وذلك إذا تناولت الأقراص حسب الإرشادات. ابديي اللعبة التالية في الموعد المخصص لها. إذا كنت تعتقدين بأن هناك احتمال بأن تكوني حامل (مثلاً، إذا نسيت قرص أو تناولت أدوية أخرى بالتزامن) أو إذا لم يظهر نزف طمثي مرة إضافية، فعليك إجراء فحص بيتي للحمل. إذا كنت حاملاً، توافقى عن تناول مليان وتجهي للطبيب.

اذا كنت ترغبين بالحمل

إذا كنت تخططين للحمل، يوصى باستعمال وسيلة أخرى لمنع الحمل بعد التوقف عن مل bian وحتى تلقي الطمث. يعتمد طببك على تاريخ تلقي الطمث الطبيعي لديك لغرض التكهن بتاريخ الولادة المتوقع. مع ذلك، في حال حدوث الحمل في الحال، فلن يسبب هذا الأمر ضرراً لك أو لرضيعك.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناولين فيها دواء. ضعي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول استعمال هذا الدواء، استشيري الطبيب أو الصيدلي.

الأعراض الجانبية (4)

كما بكل دواء، إن استعمال مليان قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملات. لا تتدهشى من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز  
ألا تعانى أيًّا منها.

**إذا ظهر لديك واحد أو أكثر من الأعراض الجانبية، خاصة إذا كان شديداً أو متواصلاً، أو إذا طرأ تغير على حالتك الصحية الذي تعتقدين بأن له صلة بـ مليلان، بلغى طبيبك عن ذلك.**

هناك خطورة زائدة لحدوث خثرات دموية في الأوردة (جلطة وربيدية [VTE]) أو خثرات دموية في الشرايين (جلطة شريانية [ATE]) لدى كافة النساء اللواتي تتناولن وسائل منع حمل هورمونية مركبة. لتفاصيل إضافية حول المخاطر المختلفة الناجمة عن تناول وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة، انظر إلى البند 2 "قبل استعمال الدواء".

**أعراض جانبية خطيرة - يجب التوجه حالاً إلى الطبيب**

**أعراض جانبية نادرة - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملات من بين 10,000**

- خثرات دموية ضارة في الوريد أو في الشريان، مثلًا:
  - في الرجل أو في القدم (جلطة الأوردة العميقه)
  - في الرئة (انصمام رئوي)
  - نوبة قلبية
  - سكتة دماغية
  - سكتة دماغية خفيفة أو أعراض عابرة تشبه السكتة التي تعرف كنوبة إقفارية عابرة (TIA)
  - خثرات دموية في الكبد، في المعدة/الأمعاء، في الكلى أو في العينين

إن خطورة تطوير خثرة دموية قد تكون أكبر إذا وجد لديك أي عامل آخر الذي يزيد من هذه الخطورة (المعلومات إضافية عن عوامل الخطورة وأعراض الخثرة الدموية، أنظري البند 2).

#### **علامات لتواجد خثرة دموية (أنظري البند 2 "الخثرات الدموية")**

توجهي للطبيب فوراً إذا شعرت بواحد أو أكثر من أعراض الونمة الوعائية التالية: انتفاخ الوجه، اللسان و/أو الحلق و/أو صعوبة في البلع أو شرى (شرى) والتي قد تكون مصحوبة بصعوبات بالتنفس (اطلعي أيضاً على بند "قبل استعمال الدواء").

علامات لرد فعل تحسسي شديد أو لتفاقم وذمة وعائية وراثية:

- انتفاخ اليدين، الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحنجرة. انتفاخ اللسان أو الحنجرة قد يؤدي لصعوبات في البلع والتنفس
- طفح أحمر بارز (شرى) وحكة

علامات لسرطان الثدي تشمل:

- ظهور حفرة في الجلد
- تغيرات في الحلمة
- كتل التي تريها أو تشعر بها

علامات لسرطان عنق الرحم تشمل:

- إفراز مهبلي ذو رائحة و/أو يحوي دم
- نزف مهبلي غير عادي
- آلام في الحوض
- ألم أثناء ممارسة علاقات جنسية

علامات لمشاكل خطيرة في الكبد تشمل:

- ألم شديد في أعلى البطن
- اصفرار الجلد أو العينين (يرقان)
- التهاب الكبد الفيروسي (hepatitis)
- حكة بكامل الجسم

إذا ظهرت لديك إحدى الأعراض التي ذكرت آنفًا، توجهي حالاً إلى الطبيب. من الجائز أن يوصيك بالتوقف عن تناول مiliان.

**أعراض جانبية إضافية، أقل خطورة**

**أعراض جانبية شائعة - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملات من بين 100**

- غثيان
- ألم في البطن
- زيادة وزن الجسم
- صداع
- تغيرات في الحالة النفسية أو مزاج اكتئابي
- ألم أو حساسية في الثديين

**أعراض جانبية غير شائعة - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملات من بين 1,000**

- تقيؤات وفساد المعدة
- احتباس السوائل
- شقيقة
- تناقص الرغبة الجنسية
- تضخم الثديين
- طفح الذي قد يسبب حكة

أعراض جانبية نادرة - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملات من بين 10,000

- عدم تحمل العدسات اللاصقة
- تناقص الوزن
- زيادة الرغبة الجنسية
- إفرازات مهبلية أو إفرازات من الثديين

#### **أعراض جانبية أخرى التي بلغ عنها**

- خلال الأشهر الأولى قد تظهر حالات نزيف بين طمثين (ظهور بقع أو نزف خفيف). يتوقف هذا النزف بين الطمثين عادة بعد أن يتعود جسمك على الاستعمال. في حال كان النزف مستمراً، أصبح شديداً أو متعددًا، راجعي الطبيب (أنظر في البند 4 "ظهور نزف بين طمثين").
- كلف (بقع بنية - صفراء على الجلد). هذه البقع يمكن أن تظهر أيضاً بعد عدة أشهر من استعمال مليان. بالإمكان تقليل حدوث البقع بتجنب التعرض للشمس أو للأشعة فوق البنفسجية (UV).
- حالات طبية التي قد تتفاقم خلال الحمل أو باستعمال سابق للدواء:
  - اصفرار الجلد (يرقان)
  - حكة متواصلة (pruritus)
  - مشاكل في الأداء الوظيفي للكبد أو الكلى
  - حصى في المرارة
  - حالات طبية نادرة مثل ذبابة حمامية جهازية
  - ظهور أو ناقم الاضطراب الحركي المسمى الرقص (chorea)
  - طفح يشبه الحويصلات (herpes gestationis) خلال الحمل
  - صمم وراثي من نوع تصلب الأذن (otosclerosis)
  - داء كرون
  - التهاب القولون التقرحي
  - إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك تعانون من فقر الدم المنجلي
  - مرض وراثي باسم پورفيريما
  - سرطان عنق الرحم

#### **ظهور نزف بين طمثين**

يظهر نزف بين طمثين خفيف أو بقع لدى بعض النساء اللواتي تتناولن مليان، خاصة خلال الأشهر الأولى للعلاج. عادة، ما يزول هذا النزف خلال يوم - يومين ولا حاجة للفحص بسبب ظهوره. استمرري بتناول مليان كالمعتاد. أغلب الاحتمالات أن تزول هذه الظاهرة بعد استعمال عدة علب.

النزف بين طمثين يمكن أن يظهر أيضاً بسبب تناول مليان بشكل غير منتظم، لذلك، احرصي على تناول القرص بنفس الساعة من كل يوم. إضافة لذلك، يمكن أن يظهر النزف بين طمثين نتيجة استعمال أدوية أخرى.

استشيري الطبيب إذا ظهر نزف بين طمثين أو بقع الذي:

- استمر أكثر من عدة أشهر
- بدأ بعد أن تناولت مليان لفترة من الزمن
- استمر حتى بعد أن توقفت عن تناول مليان

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعانين من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك للنموذج المباشر للتบليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

#### **5) كيفية تخزين الدواء؟**

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روية الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسنم. لا تسببي التقوّي بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ انقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

#### **شروط التخزين**

- لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية. يجب الحماية من الضوء.
- لا يجوز رمي الأدوية إلى سلة القمامه. اسأل الصيدلي عن كيفية التصرف مع أدوية لم تعد قيد الاستعمال، بذلك تساعدي في الحفاظ على البيئة.

#### **6) معلومات إضافية**

- يحتوي الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً:  
Lactose monohydrate, sucrose, maize starch, calcium carbonate, talc, macrogol 6000, povidone 25, magnesium stearate, povidone 90, montanglycol wax (wax E).  
يحتوي كل قرص على 37.155 ملغ لكتوز مونوهيدرات، و - 19.66 ملغ سكروز.

#### **كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة**

أقراص مستديرة، بيضاء، مطلية.  
الأقراص متوفّرة ضمن لوحيات (بلسيتر) بعلب ذات 21 قرصاً. تحتوي كل علبة على 1 أو 3 عبوات.  
على ظهر اللوبيحة، كل قرص معلم بيوم من أيام الأسبوع.  
من الجائز لا تسوق كافة أحجام العلب.

- صاحب الامتياز وعنوانه: باير إسرائيل م.ض.، شارع هاحراراش 36، هود هشارون 4527702.
- اسم المنتج وعنوانه: باير آي.جي.، ألمانيا.
- تم تحريرها في حزيران 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.
- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 00 12 29094 109