

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים  
(תכשירים) התשמ"ו – 1986  
התרופה משוקת ללא מרשם רופא

# אקמול<sup>®</sup> טבליות אקמול<sup>®</sup> קפליות

הרכב

כל טבליה/קפליה מכילה:  
פראצטמול 500 מ"ג

(Paracetamol 500 mg)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים בתכשירים ראה סעיף 6 – "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

**תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא והיא מיועדת למבוגרים ולילדים מגיל 6 שנים ומעלה.** עליך ליטול התרופה על פי ההוראות בסעיף 3 בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף.

**יש לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ- 3 ימים או אם התסמינים מחמירים או אינם חולפים תוך 5 ימים למרות השימוש בתרופה.**

## 1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לשיכוך כאבים ולהורדת חום הנגרמים מסיבות שונות, כגון כאבי ראש, כאבי שיניים, הצטננות, שפעת, כאבים שיגרונים (ראומטיים) וכאבי מחזור.

### קבוצה תרפויטית:

משכך כאבים ומוריד חום.

## 2. לפני השימוש בתרופה

### אין להשתמש בתרופה אם:

- ידועה רגישות לפראצטמול או לאחד ממרכיביה האחרים של התרופה.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

- אם פיתחת בעבר תופעות לוואי עוריות כתוצאה מנטילת תכשירים המכילים פראצטמול, אין ליטול תכשירים המכילים פראצטמול, כדי שלא יגרמו שוב תופעות עוריות חמורות.
- התכשיר מכיל פראצטמול העלול לגרום לנזק בכבד כאשר:
  - ניתן במינון גבוה מהמומלץ או לתקופה ממושכת.
  - כאשר בזמן הטיפול שותים משקאות אלכוהוליים.
  - כשנוטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי להיוועץ ברופא.
- אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח למניעת מינון יתר או הרעלה של פראצטמול.
- אין ליטול תרופות נוספות מ-"משפחת אקמול" ו/או תכשירים נוספים המכילים פראצטמול.
- יש להימנע מלקיחת מינון גבוה (בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן צום.

### ספר לרופא לפני התחלת הטיפול אם אתה סובל או סבלת בעבר מ:

- רגישות למזון כלשהו או תרופה כלשהי
- מחלת כבד או ליקוי בתפקוד הכבד
- ליקוי בתפקוד הכליה
- אלכוהוליזם
- צהבת
- אם את בהיריון או מניקה

### תגובות בין תרופתיות

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות נגד קרישת דם, כגון וורפרין.
- תכשירים המזרזים יצור אנזימים בכבד (לדוגמה: ריפמפיצין, ברביטורטים).
- תרופות לאפילפסיה – פניטואין, קרבמזפיין.
- תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים.
- מטוکلופרמיד או דומפרידון (לטיפול בבחילה, הקאה ובעיות עיכול נוספות).
- כלורמפניקול (אנטיביוטיקה).
- פרובנצייד (לטיפול בשגדון).
- כולסטיאמין (להפחתת יתר שומנים בדם).
- פלוקלוקסצילין flucloxacillin (אנטיביוטיקה), עקב סיכון רציני להפרעות בדם ובנזלים (High anion gap metabolic acidosis) אשר מחייבת טיפול דחוף ועולה לקרות במיוחד במקרים של פגיעה כלייתית חמורה, אלח דם (מצב בו חיידקים והרעלים שלהם נמצאים בדם ומובילים לפגיעה באיברים), תת תזונה, אלכוהוליזם כרוני ובמקרים שיש שימוש במינון יומי מקסימלי של פראצטמול.

### שימוש בפראצטמול וצריכת אלכוהול

אין לצרוך אלכוהול בזמן הטיפול בפראצטמול בגלל עלייה בסיכון לנזק לכבד.

### היריון והנקה

#### היריון

אם הינך בהיריון או מניקה יש להיוועץ ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה.

יש ליטול את המנה הנמוכה ביותר היעילה עבורך לשיכוך הכאב ו/או להורדת החום, למשך הזמן הקצר ביותר האפשרי. היוועץ ברופא אם אין הקלה בכאב או בחום או אם את צריכה ליטול את התרופה לעיתים תכופות יותר.

#### הנקה

כמויות קטנות של פראצטמול עוברות לחלב אם. יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.

### נהיגה ושימוש במכוונות

פראצטמול אינו משפיע על היכולת לנהוג או להפעיל מכוונות.

### שימוש בילדים

תרופה זו מיועדת למבוגרים וילידים מעל גיל 6 שנים, ראה סעיף 3.

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות הלוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד.

## 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המקובל בדרך כלל הוא:

### מבוגרים וילדים מגיל 12 שנים ומעלה:

1-2 טבליות/קפליות כל 4-6 שעות לפי הצורך. אין לעבור על מינון של 8 טבליות/קפליות ליממה.

### ילדים בגיל 9-12 שנים:

1-½ טבליה/קפליה כל 4-6 שעות לפי הצורך. אין לעבור על מינון של 4 טבליות/קפליות ביממה (2 גרם ביום).

### ילדים בגיל 6-9 שנים:

½ טבליה/קפליה כל 4-6 שעות לפי הצורך. אין לעבור על מינון של 3 טבליות/קפליות ביממה (1.5 גרם ביום). אין לתת טבליה/קפליה לילדים מתחת לגיל 6 שנים.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

**עליך לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ- 3 ימים או אם התסמינים אינם חולפים תוך 5 ימים למרות השימוש בתרופה.**

### אופן השימוש

אין ללעוס או לכתוש! ניתן לחצות את הטבליות/קפליות בקו החצייה. יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.

**אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,** יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה איתך. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא! גם אם הרגשתך טובה, טיפול מיידי הוא חיוני, בגלל הסיכון להתפתחות נזק חמור לכבד. תופעות לוואי יכולות להיות בחילה והקאה, שלשול, אובדן תאבון, כאבי בטן, נפיחות, הזעה מוגברת, כאב או רגישות בבטן העליונה וייתכן שהן לא משקפות את חומרת הנזק לכבד.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה.** הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

## 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באקמול עלול לגרום לתופעות לוואי כגון סחרחורת, בחלק מהשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות הלוואי עלולות להיות חמורות יותר בקשישים.

### תופעות לוואי חמורות:

**יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מיידי:**

- אם מופיעות תגובות אלרגיות חריפות כגון פריחה וגרד, התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון, הגרון ו/או הגפיים אשר עלולים לגרום לקשיי נשימה או בליעה.
- אם מופיעות במקרים נדירים, מחלות עור חריפות שהסימנים שלהן יכולים להיות: אודם, פריחה, שלפוחיות, פגיעה עורית נרחבת.
- תופעות לוואי עוריות חריפות עלולות להופיע גם אם בעבר נטלת תכשירים המכילים את המרכיב הפעיל פראצטמול ללא בעיה.
- אם מופיעות תופעות לוואי עוריות, יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא באופן מיידי.
- אם מופיעים סימנים של שינויים במערכת הדם כגון: דימומים, הופעת חבורות בקלות, עייפות מתמשכת, התפתחות דלקות ביתר קלות (למשל כאבי גרון) כתוצאה מירידה חמורה במספר תאי הדם הלבנים.
- אם מופיע קוצר נשימה (נדיר).
- אם מופיעות בעיות נשימה. יותר סביר שיקרו אם חוותי בעבר בעיות נשימה בעת נטילת משככי כאבים אחרים כגון איבופרופן ואספירין.
- אם מופיעים בחילות, ירידה פתאומית במשקל, אובדן תיאבון והצהבה של העיניים והעור.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

**יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל- 25°C.**

## 6. מידע נוסף

### נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

#### אקמול טבליות:

Pregelatinized starch, povidone, stearic acid.

#### אקמול קפליות:

Pregelatinized starch, povidone, stearic acid, hydroxypropyl methylcellulose, polyethylene glycol.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

#### אקמול טבליות:

טבליה עגולה בצבע לבן-קדם עם קו חצייה בצדה האחד.

אקמול טבליות באריזה בליסטר (מגשית) מכילה 20 טבליות.

#### אקמול קפליות:

טבליה מוארכת בצבע לבן-קדם עם קו חצייה בצדה האחד.

אקמול קפליות באריזה בליסטר (מגשית) מכילה 7, 10, 14, 16, 20, 21, 42 קפליות.

אקמול קפליות בבקבוק מכילה 16, 50 קפליות.

ייתכן שלא כל גודלי האריזה משווקים.

#### שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו:

טבע ישראל בע"מ  
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב  
6944020

עלון זה נערך בנובמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

**אקמול טבליות:** אקמול קפליות:

020.16.20534.00 128.74.25337.08

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

**teva**

ACAM TAB CAPL PL SH 281123

322K00180-02