

אקמול® קפלויות

הרכב

כל קפליה מכילה:

פראצטמול 500 מ"ג (Paracetamol 500 mg)

למידע על המרכיבים הבחתי פעילים בתכשיר ראה סעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטום שתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו (בשיוק כללי) ניתנת ללא צורך במרשם רופא והיא מיועדת למבוגרים ולילדים מגיל 12 שנים ומעלה.
עליך לסיטול את התרופה על פי ההוראות בסעיף 3 בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף.

יש לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ- 3 ימים או אם התסמינים מחמירים או אינם חולפים תוך 5 ימים למרות השימוש בתרופה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לשיכוך כאבים ולהורדת חום הגורמים מסיבות שונות, כגון: כאבי ראש, כאבי שיניים, הצטננות, שפעת, כאבים שיגורניים (ראומטיים) וכאבי מחזור.

קבוצה תרופיית:

משכך כאבים ומוריד חום.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- ידועה רגישות לפראצטמול או לאחד ממרכיביה האחרים של התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אם פיתחת בעבר תופעות לוואי עוריות כתוצאה מנטילת תכשירים המכילים פראצטמול, אין לסיטול תכשירים המכילים פראצטמול, כדי שלא יגרמו שוב לתופעות עוריות חמורות.
- התכשיר מכיל פראצטמול העלול לגרום לזקב כבד כאשר:
 - ייתן במינון גבוה מהמומלץ או לתקופה ממושכת.
 - בזמן הטיפול שותים משקאות אלכוהוליים.
 - נוטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי היוועץ ברופא.
- אין לסיטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח, למניעת מינון יתר או הרעלה של פראצטמול.
- אין לסיטול תרופות נוספות מ"משפחת אקמול" /ואו תכשירים נוספים המכילים פראצטמול.
- יש להימנע מלקיחת מינון גבוה (בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן צום.

ספר לרופא לפני התחלת הטיפול אם אתה סובל או סבלת בעבר מ:

- רגישות למוזן כלשהו או לתרופה כלשהי.
- מחלת כבד או ליקוי בתפקוד הכבד.
- ליקוי בתפקוד הכליה.
- אלכוהוליזם.
- צהבת.
- אם את בהיריון או מניקה.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ונטופסי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות נגד קרישת דם, כגון וורפרין.
- תכשירים המזרימים צור אנזימים כבד (לדוגמה: ריפמפיצין, ברביטורט).
- תרופות לאיפילסיה – פניטואין, קרבמפין.
- תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים.
- מוטקלופראמיד או דומפרידון (לטיפול בבחילה, הקאה ובעיות עיכול נוספות).
- כלורמפניקול (אנטיביוטיקה).
- פונבנדי (לטיפול בשיגרון).
- כולסטיאמינ (להפחתת יתר שומנים בדם).
- פלוקלוקסצילין flucloxacillin (אנטיביוטיקה), עקב סיכון רציני להפרעות בדם ובנזלים (High anion gap metabolic acidosis) אשר מחייבת טיפול חادף ועלולה לקרות במיוחד במקרים של פגיעה כליתית חמורה, אל דם (מצב בו חיידקים והרעלים שלהם נמצאים בדם ומובילים לפגיעה באיברים), תת תזונה, אלכוהולים כרוני ובמקרים שיש שימוש במינון יומי מקסימלי של פראצטמול.

שימוש בפראצטמול וצריכת אלכוהול

אין לצרוך אלכוהול בזמן הטיפול בפראצטמול בגלל עלייה בסיכון לזקב כבד.

היריון והנקה

אם הינך בהיריון או מניקה יש היוועץ ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה.

היריון

יש לסיטול את המנה הנמוכה ביותר היעילה עבורך לשיכוך הכאב /או להורדת החום, למשך הזמן הקצר ביותר האפשרי. היוועץ ברופא אם אין הקלה בכאב או בחום או אם את צריכה לסיטול את התרופה לעיתים תכופות יותר.

הנקה

מחיות קטנות של פראצטמול עוברות לחלב אם. יש היוועץ ברופא לפני השימוש.

היגיה ושימוש במכונות

פראצטמול אינו משפיע על היכולת לנהוג או להפעיל מכונות.

שימוש בילדים

תרופה זו, בשיוק כלי, מיועדת למבוגרים וילדים מגיל 12 שנים ומעלה. על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות הלוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

בהעדף הוראה אחרת מרופא, המינון המקובל בדרך כלל הוא:

מבוגרים וילדים מגיל 12 שנים ומעלה:

1-2 קפלויות כל 4-6 שעות לפי הצורך.

אין לעבור על מינון של 8 קפלויות ליממה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

עליך לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ- 3 ימים או אם התסמינים מחמירים או אינם חולפים תוך 5 ימים, למרות השימוש בתרופה.

אופן השימוש

אין ללעוס או לכתוש!

ניתן לחצות את הקפלויות בקו החצייה.

יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.

אם נטלת מנת יתר או אם טבעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לרופא או לאחד מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה איתך. אל תגרום לתרופה ללא הוראה מפורשת מהרופא! גם אם הרגשת טובה, טיפול מיידי הוא חיוני, בגלל הסיכון להתפתחות זקב חמור לכבד. תופעות לוואי למינון יתר יכולות להיות: בחילה והקאה, שלשול, אובדן תאבון, כאבי בטן, נפיחות, הזעה מוגברת, כאב או רגישות בבטן העליונה וייתכן שהן לא משקפות את חומרת הנזק לכבד.

אין לסיטול תרופות בחושה! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באקמול עלול לגרום לתופעות לוואי כגון סחרחורת, בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. תופעות הלוואי עלולות להיות חמורות יותר בקשישים.

תופעות לוואי חמורות:

יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מיד:

- אם מופיעות תגובות אלרגיות חריפות כגון פריחה וגרד, התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון, הגרון /ואו הגפיים אשר עלולים לגרום לקשיי נשימה או בליעה.
- אם מופיעות במקרים נדירים, מחלות עור חריפות שהסימנים שלהן יכולים להיות: אודם, פריחה, שלפוחיות, פגיעה עורית נרחבת.
- תופעות לוואי עוריות חריפות עלולות להופיע גם אם בעבר נטלת תכשירים המכילים את המרכיב הפעיל פראצטמול ללא בעיה.
- אם מופיעות תופעות לוואי עוריות, יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא באופן מיידי.
- אם מופיעים סימנים של שניוים במערכת הדם, כגון: דימומים, הופעת חבורות בקלות, עייפות מתמשכת, התפתחות דלקות ביתר קלות (למשל כאבי גרון) כתוצאה מירידה חמורה במספר תאי הדם הלבנים.
- אם מופיע קוצר נשימה (נדיר).
- אם מופיעות בעיות נשימה. יותר סביר שיקרו אם חווית בעבר בעיות נשימה בעת נטילת משככי כאבים אחרים כגון איבופרופן ואספירין.
- אם מופיעים בחילות, ירידה פתאומית במשקל, אובדן תיאבון והצהבה של העיניים והעור.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או אם הינך סובל מתופעות לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דייווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דייווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לידים ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל- 25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Pregelatinized starch, povidone, stearic acid, hydroxypropyl methylcellulose, polyethylene glycol.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליה מוארכת בצבע לבן-קצרים עם קו חצייה בצדה האחד. הקפלויות ארוכות באריות בליסטר (מגשית) המכילה 14 קפלויות או באריות קבוק המכילה 16 קפלויות.

שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו:

טבע ישראל בע"מ, רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

עלון זה נערך בנובמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 128.74.25337.08

לשם הפשטות ולהקלת ההקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

teva

ACAM CAPL GSL PL SH 281123