

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

ריבר טבע 10 מ"ג טבליות מצופות

כל טבליה מצופה מכילה:

(ריבראוקסבן 10 מ"ג (Rivaroxaban 10 mg)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרה בעיון את **העלון עד סופו** בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

כרטיס מידע בטיחותי למטופל
בנוסף לעיון, לתכשיר ריבר טבע 10 מ"ג קיימים כרטיסים מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע חשוב שעלייך לדעת לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בריבר טבע 10 מ"ג ולפעול על פיו.
יש לעיין בכרטיס מידע בטיחותי למטופל ובעלון לצריכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר.
יש לשמור את הכרטיס והעלון לעיון נוסף במידת הצורך.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1) **למה מיועדת התרופה?**

ריבר טבע 10 מ"ג מיועד ל:

- מניעת היוצרות קריישי דם בוורידים, במובגרים לאחר ניתוח אלקטיבי להחלפת ירך או בר.
 - מניעת חזרה של קריישי דם בוורידי הרגליים (פקקת ורידים عمוקים) ובכלי הדם של הריאות (תסחיף ריאתי) במובגרים, לאחר השלמת 6 חודשים 10 מ"ג ש"יר לטיפול לפקקת ורידים عمוקים או לתסחיף ריאתי קודם.
- קובוצה רפואייתית:** ריבר טבע 10 מ"ג ש"יר לקבוצת תרופות הנקראט נוגדי קריישה ופועל על-ידי הקטנת הנטייה לייצור קריישי דם וזאת על-ידי חסימת גורם המעורב בתהליכי הקרישה (פקטור 10a (Xa)).

2) **לפני השימוש בתרופה**

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לריבראוקסבן או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף").
- אתה סובל מדימום מוגבר.
- יש לך מחלת או מצב באיבר בגוף שмагבירים את הסיכון לדימום רציני (כגון: כיב קיבה, חבלה או דימום במוח, ניתוח במוח או בעיניים שהתרחש לאחרונה).
- אתה נוטל תרופות למניעת קריישת דם (כגון: אורפרין, דביגטראן, אפיקסבן או הפרין), מלבד במקרים של מעבר מטיפול בגין קריישה אחד לשני או כאשר אתה מקבל הפרין דרך צנתר ורידי או עורקי כדי להשאירו פתוח.
- אתה סובל ממליחת כבד הגורמת לעלייה בסיכון לדימום.
- את בהריון או מניקה.

אל טיפול ריבר טבע 10 מ"גosoף לרופא שלך אם אחד מהמצבי המתוארים מעלה חל עלייך.

- ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**
שוחח עם הרופא או הרוקח לפני נטילת ריבר טבע 10 מ"ג.
נדרשת זהירות מיוחדת בשימוש בריבר טבע 10 מ"ג, לפני הטיפול בריבר טבע 10 מ"ג, ספר לרופא:
- אם אתה בסיכון גבוה לדימום כפי שניתן להיות באחד מהמצבים הבאים:
 - מחלת כליה בדרגהBINONIIT או חמורה, לאחר שתפקיד הכליות עלול להשפיע על כמות התרופה הפועלת בגוף.
 - אתה נוטל תרופות אחרות למניעת קריישי דם (כגון: אරפרין, דיביגטראן, אפיקסבאן או הפרין), כאשר אתה עבר מנגד קריישה אחד לשנהו או כאשר אתה מקבל הפרין דרך צנתר ורידי או עורקי כדי להשתairo פתוח (ראה בהמשך סעיף 2 - "תగובות בין-תרופתיות").
 - הפרעות דימום.
 - לחץ דם גבוה מאוד שאינו מצוי באמצעות טיפול תרופתי.
 - מחלת בקיבה או בעוריה העוללה לגרום לדימום, כגון: דלקת המעיים או הקיבה, או דלקת بواسטן כתוצאה, למשל מחלת החזר וشت-קיבתי (מחלה בה חומצה מהקיבה עולה לושט) או גידולים הממוקמים בקיבה או בעוריהם או באיברי המין או בדרכי השתן.
 - בעיות בכלי הדם של רשותה העין (רטינופתיה).
 - מחלת ריאות בה הסימפטונות מורחבים ומלאים בהפרשות מוגלתיות (ברונכייאקטזיס) או דימום קודם מהריאה.
 - אם יש לך מסתם לב מלאכותי.
 - אם ידוע לך כי אתה סובל ממחלת בשם מסמנת אנטיפוסופוליפידית (הפרעה במערכת החיסון אשר גורמת לסיכון מוגבר לקריישי דם), ספר לרופא שלך והוא יחליט האם יש לשנות את הטיפול.
 - אם הרופא קבע שלחץ הדם שלך אינו יציב או שמתוכנן בעבורך טיפול ניתוחי או אחר להסרת קרייש הדם מהריאות.
- במידה ואחד מהמצבים הנזכרים לעיל חל עלייר ספר לרופא לפני נטילת התרופה. הרופא יחליט אם יש לטפל בך בריבר טבע 10 מ"ג ואם אתה זקוק למעקב צמוד.

- במידה והרופא יחשב שאתה נמצא בסיכון מוגבר לפתח כיב קיבה או מעי, יתכן שתיתן לך גם טיפול למניעתו.

- אם אתה צריך לעבור ניתוח**
- חשוב ביותר ליטול ריבר טבע 10 מ"ג לפני ואחרי ניתוח בדיקת זמן שקבע לך הרופא.
 - אם צנתר או זריקה תוך-שידרתית (כגון לאலוחש אפיידורי או לשיכור CAB) מעורבים בניתוח שלך:
 - חשוב ביותר ליטול ריבר טבע 10 מ"ג בדיקת זמן שקבע לך הרופא.
 - פנה מיד לרופא המתפל אם אתה סובל מחוסר תחושה או מחולשה ברגלים או מביעות בעור או בשלפוחית השתן לאחר התפוגגות האלוחש, מאחר שיש צורך בהתערבות רפואית דחופה.

ילדים ומתבגרים
התרופה אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.
אין מספיק מידע על השימוש ילדים ובמתבגרים.

- תגובות בין-תרופתיות**
אם אתה לוקח, או אם לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עלך לרופא או לרוקח. במיחוד אם אתה לוקח:
- תרופות מסוימות נגד זיהומיים פטרייתיים (כגון: פלוקונאזול, איטראקונאזול, וויריקונאזול, פוסאקוונאזול) פרט לאלו שימושיות רק למירהה על העור.
 - טבליות המכילות קטוקונאזול לטיפול בתסמונת קושינג - מצב בו הגוף מייצר עודף של קורטיזול.
 - תרופות מסוימות לטיפול בזכיהומיים חידקיים (כגון: קלאריתרומיצין, אריתרומיצין).
 - תרופות אנטיביוטיות מסוימות לטיפול בזכיהומיים של נגיף הכלול החיסוני האנושי (VH)/מחלת האידיוט (ריטונאביר).
 - תרופות נגדות קריישה אחרות (כגון: אנטקפארין, קלופידוגרל או אנטוגוניסטים לוויטמין K כגון ארפרין ואצנו-קומרול).
 - תרופות נגדות דלקת ומשכחות כאב (כגון: נפרוקסן או חומצה אצטילסיליצילית [אספרין]).
 - דרונדרון, תרופה לטיפול בדיכאון (מעכבים סלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטוניין [SSRI] או מעכבים של ספיגה חוזרת של סרוטוניין ונורא芬יפרין [SNRI]).
- במידה ואחד מהמצבים הנזכרים לעיל חל עלייר ספר לרופא לפני נטילת התרופה, כיוון שתרופות אלו עלולות לגרום

להגברת ההשפעה של ריבר טבע 10 מ"ג. הרופא שיל'ר יחליט האם לטפל בר עם ריבר טבע 10 מ"ג והאם יש צורך בהשגהה רפואית צמודה.

כמו כן, יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות מסויימות לטיפול בכפיון (אפיילפסיה) (כגון: פנטואין, קארבאמאזפין, פנובארביטאל).
- התכשיר הצימי לטיפול בדיכאון סנט. ג'ונס וורט (St. John's wort, היפריקום).
- ריפאמפיצין (אנטיבוטיקה).

במידה ואחד מהמצבים הנזכרים לעיל חל עלי' ספר לרופא לפני נטילת התרופה, כיוון שתרופות אלו עלולות לגרום להשפעה מופחתת של ריבר טבע 10 מ"ג. הרופא שיל'ר יחליט האם לטפל בר עם ריבר טבע 10 מ"ג והאם יש צורך בהשגהה רפואית צמודה.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול ריבר טבע 10 מ"ג עם או ללא מזון.

הירון, הנקה ופוריות

אל תיטלי ריבר טבע 10 מ"ג אם אתה בהירון או מניקה.
אם יש סיכוי שתיכנסו להירון, עליך להשתמש באמצעי מנעה אמין בזמן נטילת ריבר טבע 10 מ"ג.
אם נכנסת להירון במהלך נטילת התרופה, פנו מיד לרופא, אשר יחליט לגבי המשך הטיפול.

ניגזה ושימוש במכונות

ריבר טבע 10 מ"ג עשוי לגרום לשחרחות (תוਪעת לוואי שכיחה) או לעילפון (תוֹפָעַת לוּוֵאי שְׁכִיחָה) (ראה סעיף 4 - "תוֹפָעַת לוּוֵאי"). אין לנוהג, לרכיב על אופניים, להשתמש בכלים או להפעיל מכונות בזמן השימוש בריבר טבע 10 מ"ג. במידה ואתה מושפע מתסמים אלו.

מיעד חשוב על חלק המרכיבים של התרופה

התרופה מכילה לקتوز ונתרן.
אם נאמר לך על-ידי הרופא שיש לך אי-סיבות לסתורים מסוימים, פנה לרופא לפני שאתה מתחיל ליטול ריבר טבע 10 מ"ג. התרופה מכילה פחות מ-1 מילימול נתן (23 מ"ג) בכל TABLET וועל כן נחשבת במהותה "נטולת נתן".

(3) כיצד משתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בעווע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

- המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.
- למניעת היוצרות קריש דם בוורידים לאחר ניתוח להחלפת ירך או ברק, המינון המקבול בדרך כלל הוא: TABLET אחת של ריבר טבע 10 מ"ג פעם ביום.
- יש ליטול את הTABLET הראשונה 6-10 שעות לאחר הניתוח במידה והרופא קבע כי מצבך יציב. לאחר מכן יש ליטול TABLET אחת כל יום עד שהרופא המטפל יורה לך להפסיק.
- למניעת חזרה של קריש דם בווריד הרגליים (פקקת ורידים عمוקים) ובכל הדם של הריאות (טסחיף ריאתי) לאחר השלמת 6 חודשים טיפול לפקקת ורידים عمוקים או לטסחיף ריאתי קודם, המינון המקבול בדרך כלל הוא: TABLET אחת של ריבר טבע 10 מ"ג פעם ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול

- בניתוח החלפת מפרק הירך,משך הטיפול בדרך כלל הינו 5 שבועות.
- בניתוח החלפת מפרק הברך,משך הטיפול בדרך כלל הינו שבועיים.
- למניעת חזרה של קריש דם בווריד הרגליים (פקקת ורידים عمוקים) ובכל הדם של הריאות (טסחיף ריאתי) לאחר השלמת 6 חודשים טיפול לפקקת ורידים عمוקים או לטסחיף ריאתי קודם,משך הטיפול יקבע על-ידי הרופא.

צורת הנטילה

יש לבולע את התרופה עדיף עם מים.

נטילת התרופה באותו זמן בכל יום, תסיע לך לזכור את נטילתה.

במידה וקשה לך לבולע את הטבלייה בשלמותה, דבר עם הרופא שלך על דרכי אחרות ליטול ריבר טבע 10 מ"ג. ניתן לרשך

את הטבלייה ולערוב עם מים או מיחית תפוחים, מיד לפני נטילתה.

במידת הצורך, הרופא שלך יתן לך ריבר טבע 10 מ"ג מרוסק דרך צינור הזרנה לקיבה.

אין מידע לגבי ח齊ה/עליסה.

אם נטילת בטעות מינון גבוהה יותר עלייך לפנות מיד לרופא המטפל. נטילת ריבר טבע 10 מ"ג יתר על המידה מגבירה את הסיכון לדימום.

אם נטילת מנת יתר או אם בטעות בלבד מלבד מנטילת התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש יש ליטול מנה מיד כשנזכרת. את הטבלייה הבאה יש ליטול ביום לאחרת ולהמשיך בטיפול כרגע. בשום אופן אין ליטול מנה כפול!

יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה לפני השלמת הטיפול ללא התיעצות עם הרופא מכיוון שריבר טבע 10 מ"ג מונע התפתחות של מצב מסוכן.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעע** שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, **הייעוץ ברופא או ברוקח.**

(4) תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בריבר טבע 10 מ"ג עשוי לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רישימת תופעות הלואוי. **יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.**

כמו תרופות להפחחת היוציארות קריישי דם דומות אחרות, ריבר טבע 10 מ"ג עשוי לגרום לדימום העולול לסיכון חיים. דימום חזק עשוי לגרום לירידה פתאומית בלחץ הדם (שוק). בחלק מהמקרים הדימום עלול להיות סמי.

יש לפנות מיד לרופא אם אתה סובל מאותת מטופעות הלואוי הבאות:
סימנים לדימום:

- דימום מוחי או תוך-גולגולתי (תסמינים יכולים לכלול כאב ראש, חולשה באחד, הקאה, פרכויס, ירידת ברמת ההכרה ונוקשות במצוואר. זהו מצב חירום רפואי חמור, יש לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי!).

- דימום ממושך או מוגבר.

- חולשה יצאת דופן, עייפות, חיוורון, סחרחות, כאב ראש, נפיחות בלתי מוסברת, קוצר נשימה, כאב בחזה או תעוקת חזזה (אנגינה פקטורייס).

הרופא שלך יחילט האם דרישה השגחה צמודה או דרוש שינוי בטיפול.

סימנים לתגובה עורית חמורה:

- פריחה אינטנסיבית מתפשטת על העור, שלפוחיות או פצעים ברקמה רירית, למשל בפה או בעיניים (-Stevens Johnson syndrome/ Toxic Epidermal Necrolysis).

- תגובה לתרופה הגורמת לפריהה, לחום, לדלקת של איברים פנימיים, לחorigותם ולחוליות מערכתי (תסמונת DRESS).

התדריות של תופעות לוואי אלו הינה נדירה מאוד (עד משתמש אחד מתוך 10,000 משתמשים).

סימנים לתגובה אלרגית חמורה:

- התנפחות הפנים, השפטים, הפה, הלשון או הגרון; קשיי בילעה; סרפדת וקשיי נשימה; צניחה פתאומית של לחץ הדם.

התדריות של תגובות אלרגיות חמורות הין נדירות מאוד (תגובהות אנafilktיות, כולל שוק אנafilktiy; עלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 10,000 משתמשים) או אין שכיחות (אנגיאודמה ובזקת אלרגית; עלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 100 משתמשים).

תופעות לוואי נספנות

תופעות לוואי שכיחות (Common) (תופעות שלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 10 משתמשים):

- ירידה בתאי דם אדומים העלולה לגורם לחווורן, לחולשה או לקוצר נשימה
- דימום בקיבה או במעי, דימום באיברי המין והשתן (כולל דם בשתן ודימום וסת' מוגבר), דימום מהאף, דימום בחניכיים
- דימום לתוך העין (כולל דימום מלובן העין)
- דימום לתוך רקמה או חלל בגוף (שוף דם פנימי מקומי, חבלה)
- שיעול דמי
- דימום מהעור או מתחת לעור
- דימום לאחר ניתוח
- דליפה של דם או נזול מפצע ניתוחי
- נפיחות בגפיים
- כאב בגפיים
- תפקוד לקיי של הכליות (יכול להתגלוות בבדיקות המבוצעות על-ידי הרופא)
- חום
- כאב בטן, קשיי עיכול, בחילה או הקאה, עצירות, שלשול
- לחץ דם נמוך (טסמים נקיים להיות סחרחות או עילפון כאשר אתה נעמד)
- ירידה כללית בכוח ובאנרגיה (חולשה, עייפות), כאב ראש, סחרחות
- פריחה, גרד בעור
- בדיקות דם יכולות להציג עלייה באנזימי כבד מסוימים

תופעות לוואי שאינן שכיחות (Uncommon) (תופעות שלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 100 משתמשים):

- דימום תוך-מוחי או תוך-גולגולתי (ראיה למעלה, "סימנים לדימום")
- דימום לתוך מפרק הגוף לכאב ולנפיחות
- טרומבויציטופניה (מספר נמוך של טסיות דם, שהן תאים שימושיים לקרישת הדם)
- תגבות אלרגיות, כולל תגבות אלרגיות בעור
- תפקוד לקיי של הכבד (יכול להתגלוות בבדיקות המבוצעות על-ידי הרופא)
- בדיקות דם יכולות להציג עלייה בבילירובין, באנזימים מסוימים של הלבלב או של הכבד או במספר הטסיות עילפון
- תחושא כללית לא טובה
- דופק מואץ
- יובש בפה
- סרפדת (אורטיקרייה)

תופעות לוואי נדירות (Rare) (תופעות שלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 1,000 משתמשים):

- דימום לתוך שריר
- כולסטאזיס (זרימה מופחתת של מריה), דלקת הכבד (הפאטיטיס) כולל פגיעה בתאי הכבד (כבד דלקתי כולל פגעה כבדית)
- הצהבהה של העור והעיניים (צהבת)
- נפיחות לאומיות
- שוף דם פנימי מקומי (המטומה) במפשעה כתוצאה מסיבוך של הליך לבבי בו מוכנס צנתר לעורק ברגאל

תופעות לוואי נדירות מאוד (Very Rare) (תופעות שלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 10,000 משתמשים):

- הצלברות של אוזינופילים, סוג של תא דם לבנים גראנוולוציטיים הגורמים לדלקת בריאות (דלקת ריאות אוזינופילית)
- תופעות לוואי שכיחות אין יהודה (לא ניתן להעריך את השכיחות מהמידע הזמין):**
- כשל כליתי לאחר דימום חמור
- דימום בכלליה לפעמים עם נוכחות של דם בשtan המוביל לחוסר יכולת של הכליות לעבוד כראוי (נפרופתיה הקשורה לנוגדי קרישה)

- לחץ מוגבר בשדררי הרגליים או הזרועות לאחר דימום, הגורם לכאב, לנפיחות, לשינוי תחושה, לחוסר תחושה או לשיתוק (תסמנות מדור לאחר דימום)

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת או כאשר אתה סובל מהתופעת לוואי שלא צינה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לואן

ניתן לדוח על תופעות לואן למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לואן עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לואן, או על-ID' כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5) איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוח ראייתם של ילדים / או תינוקות ועל-ידי קר תמנע הרעלת. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזקה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן במקום יש בטמפרטורה מתחת ל-25°C.
- טבליות מרוסקות יציבות במים או במחית תפוחים עד 4 שעות.

אין להשליך תרופות למי ביוב או לאשפה הביתה. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

6) מידע נוסף

נוסך על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, croscarmellose sodium, hypromellose, sodium lauryl sulfate, polyvinyl alcohol (part. hydrolyzed), titanium dioxide, magnesium stearate, macrogol, talc, carmine, iron oxide yellow, iron oxide red.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האזקה:

טבליה מצופפת עגולה בצלב ורוד, בצד אחד של הטבליה מוטבע "T" ובצד השני מוטבע "R".
הטבליות מגיימות בмагשיות (בליסטרים) באריזות של 28, 30, 56 או 60 טבליות.
תוכן שלא כל גגלי האזקה משוקקים.

שם בעל הרישום והיצרן וכתובתו:

טבע ישראל בע"מ,
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

העלון נערך בינואר 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

168-08-36158

לשם הפשטות ולהקלת הקיריה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.