

# كالترام™ 200 ملغ أقراص

أقراص مطالية

المواد الفعالة وكميتها:

يحتوي كل قرص على المواد الفعالة التالية:

لوبينافير (lopinavir) 200 ملغ وريتونافير (ritonavir) 50 ملغ.

أنظر "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" في الفقرة 2.6.

لقائمة المركبات غير الفعالة: أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" في هذه النشرة.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك / من أجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك / حالتهم مشابهة لحالتك.

الدواء مخصص للكبار.

ما هي المعلومات الأكثر أهمية التي يتوجب على معرفتها حول كالترام؟

كالترام قد يسبب ظهور أعراض جانبية خطيرة، تشمل:

- تفاعلات مع أدوية أخرى. من المهم معرفة أي من الأدوية ممنوعتناولها سوية مع كالترام.

لمعلومات إضافية، انظر فقرة 2.1 "لا يجوز إستعمال كالترام إذا كنت تعالج بنفس الوقت بـ".

- إلتهاب البنكرياس. قد يؤدي كالترام إلى إلتهاب في البنكرياس، الذي قد يكون خطيراً ويسبب الوفاة. إن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في شحوم معينة في الدم (الشحوم الثلاثية) معرضون لخطورة أن يتطور لديهم إلتهاباً في البنكرياس. إذا وُجد لديك مرض HIV-1 متقدم، فمن الجائز أن تكون معرضاً لخطورة زائدة لإرتفاع الشحوم الثلاثية في الدم وإلتهاب البنكرياس. إذا عانيت في الماضي من إلتهاب في البنكرياس، فقد يزداد الإحتمال لديك للإصابة بإلتهاب البنكرياس ثانية خلال فترة العلاج بـ كالترام.

احذر طبيبك فيما إذا وُجدت لديك علامات أو أعراض لإلتهاب البنكرياس بما في ذلك:

- غثيان
- تقيؤات
- ألم في منطقة المعدة (ألم في البطن)

- مشاكل في الكبد. مشاكل في الكبد، بما في ذلك الوفاة، قد تحدث لدى المعالجين الذين يتناولون كالترام.

سوف يجري طبيبك فحوص دم قبل وخلال فترة العلاج بـ كالترام من أجل فحص وظائف كبدك. إذا وُجد لديك إلتهاب الكبد B أو إلتهاب الكبد C، أو مشاكل أخرى في الكبد، فقد تكون معرضاً لخطورة أكبر لأن تتطور لديك مشاكل جديدة أو تفاقم لمشاكلك الحالية في الكبد، خلال فترة تناول كالترام. يجب إبلاغ الطبيب فوراً إذا وُجدت لديك إحدى العلامات والأعراض التالية للمشاكل في الكبد بما في ذلك:

- فقدان الشهية للطعام

- إصفرار الجلد وإصفرار بياض العينين (يرقان)

- بول داكن

- براز فاتح اللون

- حكة في الجلد

- ألم في منطقة المعدة (ألم في البطن)

- تغيرات بنظام القلب والنشاط الكهربائي للقلب. قد تظهر هذه التغيرات في فحص التخطيط الكهربائي للقلب (electrocardiogram) ويمكن أن تؤدي لحدوث مشاكل خطيرة في القلب. إن خطورة المعاناة من هذه المشاكل قد تكون أكبر إذا:

◦ عانيت في الماضي من عدم انتظام نظم القلب أو من أمراض معينة في القلب

◦ كنت تتناول أدوية أخرى التي قد تؤثر على نظم قلبك، أثناء علاجك بـ كالترام

احذر طبيبك في الحال إذا كنت تعاني من الأعراض التالية:

- دوار

- الشعور بإغماء

- إغماء

- الشعور بضربات قلب غير منتظمة

لمعلومات إضافية حول الأعراض الجانبية الخطيرة، انظر فقرة "الأعراض الجانبية".

## 1) لأى غرض مخصوص الدواء؟

كالترام مخصص بمشاركة مستحضرات أخرى مضادة للفيروسات الرجعية، لعلاج التلوث بفيروس الـ HIV.

HIV هو الفيروس المسبب للإيدز (متلازمة فشل المناعة المكتسبة - AIDS).

الفصيلة العلاجية: لوبينافير، ريتونافير - من مثبطات الإنزيم HIV بروتياز.

## 2) قبل إستعمال الدواء

### 2.1 لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الergicي) للمواد الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (لقائمة المركبات غير الفعالة، انظر الفقرة 6 في النشرة).

- لا يجوز إستعمال كالترام إذا كنت تعالج بنفس الوقت بـ:

- ألفوزوسين (alfuzosin) - لعلاج الأعراض المتعلقة بتضخم البروستات الحميد لدى الرجال

- أپالوتاميد (apalutamide) - دواء لعلاج السرطان

- سيساپرید (cisapride) - للتحفيز من مشاكل معينة في المعدة

- كولتشيسين (colchicine) - لعلاج التهاب التقوس، لدى مرضى يعانون من مشاكل في الكلى أو في الكبد لأن تتطور لديك مشاكل في الكبد أو تفاقم لمشاكلك الحالية في الكبد، خلال فترة تناول كالترام. يجب إبلاغ الطبيب فوراً إذا وُجدت لديك إحدى العلامات والأعراض التالية للمشاكل في الكبد بما في ذلك:

- ديهيدرو إرچونونيل ميسيلات (dihydroergotamine mesylate)

- ميتيل إرچونونيل (methylergonovine)

- لوفاستاتين (lovastatin) - لخفض الكوليسترول في الدم

- ميدازولام الذي يتم تناوله عن طريق الفم (midazolam) - للنوم و/أو للتهدئة

- لوراسيdone (lurasidone) - لعلاج مرض الفصام

- بيموزيد (pimozide) - لعلاج مرض الفصام

- رانولازين (ranolazine) - لعلاج الذبحة الصدرية المزمنة

- ريفامپيسين (rifampicin) - لعلاج السل

- ريفامپين (rifampin) - مضاد للبكتيريا

- سيلدينافيل (sildenafil) - عندما يعطيك لفترة ضغط الدم الشريان الرئوي

- سيمفاستاتين (simvastatin) - لخفض الكوليسترول في الدم

- لوميتاپيد (lomitapide) - لخفض هيبيريكوم بروفوراتوم (Hypericum perforatum, St. John's wort)

- تريازولام (triazolam) - لعلاج اضطرابات النوم و/أو لتهدئة القلق

- قد تحدث مشاكل خطيرة في حال تناولك أو تناول طفلك إحدى الأدوية المذكورة أعلاه مع كالترام.

### 2.2 تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل الإستعمال وخلال فترة العلاج بالدواء كالترام، احذر للطبيب إذا:

- وُجدت لديك مشاكل في القلب أياً كانت، بما في ذلك مشكلة تسمى إطالة خلقية لمقطع QT

- وُجدت لديك أو كانت لديك في الماضي مشاكل في البنكرياس

- وُجدت لديك مشاكل في الكبد بما في ذلك إلتهاب الكبد الفيروسي من نوع B أو C

- وُجد لديك داء السكري

- وُجد لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم

- وُجد لديك مرض الناعور من شأن كالترام أن يؤدي إلى زيادة الأنزفة

- وُجدت لديك نسبة منخفضة من البوتاسيوم (Potassium) في الدم

- كنت حاملاً أو تخططين للحمل. أنتري المعلومات في الفقرة 2.5 "الحمل الإرضاخ والخصوبة"

- كنت مرضعة أو تخططين للإرضاخ. أنتري المعلومات في الفقرة 2.5 "الحمل الإرضاخ والخصوبة"

### 2.3 التداخلات / التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احذر للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. هناك تداخل دوائي بين كالترام والعديد من الأدوية.

• احتفظ بقائمة لكافة الأدوية الخاصة بك لتستطيع أن تريها للطبيب والصيدلي.

- يمكن أن تطلب من طبيبك أو من الصيدلي قائمة الأدوية التي تتناولها مع كالترام.

- لا تبدأ بتناول دواء جديد دون إعلام الصيدلي أو طبيبك. بإمكان طبيبك أن يبلغك فيما إذا كان تناول كالترام مع الأدوية الأخرى آمناً. من الجائز أن يضطر طبيبك لتغيير مقدار الدوائة للأدوية الأخرى أثناء تناولك لـ كالترام.

- لا يجوز تناول كالترام بمقدار دوائي ذو مرة واحدة في اليوم، إذا كنت تتناول أيضاً كاربامازيبين (carbamazepine) ، فينيوباربิตال (phenobarbital)، فينيتوين (phenytoin)، إيفافيرينز (efavirenz) ، نيفيرابين (nevirapine) ، أو ثيليپاربين (thielaپaripien) .

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأدواء إذا كنت تتناول:

- أدوية لعلاج HIV

- أدوية لمنع الحمل القائمة على أساس الإستروجين (أقراص ولصقات من الحمل) على سبيل المثال: إتينيل إستراديل (ethynodiol) . قد يقلل كالترام من نجاعة أقراص منع الحمل القائمة على أساس الإستروجين. خلال فترة العلاج بـ كالترام، يجب إستعمال كبسولة تسمى إطالة خلقية لمقطع QT

- وُجدت لديك أو كانت لديك في الماضي مشاكل في البنكرياس

- وُجدت لديك مشاكل في الكبد بما في ذلك إلتهاب الكبد الفيروسي من نوع B أو C

- وُجد لديك داء السكري

- وُجد لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم

- وُجد لديك مرض الناعور من شأن كالترام أن يؤدي إلى زيادة الأنزفة

- وُجدت لديك نسبة منخفضة من البوتاسيوم (Potassium) في الدم

- كنت حاملاً أو تخططين للحمل. أنتري المعلومات في الفقرة 2.5 "الحمل الإرضاخ والخصوبة"

- كنت مرضعة أو تخططين للإرضاخ. أنتري المعلومات في الفقرة 2.5 "الحمل الإرضاخ والخصوبة"

### 2.4 إستعمال الدواء والطعام

بالإمكان تناول كالترام أقراص بدون علاقه لوجبات الطعام.

### 2.5 تحذيرات خاصة تتعلق بعض مركبات الدواء

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

- يجب تناول كالترام كل يوم بالضبط حسب تعليمات الطبيب.

- إبق تحت متابعة طبيبك خلال فترة العلاج بـ كالترام.

- من المهم تحديد جدول زمني للمقدار الدوائي والتقييد به كل يوم.

- لا تغير أو تتوقف عن العلاج بدون استشارة الطبيب المعالج أولاً.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

### 3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج

بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

- يجب تناول كالترام كل يوم بالضبط حسب تعليمات الطبيب.

- إبق تحت متابعة طبيبك خلال فترة العلاج بـ كالترام.

- من المهم تحديد جدول زمني للمقدار الدوائي والتقييد به كل يوم.

- لا تغير أو تتوقف عن العلاج بدون استشارة الطبيب المعالج أولاً.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

- طريقة التناول:** يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل. لا يجوز المضغ، الكسر أو السحق.
- إذا كنت تتناول كالتراديدانوزين (didanosine): بالإمكان تناول ديدانوزين سوية مع كالترأ أقراص من دون طعام.
  - إذا كنت حاملاً: لا يجوز تناول كالترأ أقراص بمقدار دوائي قدره مرة واحدة في اليوم خلال فترة الحمل.
  - من الجائز أن يكون هناك إحتمال أكبر للإصابة بأسهال، عند تناول كالترأ مرة واحدة في اليوم، مقارنة بتناوله مررتين في اليوم.
  - لا تنسى تناول كالتراء، فتناول المقدار الدوائي المنسي حال تذكرك. إذا حان تقريراً موعد تناول المقدار الدوائي القائم بك، فلا تتناول المقدار الدوائي المنسي. بدلاً من ذلك، إستمر بحسب الجدول الزمني الإعتيادي لتناول المقادير الدوائية، وذلك بتناول المقدار الدوائي القائم بك في موعده الإعتيادي. لا يجوز تناول أكثر من مقدار دوائي واحد من كالترأ دفعة واحدة.
- يجب المراقبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا تناولت أو تناول طفلك بالخطأ مقدار دوائي مفرط أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أستلهة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كالترأ قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

قد يسبب كالترأ أعراضًا جانبية خطيرة، التي تشمل:

- أنظر فقرة "ما هي المعلومات الأكثر أهمية التي يتوجب علي معرفتها حول كالترأ؟" في بداية النشرة.
- إلتهاب البنكرياس. قد يتتطور لدى بعض المتعالجين الذين يتناولون كالترأ إلتهاب في البنكرياس الذي يمكن أن يكون خطيراً وأن يؤدي للوفاة. إذا عانيت في الماضي من إلتهاب البنكرياس، فلديك إحتمال أكبر أن تصاب بإلتهاب البنكرياس ثانية. إحكِ لطبيبك فيما إذا وجد لديك غثيان، تقيؤات أو ألم في البطن أثناء تناول كالترأ. فهذه يمكن أن تكون علامات لإلتهاب البنكرياس.
- مشكل في الكبد. قد تحدث مشاكل في الكبد، بما في ذلك الوفاة، لدى متعالجين يتناولون كالترأ. سوف يقوم طبيبك بإجراء فحوص الدم قبل وخلال فترة العلاج بـ كالترأ وذلك لفحص الأداء الوظيفي لكبدك. متعالجون لديهم مشاكل في الكبد مثل إلتهاب الكبد B وـ C والذين يتناولون كالترأ، قد يتتطور لديهم تفاقم في هذه المشاكل. يجب إبلاغ الطبيب في الحال إذا وُجدت لديك إحدى العلامات والأعراض التالية لمشاكل في الكبد:

○ فقدان الشهية للطعام

○ إصفرار الجلد وإصفرار بياض العينين (يرقان)

○ بول داكن

○ براز فاتح

○ حكة في الجلد

○ ألم في منطقة البطن

- السكري وإرتفاع نسبة السكر في الدم (هيبر جلوكيميا). من الجائز أن يتتطور لديك سكري جديد، تفاقم في حالة السكري لديك أو إرتفاع نسبة السكر في الدم خلال فترة العلاج بـ كالترأ. إحكِ لطبيبك في الحال إذا بدأت بتطوير أعراض جديدة بعد بدء العلاج بالدواء الخاص بك لـ HIV.
- إرتفاع في نسبة شحوم معينة (الشحوم الثلاثية والكوليسترون) في دمك. بالإمكان ملاحظة حدوث إرتفاع كبير في الشحوم الثلاثية والكوليسترون وذلك بنتائج فحوص الدم لدى بعض المتعالجين الذين يتناولون كالترأ. سوف يقوم طبيبك بإجراء فحوص الدم لفحص نسبة الشحوم الثلاثية قبل أن تبدأ بتناول كالترأ وخلال فترة علاج.

- تغيرات في شحوم الجسم من شأنها أن تحدث لدى بعض المتعالجين الذين يتناولون علاجاً مضاداً للفيروسات الرجعية. هذه التغيرات قد تشمل كمية شحم زائدة في القسم العلوي من الظهر والعنق، الصدر ومن حول القسم العلوي من الجسم. يمكن أن يحدث أيضاً فقدان لشحوم من الرجلين، اليدين والوجه. إن السبب والتداعيات الصحية طويلة المدى لهذه الأعراض غير معروفة في هذه المرحلة.
- نزف زائد لدى مرضى التاعور. تحدث زيادة في الأنف، لدى بعض المتعالجين الذين يعانون من التاعور ويتناولون كالترأ وأدوية مشابهة.

- طفح في الجلد، الذي قد يكون خطيراً، قد يظهر لدى المتعالجين الذين يتناولون كالترأ. إحكِ لطبيبك إذا حدث لديك طفح عندما تناولت دواء آخر لعلاج تلوث HIV أو إذا كنت تلاحظ حدوث أي طفح جلدي أثناء تناول كالترأ.
- حصى في الكلى.

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) أعراض التي تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة:

• إسهال

• غثيان

• تلوث في الجهاز التنفسى العلوى

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

- إلتهاب البنكرياس
- تقىء، تضخم البطن، ألم في منطقة أعلى وأسفل البطن، نفخة، صعوبات في الهضم، تناقص الشهية للطعام، إرتداد من المعدة باتجاه المريء الذي قد يسبب الألم
- إنتفاخ أو إلتهاب في المعدة وفي الأمعاء
- ارتفاع نسبة الكوليسترون في الدم، ارتفاع نسبة الشحوم الثلاثية في الدم، ارتفاع ضغط الدم
- إنخفاض قدرة الجسم على موازنة السكر، يشمل: السكري، تناقص الوزن

• إنخفاض نسبة خلايا الدم الحمراء، إنخفاض نسبة خلايا الدم البيضاء التي تحارب التلوثات طفح، إكيزيميا، تراكم قشرة جلد دهني

• دوار، قلق، صعوبات في النوم

• إرهاق، نقص في القوة والحيوية، صداع يشمل شقيقة

• بواسير

- إلتهاب في الكبد بما في ذلك إرتفاع إنزيمات الكبد، إرتفاع غير سليم لمستوى البيليروبين (صباغ الذي يتشكل جراء تفكك خلايا الدم الحمراء) في الدم
- فشل كلوي
- ردود فعل تحسسية، تشمل شرى وإلتهاب في الفم

- تغيرات في شكل الوجه أو الجسم جراء تغير توزيع الشحوم في الجسم
- تلوث في الطرق التنفسية السفلية
- تضخم الغدد المفتوحة
- عجز جنسي، نزف شديد غير عادي أو واسع النطاق أثناء الطمث أو غياب الطمث

- مشاكل في العضلات، مثل: ضعف العضلات، تقلصات عضلية، آلام في المفاصل، في العضلات وفي الظهر
- تضرر أعصاب الجهاز العصبي المحيطي
- تعرق ليلي، حكة، طفح يشمل إنتفاخ الجلد، تلوث في الجلد، إلتهاب في الجلد أو في مسامات الشعر، وذمة

- أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:
- أحلام غير عادية
- تغير أو فقدان حاسة المذاق
- تساقط الشعر
- تغير في التخطيط الكهربائي للقلب المسمى: إحصار أذيني - بطيني

- طبقة تتراكم في الشرايين والتي قد تسبب نوبة قلبية وسكتة
- إلتهاب في الأوعية والشعيرات الدموية
- إلتهاب في الطرق الصفراوية
- إختلالات
- إمساك
- إلتهاب في الأوردة العميقه ذو صلة بالخثرات الدموية
- عدم السيطرة على مصرات الأمعاء

- إلتهاب في القسم العلوي من الأمعاء الدقيقة، الذي يلي المعدة. جرح أو تقرح في الجهاز الهضمي، نزف من الجهاز الهضمي أو من المستقيم (ال الشرج ) خلايا دم حمراء في البول
- الكلب الدهني، تضخم الكلب
- قصور في نشاط الغدد التناسلية (الخصيتين أو المبايض)
- إندلاع أعراض في جهاز المناعة والتي تتعلق بتلوث غير نشط في الجسم
- زيادة الشهية للطعام
- تناقص في الرغبة الجنسية
- إلتهاب في الكلية
- تلف العظم الناتج عن تناقص تزويد المنطقة بالدم

- جرح في الفم أو تقرحات في الفم، إلتهاب في المعدة وفي الأمعاء، إلتهاب في الفم
- تفكك ألياف عضل الذي يؤدي لتحرر محتوى ألياف العضل (ميوجلوبين) إلى مجرى الدم رنة في أذن واحدة أو بكلتا الأذنين، مثل: طنين، رنين أو صفير
- رجفة
- إنفلات شاذ لصمام في القلب
- ترنج (ثيرتيقو) (الشعور بدوران)
- مشاكل في العينين، عدم سلامه الرؤية
- زيادة في الوزن
- حمامض لبني

أعراض جانبية شيوها غير معروفة (أعراض شيوها لم يحدد بعد):

- إصفرار الجلد وإصفرار بياض العينين (يرقان)
- حويصلات في الجلد وطفح خطير أو يشكل خطراً على الحياة (متلازمة ستيفنس - جونسون، إحرار متعدد الأشكال [طفح جلدي إلتهابي])
- حصى في الكلى

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

**تبليغ عن أعراض جانبية:**

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للت bliغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5) كيفية تخزين الدواء؟

• بالإضافة للمواد الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:

- لب القرص:

Copovidone K-value 28, Sorbitan laurate, Silica colloidal anhydrous, Sodium stearyl fumarate

- طلاء القرص:

Hypromellose 2910, Titanium dioxide, Macrogols type 400, Hydroxypropyl cellulose, Red ferric oxide E172, Talc, Macrogol type 3350, Silica colloidal anhydrous, Polysorbate 80

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة: أقراص بيضاوية الشكل بلون أحمر مع طباعة الأحرف AL.

• تتوفّر الأقراص ضمن قنّيّة بلاستيكية أو ضمن لوبيات (بليستر) التي تحتوي على 120 قرصاً من الجائز أن لا تتسوق كافة أحجام العلب.

• لا يجوز إنتقاء تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• هذا الدواء لا يتطلب أية شروط خاصة للتخزين. يوصى بحفظه بدرجة حرارة الغرفة.

• خزن في العلبة الأصلية. لا يجوز نقل الأقراص إلى وعاء آخر.

• لا يجوز إلقاء دوائي في المجاري أو في القمامات المنزلية. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد بحاجتها بعد. إن إتخاذ هذه الوسائل يساعد في الحفاظ على البيئة.

**6) معلومات إضافية**

• بالإضافة للمواد الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:

- لب القرص:

KAL APL OCT 23 CL P3