

ינואר 2024

Ofloxacin, caplets

צוות רפואי נכבד,

חברת דקסל בע"מ מבקשת להודיעיכם על עדכון בעלון לצורכי התכשיר **אופלודקס**. בהודעה זו מפורטים העדכנים המהווים החמרה במידע הבטיחותי בלבד. למידע מלא, יש לעיין בעליון.

העלון לצורכי נשלח לפרסום במאגר התרופות שמשרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס ע"י פנינה לבעל הרישום: דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל, טל': 04-6364000

הרכב התכשיר:

Each caplet contains Ofloxacin 200mg

התוויות המאושרת:

Bacterial infections due to ofloxacin-susceptible microorganisms, such as:

- acute, chronic, or recurrent lower respiratory tract infections (bronchitis), pneumonia (not for the treatment of first choice in pneumonia caused by pneumococci).
 - Chronic and recurrent infections of the ear, nose, and throat. Ofloxacin is in general not indicated for the treatment of acute tonsillitis caused by betahaemolytic streptococci.
 - Infections of soft tissues and skin.
 - Infections of the bones and joints.
 - Abdominal infections including infections in the pelvis minor and bacterial enteritis.
 - Infections of the kidney, urinary tract, and genital organs, gonorrhoea.
- Prevention of infections due to ofloxacin-susceptible pathogens in patients with a significant reduction in resistance to infections (e.g. in neutropenic state).

הרכב התכשיר:

Each caplet contains Ofloxacin 200mg

העלון לצורכי עודכן **בינואר 2024 להלן** העדכנים המהווים החמרה במידע הבטיחותי (מסומנים באדום):

2. לפני השימוש בתרופה

במהלך הטיפול בתרופה

- אתה עלול לחוות תגובה אלרגית פתאומית חמורה (תגובה אנafilקטית/הלם). אףלו לאחר נתילת המנה הראשונה. קיימים סיכוי שאתיה עלול לחוות תגובה אלרגית פתאומית חמורה עם התסמים הבאים: לחץ בחזה, תחושת סחרחות, **בחילה** או **עילפון**, או הרגשות סחרחות בעמידה. אם זה קורה הפסיק נתילת התרופה וצור קשר עם הרופא מייד.

- **תגובהות לוואי חמורות ממושכות, משביתות, שועלות להיות בלתי הפיכות** תרומות אנטיבakterיאליות ממשפחת פלאורוקוינוולוניים/קווינולוניים, כולל אופלוקסצין, קשורות לתופעות לוואי נדירות **אף**, אך חמורות, כאשר חלה נמשכות למשך זמן (חודשים או שנים), משביתות או עלולות להיות בלתי הפיכות. תופעות לוואי אלו כוללות כאב בגיד, בשיריר ובמפרק של הגפיים העליונות והתחתונות, קושי בהליכה, רגשות חריגה כגון תחושת "דקירות ועקבוצים", תחושת עקצוץ, דגדוג, חוסר תחושה או תחושת שריפה (פרסתזה), הפרעות תחושתיות הכוללות פגעה בראייה, בחושطعم, הריח והشمיעה, **השפעות על בריאות הנפש העוללות לכלול, אך לא בהכרח מוגבלות לחדרה, התקפי חרדה, הבלבול, או דיכאון, פגעה בזיכרון, עיפות חמורה ובעיותamina חמורות. אין תרופות שנמצאו כיעילות לטיפול בתסמינים של תופעות לוואי ממושכות או משביתות הקשורות לניטילת פלאורוקוינוולוניים.**
- אם אתה חש אחת מתופעות לוואי אלו לאחר נטילת התרופה, אל תיטול מנוטה נוספת וצורך קשר עם הרופא מיידית. אתה והרופא תחלתו אם להמשיך בטיפול, **תוקן שיקול של אפשרויות חלופיות.**
- במהלך הנטילה של אופלוקסצין, כולל הנטילה הראשונה, אתה עלול לחוות תגובה פסיפיציאטרית. אם אתה סובל מדיכאון או פסיכוזה, התסמינים שלך עלולים להחמיר במהלך הטיפול באופלוקסצין. **במקרים נדירים, הדיכאון והפסיכוזה עלולים להתפתח להתאבדות או לניסיונות התאבדות.** אם זה קורה, הפסיק נטילת אופלוקסציןطبع וצורך קשר עם הרופא מיידית. אתה עלול לא להבחן בשינויים מסוימים במצב הרוח ובהתנהגות שלך, لكن חשוב מאד לספר לחברים ולמשפחה שאתה נוטל אופלוקסצין, ושיתכננו תופעות לוואי פסיפיציאטריות נדירות. אנשים אחרים יכולים להבחן בשינויים ולעזור לך לזהות מהר את התסמינים עליהם עלייך לספר לרופא.

4. תופעות לוואי

תופעות לוואי נדירות (תופעות ש会议上ות ב 10-1 משתמשים מתוך 10,000):
מקרים נדירים **אף** של תגובות לוואי ממושכות (חודשים או שנים) או קבועות הקשורות לניטילת אנטיביוטיקות ממשפחת קוינוולוניים או פלאורוקוינוולוניים. תגובות לוואי אלו עלולות לכלול דלקת בגיד, קרע של גיד, כאב במפרק, כאב בגפיים, קושי בהליכה, תחושות חריגות כגון תחושת "דקירות ועקבוצים", עקצוץ, דגדוג, חוסר תחושת שריפה, כאב (נוירופתיה), עיפות, הפרעותamina, פגעה בזיכרון, **השפעות על בריאות הנפש העוללות לכלול, אך לא בהכרח מוגבלות לחדרה, התקפי חרדה, הבלבול, או דיכאון,** כמו גם פגעה בשמיעת, בראייה ובחושطعم והריח. **אין תרופות שנמצאו כיעילות לטיפול בתסמינים של תופעות לוואי מתמשכות או משביתות הקשורות לניטילת הפלאורוקוינוולוניים.**