

نشرة المستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (المستحضرات) لعام 1986

يُسوّق هذا الدواء تبعاً لوصفة طبيب فقط

تارجين 5، تارجين 10، تارجين 20، تارجين 30، تارجين 40
أقراص التحرر المتواصل

المواد الفعالة:

المستحضر	هيدروكلوريد الأوكسيكودون (Oxycodone HCl)	هيدروكلوريد النالكسون (Naloxone HCl)
تارجين 5	5 ملغ	2.5 ملغ
تارجين 10	10 ملغ	5 ملغ
تارجين 20	20 ملغ	10 ملغ
تارجين 30	30 ملغ	15 ملغ
تارجين 40	40 ملغ	20 ملغ

لقراءة قائمة بالمركبات الأخرى، انظر البند 6. وانظر أيضًا "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" في البند 2. اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استخدامك للدواء. تتضمن هذه النشرة معلوماتٍ ملخّصةً عن الدواء. وإذا خطرت ببالك أي أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي. قد وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للآخرين. ذلك لأنه قد يؤذيهم حتى إذا بدا لك أنّ حالتهم الطبيّة مشابهة.

من شأن الأدوية من فصيلة الأفيونيات أن تسبب الإدمان تحديدًا عند استخدامها لفترة طويلة، كما أنّها قد تؤدي إلى إساءة الاستخدام والتجريح المفرط. وقد يتجلى ردّ الفعل على التجريح المفرط بتباطؤ التنفّس ويمكنه أن يكون فتاكًا. تحقّق من معرفتك لاسم الدواء وكن على علم بالجرعة التي تتناولها وتأثيرها والتناول لفترة العلاج والأعراض الجانبية والمخاطر الكامنة. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن خطر الاعتماد والإدمان في الرابط التالي:
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_ar.pdf

إنّ تناول هذا الدواء بالتزامن مع الأدوية من فصيلة البينزوديازيبينات أو أدوية أخرى تثبّط الجهاز العصبي المركزي (بما في ذلك المخدرات) أو الكحول قد يسبب الشعور بالميل الشديد إلى النوم، وصعوبات التنفّس (التثبيط التنفّسي) والغيوبية والوفاة.

1. لأيّ غرض خصّص هذا الدواء؟

تارجين مخصّص لتسكين الألم المتوسط إلى الشديد. يحتوي تارجين على مادتين فعالتين، أوكسيكودون ونالكسون. المادة أوكسيكودون مخصّصة لتسكين الألم المتوسط إلى الشديد لدى البالغين الذين يحتاجون إلى مسكّن آلام أفيونيّ على مدار الساعة طيلة بضعة أيام أو لأكثر من ذلك. تمّ إضافة المادة نالكسون كي تخفّف من الإمساك الناتج عن نشاط المادة أوكسيكودون الأفيونية في الجهاز الهضمي.
الفصيلة العلاجية: أوكسيكودون - مادة أفيونية مسكّنة للألام، نالكسون - مادة مناهضة أفيونية.

2. قبل استخدام هذا الدواء**يُمنع استخدام هذا الدواء إذا:**

- كنت حساسًا (متحسسًا) للمواد الفعالة أو لأيّ واحد من المركبات الأخرى التي تحتوي عليها الأقراص (لقراءة قائمة بالمركبات الأخرى، انظر البند 6).
- كنت تعاني من التثبيط التنفّسي (أي أنّ عملية التنفّس لديك لا تؤدي إلى التزويد بكميّة كافية من الأكسجين في الدم والتخلّص من ثاني أكسيد الكربون)؛ المرض الرئويّ الخطير المرتبط بتضيق المسالك الهوائية (COPD)، أو الربو القصبيّ الخطير.
- كنت تعاني من cor pulmonale (تضخم الجانب الأيمن من القلب من جرّاء ازدياد الضغط في الأوعية الدموية الرئويّة، مثلًا).
- كنت تعاني من انسداد الأمعاء غير الناتج عن استخدام المواد الأفيونية.
- كنت تعاني من الخلل المتوسط إلى الشديد في وظيفة الكبد.

التحذيرات الخاصة المتعلقة باستخدام الدواء:**قبل العلاج بتارجين، أخبر الطبيب إذا:**

- كنت أنت أو كان أحد أفراد عائلتك يعاني أو عانى سابقًا من الإدمان على الأفيونيات، الكحول، الأدوية المصروفة بوصفة طبيب أو المخدرات.
- كنت مسنًا أو منهكًا (ضعيفًا).
- كنت تعاني من انسداد الأمعاء في أعقاب استخدام الأفيونيات؛ اختلال الوظائف الكلوية؛ اختلال وظائف الكبد؛ الاختلال الخطير في وظائف الرئتين (بما فيها انخفاض القدرة على التنفّس)؛ انقطاع النفس خلال النوم أحيانًا كثيرة، ممّا قد يسبب لك الشعور الشديد بالميل إلى النوم خلال النهار (انقطاع النفس خلال النوم)؛ وذمة الغشاء المخاطي (الوذمة المخاطية) - اضطراب وظائف الغدة الدرقية المصحوب بالجفاف، البرد وانتفاخ الجلد في الوجه أو الأطراف.
- عدم إنتاج الغدة الدرقية لديك ما يكفي من الهرمونات (نقص نشاط الغدة الدرقية أو القصور الدرقي).

- عدم إنتاج الغدتين الكظرينتين لديك ما يكفي من الهرمونات (القصور الكظري، مرض أديسون).
- كنت تعاني من مرض نفسي مصحوب بفقدان (جزئي) للاتصال بالواقع (لحالات الذهانية)، نتيجة لاستهلاك الكحول أو للتأثيرات السامة لمواد أخرى (الذهان الناجم عن المواد).
- كنت تعاني أو قد عانيت سابقاً من مشاكل في مزاجك (الاكتئاب، القلق أو اضطرابات الشخصية) أو كنت تتلقى أو قد تلقيت علاجاً من طبيب نفسي لأمراض نفسية أخرى.
- كنت تعاني من مشاكل ناتجة عن الحصاة الصفراوية.
- كنت تعاني من تضخم البروستاتا.
- كنت تعاني من إدمان الكحول أو الهذيان الارتعاشي (حالة ذهانية متسببة عن الإقلاع عن الكحول).
- كنت تعاني من التهاب البنكرياس.
- كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه.
- كنت مصاباً بالفعل بمرض في القلب والأوعية الدموية.
- كنت مدخناً.
- كنت تعاني من إصابة في الرأس (نتيجة لخطر تزايد الضغط داخل الجمجمة).
- كنت تعاني من الصرع أو كان لديك استعداد لنشوء التشنجات/الاختلاجات.
- إذا كنت تتناول دواء من فصيلة مثبطات الأوكسيداز الأحادي الأمين (MAOIs - الفصيلة المستخدمة لعلاج الاكتئاب أو مرض باركنسون) أو كنت قد تناولت دواء من هذه الفصيلة في غضون الأسبوعين الأخيرين، مثل: الأدوية المحتوية على ترانيلسيبرومين، فينيلزين، إيزوكاربوكسازيد، موكلوبيميد و لينيزوليد.
- كنت تعاني من الميل إلى النوم أو حالات النوم الفجائي.
- كنت تعاني من أي مشكلة في المسالك الصفراوية (الأمراض التي تؤثر في القنوات الصفراوية، كيس المرارة وما إلى ذلك).

يجب إخبار الطبيب حتى إذا عانيت من الحالات المذكورة أعلاه في الماضي و/أو إذا نشأت هذه الحالات خلال العلاج بالدواء.

تحذيرات إضافية:

- أخطر نتيجة محتملة لتناول الجرعة المفرطة من المواد الأفيونية هي التثبيط التنفسي (التنفس البطيء والسطحي). ومن شأن ذلك أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم، مما قد يؤدي إلى الإغماء وغيره من الحالات.
- قد يسبب الدواء مشاكل التنفس خلال النوم. قد تشمل هذه المشاكل توقّف التنفس خلال النوم، والاستيقاظ نتيجة لضيق التنفس، الصعوبة في البقاء نائمًا أو الميل المتزايد إلى النوم خلال ساعات النهار. إذا شعرت بهذه الأعراض أو إذا لاحظ شخص آخر من حولك هذه الأعراض لديك، فراجع الطبيب. قد يوصي الطبيب بخفض الجرعة الدوائية.
- يجب بلع قرص التحرر البطيء كاملاً كيلا تختل آلية التحرر البطيء للمادة هيدروكلوريد الأوكسيكودون من القرص. لا يجوز كسر، مضغ، هرس أو شطر القرص! من شأن تناول الأقراص غير الكاملة أن يؤدي إلى امتصاص جرعة مهددة للحياة من هيدروكلوريد الأوكسيكودون (انظر البند المعنون "إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر").
- إذا نشأ لديك الإسهال الخطير عند البدء بالعلاج، فقد يحدث ذلك بسبب نالوكسون. قد يدل ذلك على استعادة الأمعاء وظائفها السليمة. قد يحدث إسهال كهذا خلال الأيام الثلاثة إلى الخمسة الأولى من العلاج. ولكن إذا استمر الإسهال لأكثر من 3 إلى 5 أيام أو إذا أصبح مزعجاً فراجع الطبيب.
- إذا كنت قد استخدمت مادة أفيونية مختلفة قبل العلاج بتارجين فقد تنشأ لديك أعراض الانسحاب عند الانتقال إلى تارجين، مثل: التملل، نوبات التعرق والألام العضلية. في حال اختبرت مثل أعراض الانسحاب هذه فقد تضطر إلى الخضوع لمتابعة طبية في أحيان أكثر تقارباً.
- من شأن تناول هذا الدواء بانتظام تحديداً خلال فترة متواصلة أن يؤدي إلى الإدمان، الحالة التي قد تقود إلى تناول جرعة مفرطة مهددة للحياة. إذا كانت لديك مخاوف من اعتمادك المحتمل على تارجين، فمن المهم استشارة طبيبك. يجب على الطبيب الذي وصف لك هذا الدواء أن يذكر المدة الزمنية المحددة لتناوله وفي الظروف التي تقتضي التوقف عن تناول الدواء، يجب أن يشرح كيف يمكن فعل ذلك بشكل آمن.
- من شأن الاستخدام المتواصل أن يؤدي إلى نشوء القدرة على تحمل الدواء (الحاجة إلى جرعة أعلى للحصول على التأثير المرغوب فيه)، إضافة إلى الاعتماد البدني. قد تحدث أعراض الانسحاب في حال تم إيقاف العلاج بشكل فجائي (التملل، نوبات التعرق، والألام العضلية). حينما تنتهي لديك الحاجة إلى العلاج، سيتوجب خفض الجرعة اليومية تدريجياً بعد استشارة الطبيب.
- من المحتمل أن تحصل إساءة استخدام المادة الفعالة هيدروكلوريد الأوكسيكودون، مثلما يحدث عند استخدام مسكنات الألام الأفيونية القوية الأخرى. هناك خطر نشوء الاعتماد النفسي (الإدمان) على الدواء. تجنّب العلاج بالدواء إذا كنت تعاني أو قد عانيت في الماضي من إساءة استخدام أو إدمان الكحول، المخدرات، أو الأدوية.
- كنت مصاباً بنوع من السرطان مرتبط بوجود نقائل في الغشاء الصفاقي أو نشأت لديك المراحل الأولى من انسداد الأمعاء بسبب تقدّم السرطان في الجهاز الهضمي أو في الحوض.
- إذا كان من المخطط له خضوعك لعملية جراحية، فيجب إخبار الطبيب/الطاقم المعالج بتناولك لهذا الدواء.
- مثل المواد الأفيونية الأخرى، قد تؤثر المادة الأفيونية أوكسيكودون على إنتاج الهرمونات في الجسم، على سبيل المثال الكورتيزول أو هرمونات الجنس، خصوصاً عند تعاطي جرعات عالية على مدار فترات طويلة. إذا اختبرت أعراضاً متواصلة مثل الغثيان أو النقي، فقدان الشهية، التعب، الضعف، الدوار، تغيرات في الدورة الطمثية، الضعف الجنسي، نقص الخصوبة، أو قلة الشهوة الجنسية، فيجب استشارة الطبيب. قد يصبح من الضروري متابعة مستويات الهرمونات.
- قد يزيد الدواء من حساسيتك للألم، خصوصاً عند استخدام الجرعات العالية. يجب إخبار طبيبك إذا حدث ذلك. قد تظراً الحاجة إلى خفض الجرعة أو تغيير العلاج الدوائي.
- قد تلاحظ بقايا القرص في البراز. ولكن لا داعي للقلق لأنّ المواد الفعالة في القرص قد تحررت في الجهاز الهضمي وتم امتصاصها في الجسم.

الاستخدام غير الصحيح لتارجين:

- **تارجين** غير مناسب لعلاج أعراض الانسحاب أو الإقلاع. ممنوع منعاً باتاً إساءة استخدام **تارجين**، خصوصاً إذا كان لديك إدمان على المخدرات. إذا كنت مدمناً على مواد مثل الهيروين، المورفين، أو الميثادون، فقد تنشأ أعراض إقلاع خطيرة عند إساءة استخدام الأقراص وذلك لأنها تحتوي على نالوكسون. إذا كنت تعاني من أعراض الإقلاع من قبل فمن المحتمل أن تتفاقم.
 - ممنوع منعاً باتاً استخدام الأقراص بطريقة غير لائقة من خلال إزالتها وحققها (في وعاء دموي، مثلاً). ذلك لأنها تحتوي على التلك، المادة التي قد تسبب إتلاف الأنسجة الموضعية (التنخر) وتغير الأنسجة الرئوية (الورم الحبيبي الرئوي). قد تؤدي إساءة الاستخدام على هذا النحو إلى نتائج خطيرة أخرى وحتى الموت.
 - قد يتسبب استخدام **تارجين** في الحصول على نتيجة إيجابية لفحص المخدرات.
 - يشكل استخدام **تارجين** لأجل تحسين الأداء الرياضي خطراً صحياً.
- الاستخدام لدى الأطفال والمراهقين:** لا تتوفر معلومات حول أمان وسلامة الاستخدام لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة فلذا لا يوصى باستخدام الأقراص لعلاجهم.

الفحوص والمتابعة: خلال العلاج الطويل الأمد، يتوجب عليك الخضوع لتقييمات دورية لتقييم الحاجة إلى العلاج المتواصل بالدواء.

التفاعلات الدوائية:

- **يزيد خطر نشوء الأعراض الجانبية في حال كنت تتناول مضادات الاكتئاب (مثل سيتالوبرام، دولوكسيتين، إيسيتالوبرام، فلوكسيتين، فلوفوكسامين، باروكسيتين، سيرترالين، فينلافاكسين).** قد تتفاعل هذه الأدوية مع أوكسيكودون بحيث تشعر بأعراض من قبيل التقلصات العضلية اللاإرادية والمنظمة، مما يشمل العضلات التي تسيطر على حركة العين، التملل، الهلوسة، فرط التعرق، الارتعاش، ازدياد المنعكسات، زيادة التوتر العضلي، وزيادة درجة حرارة الجسم فوق 38 درجة مئوية، الغيبوبة، تسارع نظم القلب (تسارع دقات القلب)، تغيرات في ضغط الدم، نقص التناسق الحركي، صلابة العضلات، أعراض الجهاز الهضمي (الغثيان، التقيؤ، الإسهال). يجب مراجعة الطبيب إذا شعرت بهذه الأعراض.
- **إن استخدام الأدوية الأفيونية بالتزامن مع الأدوية المهدئة (ذات التأثير المركز، المهدئ أو المنوم)، مثل البينزوديازيبينات أو الأدوية المشابهة لها، يزيد من خطر نشوء الميل إلى النوم، صعوبات التنفس (التثبيط التنفسي) والغيبوبة بل قد يكون مهدداً للحياة.** لذا، يجب التفكير في الاستخدام المترام فقط إذا لم تكن هناك خيارات علاجية متاحة أخرى. ولكن إذا قرر طبيبك أن يصف لك أدوية مركبة بالتزامن مع **تارجين**، فسيترتب عليه الحد من الجرعة ومدة العلاج المدمج. يجب إخبار الطبيب بجميع الأدوية المركبة التي تتناولها. وتشمل الأمثلة على مثل هذه الأدوية ما يلي: أدوية قوية أخرى لتسكين الألم (المسكنات الأفيونية)؛ أدوية علاج الصرع والألم والقلق مثل غابابنتين وبريجابالين؛ الأدوية المنومة والمهدئة (بما فيها البينزوديازيبينات، والأدوية المنومة ومضادات القلق)؛ الأدوية لعلاج للاكتئاب؛ الأدوية لعلاج للتحسس، داء السفر أو الغثيان (مضادات الهيستامين أو مضادات الغثيان/التقيؤ)؛ الأدوية لعلاج المشاكل النفسية أو الطبفسية (الأدوية المضادة للذهان، بما فيها الفينوثيازينات ومضادات الذهان).

رجاء احرص على اتباع توصيات الطبيب فيما يتعلق بالتجريح. ويستحسن طلب الأصدقاء والأقارب بالانتباه إلى الأعراض السابق ذكرها. يجب مراجعة الطبيب إذا شعرت بهذه الأعراض.

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية المصرفة بدون وصفة طبيب والإضافات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تتناول:

- الأدوية ضد تخثر الدم (مثل مشتقات الكومارين)؛
- المضادات الحيوية من فصيلة الماكروليدات (على سبيل المثال كلاريثروميسين، إيريثروميسين، تيليثروميسين)؛
- مضادات الفطريات من فصيلة الأزولات (مثل كيتوكونازول، فوريكونازول، إيتراكونازول، بوساكونازول)؛
- مثبطات البروتياز (ضد فيروس HIV)، مثل: ريتونافير، إندينافير، نيلفينافير، ساكوينافير؛
- سيميدين (لعلاج حرقة الفؤاد، قرحة المعدة، وعسر الهضم)؛
- ريفاميسين (لعلاج السل)؛
- كاربامازيبين (لعلاج النوبات الاختلاجية وبعض الألام)، فينيتوين (لعلاج النوبات الاختلاجية)؛
- نبتة العرن المثقوب (المسماة أيضاً St. John's Wort)؛
- كينيدين (لعلاج مشاكل نظم القلب)؛
- الأدوية من فصيلة مثبطات إنزيم الأوكسيداز الأحادي الأمين (MAOIs)، مثل: ترانيلسيبرومين، فينيلزين، إيزوكاربوكسازيد، موكلوبيميد ولينيزوليد، المستخدمة لعلاج الاكتئاب أو مرض باركنسون. إذا تناولت دواءً كهذا خلال الأسبوعين الأخيرين، فيجب إخبار الطبيب بذلك أيضاً.

من غير المتوقع نشوء التفاعلات الدوائية بين **تارجين** وباراسيتامول، حمض الأسيتيل ساليسيليك (أسبرين) أو نالتريكسون.

استخدام الدواء والغذاء: يمكن تناول هذا الدواء بغض النظر عن مواعيد وجبات الطعام. يجب تجنب شرب عصير الجريب فروت خلال فترة استخدام الدواء.

استخدام الدواء واستهلاك الكحول: يُمنع شرب الكحول خلال فترة العلاج بهذا الدواء.

ذلك لأنَّ شرب الكحول أثناء فترة استخدام هذا الدواء قد يزيد من ميلك إلى النوم أو قد يزيد من خطر التعرّض للأعراض الجانبية الخطيرة مثل التنفّس السطحيّ المصحوب بخطر انقطاع التنفّس وفقدان الوعي.

الحمل والإرضاع: يجب استشارة الطبيب إذا كنت حاملاً، تعتقدين أنك حامل، تحطّطين للحمل أو ترضعين طفلاً.

- **الحمل:** يجب تجنّب استخدام الدواء إذا كنت حاملاً (إلا إذا أمرك الطبيب بخلاف ذلك). قد يسبّب الاستخدام المتواصل خلال فترة الحمل أعراض الانسحاب لدى المولود. من شأن الاستخدام خلال الولادة أن يؤدي إلى التثبيط التنفّسيّ (التنفّس البطيء والسطحيّ) لدى المولود.
- **الإرضاع:** ممنوع الإرضاع خلال فترة العلاج. تنتقل المادّة هيدروكلوريد الأوكسيكودون إلى حليب الأم. من غير المعروف ما إذا كانت المادّة نالوكسون تنتقل إلى حليب الأم أيضاً فنظراً لذلك، لا يمكن استبعاد المخاطر على الطفل الرضيع، تحديداً بعد تناول عدد من جرعات تارجين.

قيادة السيارة واستخدام الماكينات: قد يخلّ استخدام هذا الدواء بقدرتك على قيادة السيارة أو تشغيل الماكينات، ذلك لأنّه قد يجعلك تنام أو تميل إلى النوم (تحديداً في بداية العلاج، عند زيادة الجرعة، الاستخدام بدلاً من دواء آخر أو عند الاستخدام بالتزامن مع أدوية أخرى تؤثر في الجهاز العصبيّ المركزيّ). في حال شعرت بالنعاس و/أو أي ظاهرة أخرى قد تؤثر في القيادة، فلا تقُد السيارة، تشغل الماكينات أو تشارك في الفعاليّات التي تستلزم اليقظة. استشر الطبيب إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

معلومات هامة عن بعض مركّبات الدواء: تحتوي الأقراص على اللاكتوز. إذا كنت تعاني من عدم تحمّل بعض أنواع السكريّات، فيجب عليك أن تخبر الطبيب بذلك قبل تناول هذا الدواء (انظر البند 6).

3. كيف تستخدم هذا الدواء؟

يتوجّب الاستخدام دائماً وفق إرشادات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدليّ إذا لم تكن متأكّداً من الجرعة الدوائية ومن كيفة العلاج بالدواء. **الجرعة الدوائية وكيفة العلاج سيحددهما الطبيب فقط.** تتّصف أقراص تارجين بالية التحرر البطيء، ممّا يعني أنّ الموادّ الفعّالة تتحرّر مع مرور الوقت. ويوم مفعولها مدّة 12 ساعة. يجب بلع القرص كاملاً كيلا تختلّ آلية التحرر البطيء للمادّة هيدروكلوريد الأوكسيكودون من القرص. لا يجوز كسر، مضغ، هرس أو شطر القرص! من شأن تناول الأقراص غير الكاملة أن يؤدي إلى امتصاص جرعة مهددة للحياة من هيدروكلوريد الأوكسيكودون (انظر البند المعنون "إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر").

الجرعة المتبّعة عادة هي:

يجب تناول الأقراص بانتظام (عادة كل 12 ساعة) مثلما حدّد الطبيب المعالج. وسيلائم الطبيب الجرعة الدوائية لحالتك وشدة الألم لديك. سيفصف الطبيب الجرعة الأقلّ المطلوبة للسيطرة على الألم لديك.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

في حال استبدل طبيبك تارجين بمادّة أفيونية أخرى مسكّنة للألم، قد يتدهور أداء الأمعاء لديك. إذا اخترت الألم بين جرعتين من تارجين فيجب مراجعة الطبيب. قد تحتاج إلى الحصول على مسكّن للألم سريع المفعول. تارجين غير مناسب لهذا الغرض. إذا شعرت بأنّ مفعول الأقراص أقوى أو أضعف ممّا يجب فراجع الطبيب.

متلقو العلاج المسنّون: إذا كانت وظائف الكبد والكليتين سيّئة فلا حاجة عادةً إلى تعديل الجرعة.

متلقو العلاج الذين يعانون من المشاكل في الكبد أو في الكليتين: إذا كنت تعاني من مشاكل الأداء الكلويّ أو مشاكل طفيفة من حيث أداء الكبد، فقد يتّخذ الطبيب وسائل الحذر (مثلاً وصف جرعة أقلّ). لا يجوز استخدام الدواء في حال كنت تعاني من مشاكل الكبد المتوسطة إلى الخطيرة.

كيفة الاستخدام: للاستخدام عبر الفم. يجب تناول الأقراص كاملةً مع كمّيّة كافية من الماء (نصف كأس تقريباً) كلّ 12 ساعة (مثلاً في الـ 8 صباحاً والـ 8 مساءً). يمكن تناول هذا الدواء بغضّ النظر عن مواعيد وجبات الطعام. لا يجوز كسر، مضغ، هرس أو شطر قرص التحرر البطيء (انظر البند 2، "التحذيرات الخاصة المتعلقة باستخدام الدواء").

مدة الاستخدام: ممنوع تناول الأقراص على مدار فترة أطول من اللازم. عند تلقّي العلاج المتواصل، سيجري الطبيب المتابعة كي يتحقّق من الحاجة إلى الاستمرار في العلاج.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر أو إذا بلع طفل أو أي شخص آخر الدواء خطأً، فيجب التوجّه فوراً إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار علبة الدواء. وقد تشمل أعراض الجرعة المفرطة الآتي: تقلص حدقة العين، التنفّس البطيء والسطحيّ (التثبيط التنفّسيّ)، النعاس وحتى فقدان الوعي، انخفاض التوتّر العضليّ، تباطؤ النبض، وهبوط ضغط الدم. أمّا في الحالات الخطيرة فقد يحصل فقدان الوعي (الغيبوبة)، احتباس السوائل في الرئتين، وانهيار جهاز الدورة الدموية (الصدمة)، ممّا قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات (إنّها تستلزم المساعدة الطبيّة الطارئة). يجب تجنّب ممارسة النشاطات التي تستلزم اليقظة العالية مثل قيادة السيارة.

إذا نسيت تناول الدواء فاتّبِع التعليمات التالية:

إذا بقيت 8 ساعات أو أكثر حتى موعد تناول الجرعة القادمة: تناول الجرعة المنسية فوراً. خذ الجرعة التالية في الساعة المعتادة. إذا بقيت أقل من 8 ساعات حتى موعد تناول الجرعة القادمة: تناول الجرعة المنسية وانتظر 8 ساعات حتى الجرعة القادمة. حاول لاحقاً إعادة اتباع الجدول الزمني الاعتيادي لتعاطي الجرعات. يجب استشارة الطبيب إذا لم تكن متأكدًا. يجب الحرص على الانتظار 8 ساعات على الأقل بين جرعة وأخرى. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة عوضاً عن الجرعة المنسية. يجب المواظبة على العلاج بالتماشي مع توصيات الطبيب. حتى إذا تحسنت حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء من دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء: إذا لم تعد بحاجة إلى العلاج، فاستشر الطبيب كي يرشدك إلى خفض الجرعة اليومية بالتدرج لتقليل خطر نشوء أعراض الانسحاب، على سبيل المثال: التملل، نوبات التعرق والالام العضلية. لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! راجع محتوى الملصق وتحقق من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. وإذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استخدام الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استخدام تارجين إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستخدمين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. ذلك لأنك قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوجه إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ فوراً إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية:

- التنفس البطيء والسطحي (التثبيط التنفسي). يعتبر التثبيط التنفسي الخطر الرئيسي الناتج عن الجرعة المفرطة وينشأ غالباً لدى متلقي العلاج من المسنين والمرهقين (الضعفاء).
- انخفاض خطير لضغط الدم.

الأعراض الجانبية الأخرى:

الأعراض الجانبية الشائعة (الأعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من أصل 100 مستخدم): أوجاع البطن، الإمساك، الإسهال، جفاف الفم، اضطرابات الهضم، التقيؤ، الغثيان، الغازات، انخفاض الشهية وحتى نقص الشهية، الدوار أو الشعور بالدوران، الصداع، الهبات الساخنة، الضعف غير الاعتيادي، التعب أو الإرهاق، ردود الفعل الجلدية مثل الحكة أو الطفح الجلدي، التعرق، الدوخة، صعوبات النوم والنعاس.

الأعراض الجانبية غير الشائعة (الأعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من أصل 1000 مستخدم): انتفاخ البطن، الأفكار غير الاعتيادية، القلق، الارتباك، الاكتئاب، العصبية، الضغط في الصدر (تحديداً إذا كنت تعاني من قبل من المرض القلبي التاجي)، انخفاض أو زيادة ضغط الدم، أعراض الانسحاب مثل التملل، الإغماء، نقص الطاقة، العطش، تغيير حاسة الذوق، الخفقان (الشعور بدقات القلب)، الآلام (المغص) المرتبطة بكيس المرارة، الأوجاع الصدرية، الشعور العام السيئ، الألم، تورم اليدين، الكاحلين، أو القدمين، صعوبات التركيز، اختلال النطق، الارتعاش، صعوبات التنفس، التملل، القشعريرة، ارتفاع إنزيمات الكبد، انخفاض الشهوة الجنسية، سيلان الأنف، السعال، ردود فعل حساسية المفرطة أو التحسس، فقدان الوزن، زيادة خطر التعرض للإصابة من جراء الحوادث، زيادة الحاجة إلى التبول، آلام العضلات، التقلصات أو التشنجات العضلية، اختلال الرؤية، النوبات الاختلاجية (خصوصاً لدى مرضى الصرع أو متلقي العلاج ذوي الاستعداد إلى الاختلاجات).

الأعراض الجانبية النادرة (الأعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من أصل 10000 مستخدم): زيادة النبض، الاعتماد على الدواء، التغيرات المتعلقة بالأسنان، زيادة الوزن، التثاوب.

الأعراض الجانبية التي مدى شيوعها غير معروف (الأعراض التي لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد): الشعور بالسعادة الفائقة (الشمق)، النعاس العميق، مشاكل الانتصاب، الكوابيس، الهلوسة، التنفس السطحي، صعوبة التبول (احتباس البول)، العدوانية، اللسع في الجلد (الإحساس بالتنميل/الإبر والديبابيس)، التجشؤ، مشاكل التنفس خلال النوم (متلازمة انقطاع التنفس خلال النوم). للمزيد من المعلومات انظر البند 2 "التحذيرات الخاصة المتعلقة باستخدام الدواء".

أعراض جانبية أخرى تم مشاهدتها عند استخدام المستحضرات المحتوية على هيدروكلوريد الأوكسيكودون فقط على هيئة المادة الفعالة، بدون الاستخدام المتزامن لهيدروكلوريد النالوكسون:

قد تسبب المادة أوكسيكودون مشاكل التنفس (التثبيط التنفسي) وتقلص حدقة العين وانقباض عضلات الشعب الهوائية وانقباض العضلات الملساء، زيادة على تثبيط منعكس السعال.

الأعراض الجانبية الشائعة (الأعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من أصل 100 مستخدم): تغييرات من حيث السلوك/الشخصية أو المزاج (مثل الاكتئاب، الشعور بالسعادة الفائقة)، زيادة مستوى النشاط أو انخفاضه، صعوبة التبول أو الفواق.

الأعراض الجانبية غير الشائعة (الأعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من أصل 1000 مستخدم): اختلال التركيز، الصداع النصفي، زيادة التوتر العضلي، التقلصات العضلية اللاإرادية، انسداد الأمعاء، جفاف الجلد، تحمل الدواء، انخفاض الإحساس بالألم أو للمس، اختلال التنسيق الحركي، تغيير الصوت، احتباس السوائل (الوذمة)، اختلال السمع، التفرحات الفموية، صعوبات البلع، آلام في اللثة، الإدراك الخاطئ للواقع (مثل الهلوسة أو تبدد الواقع)، تورم الجلد، التجفاف، التملل، انخفاض مستويات هرمونات الجنس، مما قد يؤثر في إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال أو الدورة الطمثية لدى النساء.

الأعراض الجانبية النادرة (الأعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من أصل 10000 مستخدم): الطفح المثير للحكة (الشرى)، التلوثات مثل الهربس أو هربس الشفة (قد يؤدي إلى نشوء النقطات حول الفم أو الأعضاء التناسلية)، زيادة الشهية، البراز الأسود (بلون القار)، نزيف اللثة.

الأعراض الجانبية التي مدى شيوعها غير معروف (الأعراض التي لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد): رد الفعل التحسسي العام الشديد (رد الفعل التأقسي)، زيادة الحساسية للألم، غياب الدورة الطمثية لدى النساء، أعراض الانسحاب لدى المولود، زيادة خطورة الأعراض المرتبطة بالتهاب البنكرياس (مثلاً، تفاقم أوجاع البطن) أو أوجاع البطن الإختلاجية (المغص) أو عدم الراحة، مشاكل جريان الصفراء، التسوس السنّي. إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، فيجب عليك استشارة الطبيب.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية بالضغط على الرابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية في أعقاب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجهك إلى الاستمارة المتصلة للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمّم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب الاحتفاظ به في مكان مغلق بعيداً عن مرأى ومتناول أيدي الأطفال و/أو الأطفال الرضّع، وهكذا ستمنع التسمّم. لا تسبّب التقبُّو بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا تُلقِ الأدوية في مياه الصرف الصحي أو المخلفات البيئية. وحينما لم تعد بحاجة إلى الدواء، استشر الصيدلي بالنسبة لكيفية التخلص منه لحماية البيئة.
- يُمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الوارد على العلبة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر ذاته.
- **ظروف التخزين:** يجب تخزين تارجين 10، 20، 30 و40 في درجة حرارة تقلّ عن 25 درجة مئوية. ويجب تخزين تارجين 5 في درجة حرارة تقلّ عن 25 درجة مئوية في العلبة الأصلية.

6. معلومات إضافية

- تحتوي الأقراص بالإضافة إلى المواد الفعالة على:

تارجين 5: يحتوي كلّ قرص على ما يقارب 69 ملغ من اللاكتوز زيادة على الآتي:

Stearyl alcohol, ethylcellulose, talc, magnesium stearate, hydroxypropylcellulose, polyvinyl alcohol partially hydrolysed, titanium dioxide (E171), macrogol 3350, brilliant blue FCF aluminium lake (E133).

تارجين 10: يحتوي كلّ قرص على ما يقارب 26 ملغ من اللاكتوز زيادة على الآتي:

Stearyl alcohol, ethylcellulose, talc, magnesium stearate, povidone K30, polyvinyl alcohol partially hydrolysed, titanium dioxide (E171), macrogol 3350.

تارجين 20: يحتوي كلّ قرص على ما يقارب 52 ملغ من اللاكتوز زيادة على الآتي:

Stearyl alcohol, ethylcellulose, talc, magnesium stearate, povidone K30, polyvinyl alcohol partially hydrolysed, titanium dioxide (E171), macrogol 3350, iron oxide red (E172).

تارجين 30: يحتوي كلّ قرص على ما يقارب 37 ملغ من اللاكتوز زيادة على الآتي:

Stearyl alcohol, ethylcellulose, talc, magnesium stearate, povidone K30, polyvinyl alcohol partially hydrolysed, titanium dioxide (E171), macrogol 3350, iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172), iron oxide black (E172).

تارجين 40: يحتوي كلّ قرص على ما يقارب 104 ملغ من اللاكتوز زيادة على الآتي:

Stearyl alcohol, ethylcellulose, talc, magnesium stearate, povidone K, 30 polyvinyl alcohol partially hydrolysed, titanium dioxide (E171), macrogol 3350, iron oxide yellow (E172).

- **كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟**

أقراص مطوّلة (حبسولات) مطليّة. طبع على أحد جانبيها "OXN" أما جانبيها الثاني فطبع عليه مفعول القرص (5، 10، 20، 30 أو 40 بالتتابع). لون الأقراص: تارجين 5 - الأزرق، تارجين 10 - الأبيض، تارجين 20 - الوردّي، تارجين 30 - البنيّ، تارجين 40 - الأصفر.

يحتوي كلّ صندوق على 20 قرصاً في شريط لويحات.

المصنّع وصاحب التسجيل: مختبرات رفا م.ض.، ص.ب. 405، أورشلیم القدس 9100301.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

تارجين 5 - 1439833120؛ تارجين 10 - 1399531636؛ تارجين 20 - 1399631637؛

تارجين 30 - 1604335262؛ تارجين 40 - 1439933122

تمّ تحرير النشرة في سبتمبر/أيلول 2023 تبعاً لإرشادات وزارة الصحة.

من باب تيسير القراءة وتسهيلها، تمّ صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر، لكنّ الدواء مخصّص لكلا الجنسين.

165012-I