

**עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי**  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה.  
**אמפרוגל וטרינרי, תמיסה למתן במי שתייה**

2. **חומר פעיל** Amprolium hydrochloride 12%  
חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף "מידע נוסף"

3. **למה מיועדת התרופה**  
למניעה וטיפול במחלת הקוקצידיוזיס בתרנגולות.  
**קבוצה תרפויטית:** קוקסידיוסטט.

4. **התוויות נגד:**  
אין להשתמש אם ידועה רגישות לחומר הפעיל או לאחד מהחומרים הלא פעילים.

5. **תופעות לוואי:**  
אם הבחנת בתופעות חמורות כלשהן או בתופעות אחרות אשר אינן מוזכרות בעלון לצרכן זה, אנא יידע את הרופא הווטרינר שלך. ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור – [/https://sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

6. **חיות מטרה:**  
תרנגולות פטם

7. **צורת המתן והמינון:**  
התכשיר ניתן במי השתייה.

2 מ"ל לליטר מים, שתיה רצופה למשך 2 – 3 ימים, בהמשך ניתן להפחית את המינון ל- 1.5 – 1 מ"ל לליטר מים בהדרגה ל 3 – 4 ימים נוספים, בהתאם לחומרת ההתפרצות והמלצות הרופא המטפל.

8. **אופן השימוש בתכשיר**  
בעת הכנת מי השתייה יש להתחשב במשקל בעלי חיים המטופלים ותצרוכת מי השתייה היומית. צריכת מי השתייה יכולה להשתנות בהתאם לגיל, מצב רפואי, זן החיה ותנאי גידול.

מי השתייה עם התרופה יהוו מקור בלעדי של שתייה בעת הטיפול, וכן לאפשר לבעלי החיים גישה חופשית למי השתייה הרפואיים.

9. **זמן המתנה:** לשחיטה לבשר: 5 ימים

10. **אזהרות:**

- **אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחייית המטרה:**  
שימוש תכוף וחוזר בתכשיר עם אותו סוג של אנטיפרוטוזואל או שימוש לאורך זמן ארוך, מגביר את הסיכון להתפתחות עמידות לתרופה.
- **אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר:**  
אנשים עם רגישות ידועה לאמפרוליום צריכים להמנע ממגע עם תכשירים וטרינריים אלה.

- יש לטפל בתכשיר בזהירות ולהיזהר משאיפת התכשיר או ממגע עם העור או העיניים.
- יש להיזהר במיוחד בעת מיהול התכשיר במים:
- יש ללבוש מסכת הגנה, כפפות, חלוק ומשקפי הגנה.
- במקרה של מגע בעור ובעיניים, יש לשטוף מיידית בכמות גדולה של מים.
- אין לעשן, לאכול או לשתות בעת הטיפול בתרופה.

• **הטלה:**

לא תוארו תופעות לוואי במטילות

• **תגובות עם תרופות אחרות וסוגים אחרים של אינטראקציות:**

התכשיר הוא אנלוג של תיאמין. מתן יחד עם ויטמין B קומפלקס יכול להפחית את יעילותו.

• **מינון יתר:**

שימוש ממושך עלול לגרום לירידה ברמות התיאמין (אם מופיעים סימפטומים יש לתת תיאמין).

**11. תנאי אחסון**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי הבקבוק. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון: מתחת ל 25°C.
- ניתן להשתמש בתמיסה המהולה למשך 24 שעות, לאחר מיהול התכשיר במי השתיה.

**12. הוראות בדבר השמדת התכשיר / שאריות התכשיר בתום השימוש**

יש להשמיד כל שארית של תרופות וטרינריות או חומרים שמקורם בתכשירים וטרינריים בהתאם להוראות ההשמדה של המשרד לאיכות הסביבה.

**13. מידע נוסף**

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Purified Water, Propylene Glycol
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: תמיסה צלולה בצבע צהוב בהיר בבקבוק פלסטיק גודל האריזה: 1 ליטר.

**יצרן ובעל הרישום:** ביוואק בע"מ, רחוב האילן 30, אזור תעשייה צפוני, אור עקיבא, 3060000

נערך בנובמבר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה  
בפנקס התרופות  
הממלכתי  
הבריאות: 083-33-  
92367