

نشرة للمستهلك لمستحضر بيطري

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب بيطري فقط
للاستعمال في الحيوانات فقط

1. اسم الدواء البيطري، شكله ومعياره
فلوبنجال 5% بيطري
مسحوق للتقديم في العلف

2. المواد الفعالة
فلوبندزول 5%
Flubendazole 5%
لقائمة المواد غير الفعالة أنظر البند 13

3. لم أعد الدواء؟

لعلاج ديدان مدورة ومسطحة في جهاز الهضم مثل: *Ascaridia galli*, *Cappilaria spp.*, *Heterakis*
Gallinerum, *Railletina spp.* في الدجاج والدجاج المخصص لوضع البيض.

الفصيلة العلاجية:
مستحضر مضاد لديدان الأمعاء عائلة ال-Benzimidazoles

4. موانع الاستعمال :
غير معروف

5. الأعراض الجانبية
يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية
عقب علاج دوائي" الموجود في صفحة المنزل التابعة لوزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه
للمنموذج الانترنتي للتبليغ عن الأعراض الجانبية،
أو من خلال دخول الرابط: [/https://sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

6. حيوانات الهدف:
الدجاج والدجاج المخصص لوضع البيض

7. الجرعة وطريقة الإعطاء
600 غرام فلوبنجال (30 ppm فلوبندزول) لطن علف. يجب الخلط أولاً مع 5 كغم علف ومن ثم يجب
خلط ما تبقى من العلف لاستكمال 1 طن.
يجب خلط المستحضر جيداً لداخل العلف.
يجب تقديم العلف الذي يحتوي على المستحضر لمدة 7 أيام متواصلة.

8. طريقة استعمال المستحضر
يقدم من خلال العلف حسب توجيهات البند 7.

9. فترة الانتظار-

للذبح للحم : 14 يوما
لتسويق البيض: 1 يوم

10. تحذيرات

استراتيجيات يجب تجنبها لأنها قد تؤدي لخطر زائد لتطور مقاومة ضد الديدان وتشمل:
- استعمال متواتر أكثر من اللازم ومتكرر لأدوية مضادة للديدان من نفس الفئة لمدة زمنية متواصلة
- نقص الجرعة

• تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة الشخص الذي يستعمل المستحضر

لمس هذا المستحضر قد يسبب حساسية في الجلد وتهيج في الجلد والعينين.
الأشخاص الذين يعانون من حساسية معروفة (تحسس) نحو فلوبندزول يجب أن يتجنبوا لمس المستحضر البيطري.
خلال خلط المستحضر في العلف، على العامل تجنب لمس المستحضر للجلد والعينين واستنشاقه وهذا من خلال استعمال معدات وقاية ملائمة. لذلك يجب ارتداء قفازات، قناع واق ونظارات واقية عند معالجة الطعام بهذا المستحضر.
يمنع التدخين، الأكل أو الشرب خلال لمس المستحضر.
يجب غسل اليدين بعد استعمال هذا المستحضر. وبعد لمس العلف للمادة الطبية.
في حال لمس الجلد و/أو العين، يجب الغسل فوراً بالكثير من الماء.
في حال ظهور أعراض بعد التعرض، مثل طفح في الجلد، استشر الطبيب
وخذ معك النشرة أو الملصق. التهاب في الوجه، الشفتين والعينين أو ضائقة تنفسية هي أعراض وخيمة أكثر توجب علاج طبي طارئ.

11. تعليمات التخزين

- امنع التسمم! هذا الدواء وأي دواء آخر يجب أن يحفظ في مكان مغلق بعيداً عن متناول الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ الصلاحية (Exp.) (Date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير من الشهر.

• ظروف التخزين : دون 25°C

12. تعليمات بخصوص التخلص من المستحضر/بقايا المستحضر في نهاية الاستعمال

كل ما يتبقى من مستحضر بيطري أو أي نفايات ناجمة عن استعمال مستحضر بيطري يجب أن تتلف على أنها نفايات سامة، لا يجوز رميها في المجاري.

13. معلومات إضافية

إضافة للمادة الفعالة يحتوي الدواء كذلك على: Lactose
كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: 600 غرام 1 في كيس "لامينت"
3 كغم في كيس "لامينت"

المنتج وصاحب التسجيل: بيوفاك م.ض، شارع هنيلان 30 المنطقة الصناعية الشمالية، أور عكيفا، 3060000

رقم تسجيل الدواء في سجل المستحضرات الحكومي في وزارة الصحة: 082-83-92321
أعد في تموز 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة