

إيسوميپرازول إينوقامد 20 ملغ

أقراص مقاومة في المعدة

المادة الفعالة

يحتوي كل قرص على:

Esomeprazole 20 mg

(as magnesium trihydrate)

إيسوميپرازول 20 ملغ

(كـ مغنيزيوم تريهيدرات)

إيسوميپرازول إينوقامد 40 ملغ

أقراص مقاومة في المعدة

المادة الفعالة

يحتوي كل قرص على:

Esomeprazole 40 mg

(as magnesium trihydrate)

إيسوميپرازول 40 ملغ

(كـ مغنيزيوم تريهيدرات)

للقائمة المواد غير الفعالة وموارد الحساسية في المستحضر أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

احفظ النشرة من الجائز أن تحتاجها ثانية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسطلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1) لأى غرض مخصص الدواء؟

لدى الكبار، إيسوميپرازول إينوقامد 20 ملغ - 40 ملغ مخصص:

• لعلاج الحرقان مع أو بدون إلتهاب المريء الناتج عن تيار مرتد لحموضة المعدة.

يقلل إيسوميپرازول إينوقامد من إنتاج الحموضة ويساهم في شفاء المريء بواسطة تقليل الألم والإلتهاب.

• لعلاج التقرحات في القسم العلوي من الأمعاء أو المعدة التي تسببها جرثومة هليكوباكتر بيلوري (*Helicobacter pylori*)

ومنع عودتها.

• لشفاء قرحة المعدة الناتجة عن تناول مستحضرات مضادة للإلتهاب اللا ستيروئيدية (NSAIDs)، المستعملة من

بين الأمور لعلاج إلتهاب المفاصل (الروماتيزم).

• لمنع تشكل التقرحات في المعدة، في حال إمكانية تطورها لديك نتيجة تناول مستحضرات مضادة للإلتهاب اللا ستيروئيدية (NSAIDs)، المستعملة من بين الأمور لعلاج إلتهاب المفاصل (الروماتيزم).

• لعلاج مطول بـ إيسوميپرازول إينوقامد أقراص لمنع حدوث نزف متكرر لقرحة المعدة أو الإثنى عشر، بعد علاج أولي بالمستحضر إيسوميپرازول داخل الوريد.

لدى المراهقين، إيسوميپرازول إينوقامد 20 ملغ مخصص:

• لعلاج الحرقان مع أو بدون إلتهاب المريء الناتج عن تيار مرتد لحموضة المعدة. يقلل إيسوميپرازول إينوقامد من

إنتاج الحموضة ويساهم في شفاء المريء بواسطة تقليل الألم والإلتهاب.

• لعلاج التقرحات في القسم العلوي من الأمعاء أو المعدة التي تسببها جرثومة هليكوباكتر بيلوري (*Helicobacter pylori*)

ومنع عودتها.

لدى المراهقين، إيسوميپرازول إينوقامد 40 ملغ مخصص:

• لعلاج الحرقان المترافق بإلتهاب المريء الناتج عن تيار مرتد لحموضة المعدة. يقلل إيسوميپرازول إينوقامد من

إنتاج الحموضة ويساهم في شفاء المريء بواسطة تقليل الألم والإلتهاب.

الفصيلة العلاجية

من مثبطات مضخات البروتونات (PPI) (مضخات الحموضة في المعدة).

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• وُجدت حساسية لإحدى مركباته (المفصلة في الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء").

• كنت حساساً (اليرجي) لمستحضر آخر من فصيلة مثبطات مضخة البروتون (مثلاً پانتوپرازول، لانسويپرازول، رابيپرازول، أوميپرازول).

• كنت تتناول مستحضر يحتوي على ثلفينافير (العلاج ضد HIV).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ إيسوميپرازول إينوقامد إحكام الطبيب إذا:

• كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الكبد.

• كنت تعاني من خلل خطير في وظيفة الكلى.

• عانيت ذات مرة من رد فعل جلدي بعد علاج بدواء مشابه لـ إيسوميپرازول إينوقامد الذي يقلل من حموضة المعدة.

• كنت مقدماً على إجراء فحص دم معين (クロムオーラン A Chromogranin A).

قد يحجب إيسوميپرازول إينوقامد أعراض أخرى. لذلك، إذا حصل لديك واحد مما يلي قبل أن تبدأ العلاج

بـ إيسوميپرازول إينوقامد أو خلال العلاج بـ إيسوميپرازول إينوقامد، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب:

• كنت تعاني من إنخفاض مجهول السبب في الوزن ووُجدت لديك صعوبات في البلع

• كنت تعاني من ألم في البطن أو من صعوبات في الهضم

• كنت تتقيأ طعام أو دم

• وُجد لديك براز أسود (براز دموي)

إذا كنت تتناول الدواء بحسب الحاجة (وفقاً لتعليمات الطبيب)، فعليك الإتصال بالطبيب في حال استمرار الأعراض

أو إذا طرأ أي تغير في الأعراض.

إن تناول مثبطات مضخة البروتون مثل إيسوميپرازول إينوقامد، خاصة لمدة تزيد عن سنة، فإن الأمر منوط بارتفاع

طفيف في الخطورة لحدوث كسور في عظام الفخذ، في رسم العيد أو في العمود الفقري. رجاءً بلغ الطبيب إذا وُجد

لديك مرض تخلخل العظام (osteoporosis) أو إذا كنت تتناول كورتيكosteroidات (التي يمكن أن تزيد من

خطورة حدوث مرض تخلخل العظام).

طفح وأعراض جلدية

إذا وُجد لديك طفح جلدي، خاصة في المناطق المعرضة للشمس، الرجاء بلغ الطبيب بأسرع ما يمكن لأنه من الجائز أن

تضطر إلى التوقف عن العلاج بـ إيسوميپرازول إينوقامد. إذا شعرت بأعراض مرضية إضافية، مثل آلام في المفاصل، يرجى أيضاً أن تبلغ الطبيب.

لقد حدث حالات طفح خطير لدى المتعالجين الذين تناولوا الدواء (أنظر الفقرة 4). يمكن أن يشمل الطفح تقرحات

في الفم، في الحنجرة، في الأنف، في الأعضاء التناسلية وإلتهاب الملتحمة (احمرار وإنفاس العينين). إن حالات الطفح

الخطير هذه تظهر على الأغلب بعد أعراض شبيهة بالإنفلونزا، مثل: سخونة، صداع وآلام في الجسم. قد يغطي الطفح

أجزاء واسعة من الجسم بحويصلات وتنشر للجلد. إذا تطور لديك خلال العلاج (حتى بعد عدة أسابيع) طفح أو إحدى

الأعراض الجلدية تلك، توقف عن تناول هذا الدواء وتوجه فوراً إلى الطبيب.

الأطفال والمراهقون

إيسوميپرازول إينوقامد غير مخصص للإستخدام لدى الأطفال دون عمر 12 سنة.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية،

إحكام الطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

لا يجوز تناول إيسوميپرازول إينوقامد إذا كنت تتعالج بمستحضر يحتوي على ثلفينافير (دواء لعلاج ضد HIV).

إحكام للطبيب أو للصيدلي إذا كنت تتناول:

• أتازانافير (العلاج ضد HIV)

• كيتوكونازول، إيتراكونازول أو ثوريكونازول (العلاج للتلوثات الفطرية)

• سيتالوپرام، ايمپيرامين أو كلومپرامين (العلاج الإكتئاب)

• إيرلوتینيب (العلاج للسرطان)

• ديزاپرام (العلاج القلق، إرخاء العضلات أو الصرع)

• فينتوتينين (الصرع). إذا كنت تتناول فينتوتينين، سوف يضطر الطبيب عند بدء العلاج بـ إيسوميپرازول

إينوقامد أو عند إنتحائه.

• أدوية ممضة للدم مثل وارفارين، سوف يضطر الطبيب إلى متابعتك عند بدء العلاج بـ إيسوميپرازول إينوقامد أو

عند إنتحائه.

• كلوبيدوغريل (دواء يستعمل لمنع تشكيل الخثرات الدموية)

• ديجوكسين (المشاكل في القلب)

• ريفامپسيين (العلاج السل)

• سانت جون وورت (هيبيريكوم بيرفوراتوم) (العلاج الإكتئاب)

• سيلولوستازول (العرج المتقطع). ألم في الرجلين أثناء المشي الناجم عن نقص في تزويد الدم

• ميتوتریکسات (دواء كيميائي المستعمل بمقدار دوائي عالي لعلاج السرطان). إذا كنت تتناول مقدار دوائي عالي

من ميتوتریکسات، بإمكانك الطبيب أن يوصيك بالتوقف بشكل مؤقت عن العلاج بـ إيسوميپرازول إينوقامد

• تاکرولیموس (بعد زرع الأعضاء)

• سیزپرید (العلاج المشاكل الهضمية والحرقان)

إذا كنت تلتقي إيسوميپرازول إينوقامد سوية مع كلاريتروميسين وأموکسیسللين (مضادات حيوية) لعلاج القرحة

الناتجة عن جرثومة هليكوباكتر بيلوري، فمن المهم جداً أن تبلغ الطبيب عن أي دواء إضافي

يمكن أن يؤثر هذا الدواء على إمتصاص فيتامين B12 في الجسم، خاصة إذا كنت بحاجة لتناوله لفترة زمنية طويلة. توجه

إلى الطبيب إذا تلاحظ أي عرض من بين الأعراض التالية، الذي يمكن أن يشير إلى إنخفاض نسبة فيتامين B12:

• إرهاق حاد أو قلة الحيوية

• تتميل (دبابيس وإبر)

• حساسية أو إحمرار في اللسان، تقرحات في الفم

• ضعف عضلي

• إضطرابات في الذاكرة، إرثاب، إكتئاب

• مشاكل في الدوام، الطعام

إستعمال القرص مع الطعام أو على معدة خاوية.

الحمل، الإرضاخ والخصوبة

إذا كنت حاملاً، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، فيجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

سوف يقرر الطبيب فيما إذا كان بإمكانك تناول هذا الدواء خلال هذه الفترة.

لا يعرف فيما إذا كان إيسوميپرازول إينوقامد ينتقل إلى حليب الأم، لذا، لا تستعمل إيسوميپرازول إينوقامد إذا كنت مرضعة.

السيادة واستعمال الماكنات

من غير المفترض أن يؤثر إيسوميپرازول إينوقامد على السيادة أو على إستعمال الماكنات. لكن، يمكن أن

تحدد أعراض جانبية مثل دوار أو تشوش في الرؤية بوتيرة غير شائعة أو نادرة (أنظر الفقرة 4).

إذا كنت تعاني من تلك الأعراض الجانبية، فلا تقد ولا تستعمل الماكنات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

تحتوي الأقراص على سكروز (نوع معين من السكر). إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة،

فإيسترشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا

بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

إذا كنت تتناول الدواء مطولة (خاصة لأكثر من سنة)، فسيزداد الطبيب في إجراء متابعة معينة.

إذا أوصاك الطبيب بتناول الدواء بحسب الحاجة، إحكام للطبيب إذا كان هناك تغير في الأعراض.

سوف يشرح لك الطبيب حول تناول الدواء (كم عدد الأقراص ومتى تتناولها). عيار القرص والمدة الزمنية للعلاج يتم

تحديدها من قبل الطبيب وفق المرض الذي تعاني منه، العمر ونشاط الكبد.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

الاستعمال لدى الكبار بعمر 18 سنة وما فوق

العلاج للحرقان الناتج عن تيار مرتد لحموضة المعدة:

• إذا وجد الطبيب إصابة طفيفة بالمريء، فإن المقدار الدوائي الموصى به هو قرص واحد من إيسوميپرازول إينوقامد

40 ملغ مرتدة في اليوم لمدة 4 أسابيع. من شأن الطبيب أن يوصيك بتناول نفس المقدار الدوائي لمدة 4 أسابيع

إضافية إذا لم يشفى المريء بعد.

• إن المقدار الدوائي الموصى به هو قرص واحد من إيسوميپرازول إينوقامد 20 ملغ مرتدة في اليوم لمدة واحدة

في اليوم.

• إذا لم يصاب المريء، فإن المقدار الدوائي الموصى به هو قرص واحد من إيسوميپرازول إينوقامد 20 ملغ يومياً.

بعد تحقيق السيطرة على المرض، قد يصدر لك الطبيب تعليمات بتناول الدواء حسب الحاجة، بحد أقصى قدره

قرص واحد من إيسوميپرازول إينوقامد 20 ملغ يومياً.

إذا كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الكبد، فمن شأن الطبيب أن يصف لك مقداراً دوائياً منخفضاً أكثر.

العلاج للقرح الناتجة عن تلوث هليكوباكتر بيلوري ومنع تكرارها:

• إن الم

علاج قُروح المعدة الناجمة عن NSAIDs (مضادات الإلتهاب اللا ستيروئيدية):

- إن المقدار الدوائي الموصى به هو قرص واحد من إيسوميبرازول إينوفاً مدمد 20 ملغ مرة واحدة في اليوم لمدة 4 حتى 8 أسابيع.

للوقاية من قُروح المعدة إذا كنت تتناول NSAIDs (مضادات الإلتهاب اللا ستيروئيدية):

- إن المقدار الدوائي الموصى به هو قرص واحد من إيسوميبرازول إينوفاً مدمد 20 ملغ مرة واحدة في اليوم.
- العلاج المطول بعد منع الأنزفة المتكررة من القرح بواسطة إستعمال مستحضر إيسوميبرازول داخل الوريد:
- إن المقدار الدوائي الموصى به هو قرص واحد من إيسوميبرازول إينوفاً مدمد 40 ملغ مرة واحدة في اليوم لمدة 4 أسابيع.

الإستعمال لدى المراهقين بعمر 12 سنة وما فوق

لعلاج الحرقان الناتج عن تياير مرتد لحموضة المعدة:

- إذا وجد الطبيبإصابة طفيفة في المريء، فإن المقدار الدوائي الموصى به هو قرص واحد من إيسوميبرازول إينوفاً مدمد 40 ملغ مرة واحدة في اليوم لمدة 4 أسابيع. قد يصدر لك الطبيب تعليمات بتناول نفس المقدار الدوائي لمدة 4 أسابيع إضافية إذا لم يشفى المريء بعد.
- إن المقدار الدوائي الموصى به بعد شفاء المريء هو قرص واحد من إيسوميبرازول إينوفاً مدمد 20 ملغ مرة واحدة في اليوم.
- إذا لم يصاب المريء، فإن المقدار الدوائي الموصى به هو قرص واحد من إيسوميبرازول إينوفاً مدمد 20 ملغ يومياً.
- إذا كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الكبد، فقد يعطيك الطبيب مقداراً دوائياً منخفضاً أكثر.

لعلاج القرح الناجمة عن تلوث هيليكوباكتر بيلوري ومنع تكرارها:

- إن المقدار الدوائي الموصى به هو قرص واحد من إيسوميبرازول إينوفاً مدمد 20 ملغ مرتين في اليوم لمدة أسبوع واحد.
- ذلك، سيصدر لك الطبيب تعليمات بتناول مضادات حيوية، على سبيل المثال أموكسيسيلين وكلاريتروميسين.

طريقة الإستعمال

- بالإمكان تناول القرص في أي ساعة خلال اليوم.
- يجب بلع القرص بشكله الكامل مع كأس من الماء، لا يجوز مضخ أو سحق القرص. وذلك لأن القرص يحتوي على جزيئات مطلية (coated pellets) لمنع تفكك الدواء من قبل حمض المعدة. من المهم عدم إلحاق الضرر بالجزيئات.

الدواء غير مخصص للإستعمال عبر أنبوب التغذية.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

المسنون

لا حاجة لملاءمة المقدار الدوائي لدى المسنون.

- إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد فيجب تناول المقدار الدوائي حال تذكرك. لكن، في حالة تذكرك قريباً لزمن تناول المقدار الدوائي التالي، فلا يجوز تناول المقدار الدوائي المنسى، بل تناول المقدار الدوائي التالي في الوقت المحدد.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إيسوميبرازول إينوفاً مدمد قد يسبب أعراض جانبية لدى بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز لا تعاني أي منها.

الأعراض الجانبية التي تقتضي إهتماماً خاصاً:

توقف عن العلاج وراجع الطبيب فوراً في الحالات التالية:

- إصفار الجلد، بول داكن وإرهاق التي يمكن أن تكون أعراض لمشاكل في الكبد. هذه الأعراض نادرة وقد تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين 1,000.

ظهور مقاوجي لطفح خطير أو إحمرار في الجلد مع حويصلات أو تقرش يمكن أن تحدث أيضاً بعد عدة أسابيع من العلاج من الجائز أيضاً حدوث حويصلات خطيرة وأنزفة في الشفتين، العينين، الفم، الأنف والأعضاء التناسلية. قد تتطور حالات الطفح الجلدي إلى ضرر جلدي واسع خطير (تقشر البشرة والأعنة المخاطية السطحية) مع تداعيات تشكل خطراً على الحياة. هذه قد تكون حامياً متعددة الأشكال، متلازمة ستيفنس - جونسون، إنحلال البشرة النخري السمي أو رد فعل للدواء مع كثرة الاليوزينيات وأعراض جهازية. هذه الأعراض هي نادرة جداً وقد تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين 10,000.

صفير مقاوجي أثناء التنفس، إنفاخ الشفتين، اللسان والحنجرة أو الجسم، طفح، إغماء أو صعوبات في البلع - هذه علامات لرد فعل تحسيسي شديد. هذه الأعراض نادرة وقد تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين 1,000.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة (common)، أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

- صداع
- تأثيرات على البطن والأمعاء: إسهال، ألم في البطن، إمساك، غازات، غثيان وقيءات
- سلام حميدة في المعدة

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

- إنتفاخ الرجلين والakahlin

مشكل في النوم (أرق)

دوار، شعور بوخذ ("دبابيس وابر")، ميل للنوم

شعور بدوران (غيرتيغو)

جفاف في الفم

تغيرات في فحوص الدم لوظائف الكبد

طفح جلدي، طفح درني (شرى) وحكة في الجلد

كسور في الحوض، في رسم الخط أو في العمود الفقري (عند إستعمال إيسوميبرازول إينوفاً مدمد بمقدار دوائي عالي

ولفتره طويلة)

أعراض جانبية نادرة (rare) أعراض التي تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:

- مشاكل في الدم كانخفاض في عدد الخلايا البيضاء أو الصفائح الدموية - يمكن أن تسبب ضعف، كدمات، أو زيادة خطورة حصول تلوثات

نسبة منخفضة للصوديوم في الدم - يمكن أن تسبب ضعف، تقيؤات ونقلصات

عدم هدوء، إرثيا، إكتئاب

تغيرات في المذاق

مشاكل في الرؤية مثل تشوش الرؤية

ظهور مقاوجي لصفير أثناء التنفس أو ضيق في التنفس (تضيق القصبة الهوائية)

إنفاس في الجزء الداخلي للجسم

تلوث فطري يُسمى القلاع يمكن أن يؤثر على الأمعاء

مشاكل في الكبد، بما في ذلك يرقان يمكن أن يسبب إصفار الجلد، بول غامق وإرهاق

تساقط شعر

طفح جلدي عند التعرض للشمس

آلام مفصلية أو آلام عضلية

شعور بالمرض وقلة الحيوية

فرط التعرق

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروفة (أعراض لم يُحدد شيوهاً بعد):

- نسبة منخفضة للمغنتيزيوم في الجسم: إذا كنت تتناول إيسوميبرازول إينوفاً مدمد لأكثر من ثلاثة أشهر، فإن نسب المغنتيزيوم في دمك قد تنخفض، إن أعراض التي قد تدل على إنخفاض في نسبة سخونة عالية وألم في المفاصل عضلية لا إرادية، توهان، إختلالات، دوار أو زيادة في نظم القلب. رجاءً بلغ الطبيب فوراً إذا شعرت بهذه الأعراض.

قد يؤدي إنخفاض نسب المغنتيزيوم أيضاً إلى إنخفاض في نسب البوتاسيوم أو الكالسيوم في الدم.

تغيرات في تعداد الدم، بما في ذلك ندرة المحببات (إنخفاض خلايا الدم البيضاء)

عدوانية

رؤيا، شعور أو سماع أشياء غير موجودة (هلوسات)

مشاكل خطيرة في الكبد، التي تؤدي إلى قصور كبيدي وإنفاس في الدماغ

ضعف عضلي

مشاكل خطيرة في الكلية

تضخم الثديين لدى الرجال

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروفة غير معروفة (أعراض لم يُحدد شيوهاً بعد):

- نسبة منخفضة للمغنتيزيوم في الجسم: إذا كنت تتناول إيسوميبرازول إينوفاً مدمد لأكثر من ثلاثة أشهر، فإن نسب المغنتيزيوم في دمك قد تنخفض، إن أعراض التي قد تدل على إنخفاض في نسبة سخونة عالية وألم في المفاصل عضلية لا إرادية، توهان، إختلالات، دوار أو زيادة في نظم القلب. رجاءً بلغ الطبيب فوراً إذا شعرت بهذه الأعراض.

قد يؤدي إنخفاض نسب المغنتيزيوم أيضاً إلى إنخفاض في نسب البوتاسيوم أو الكالسيوم في الدم.

من شأن الطبيب أن يقرر إجراء فحوص دم بشكل دائم لمتابعة نسب المغنتيزيوم لديك.

إلتهاب في الأمعاء (بسبب الإسهال)

طفح، عادة يتراافق بالآلام في المفاصل

قد يؤثر إيسوميبرازول إينوفاً مدمد على أحد الأعراض الآتية:

- مشاكل في الدم كانخفاض في عدد الخلايا البيضاء أو الصفائح الدموية - يمكن أن تسبب ضعف، كدمات، أو زيادة خطورة حصول تلوثات

نسبة منخفضة للصوديوم في الدم - يمكن أن تسبب ضعف، تقيؤات ونقلصات

عدم هدوء، إرثيا، إكتئاب

تغيرات في المذاق

مشاكل في الرؤية مثل تشوش الرؤية

ظهور مقاوجي لصفير أثناء التنفس أو ضيق في التنفس (تضيق القصبة الهوائية)

إنفاس في الجزء الداخلي للجسم

تلوث فطري يُسمى القلاع يمكن أن يؤثر على الأمعاء

مشاكل في الكبد، بما في ذلك يرقان يمكن أن يسبب إصفار الجلد، بول غامق وإرهاق

تساقط شعر

طفح جلدي عند التعرض للشمس

آلام مفصلية أو آلام عضلية

شعور بالمرض وقلة الحيوية

فرط التعرق

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروفة (أعراض لم يُحدد شيوهاً بعد):

- نسبة منخفضة للمغنتيزيوم في الجسم: إذا كنت تتناول إيسوميبرازول إينوفاً مدمد لأكثر من ثلاثة أشهر، فإن نسب المغنتيزيوم في دمك قد تنخفض، إن أعراض التي قد تدل على إنخفاض في نسبة سخونة عالية وألم في المفاصل عضلية لا إرادية، توهان، إختلالات، دوار أو زيادة في نظم القلب. رجاءً بلغ الطبيب فوراً إذا شعرت بهذه الأعراض.

قد يؤدي إنخفاض نسب المغنتيزيوم أيضاً إلى إنخفاض في نسب البوتاسيوم أو الكالسيوم في الدم.

تغيرات في تعداد الدم، بما في ذلك ندرة المحببات (إنخفاض خلايا الدم البيضاء)

عدوانية

رؤيا، شعور أو سماع أشياء غير موجودة (هلوسات)

مشاكل خطيرة في الكبد، التي تؤدي إلى قصور كبيدي وإنفاس في الدماغ

ضعف عضلي

مشاكل خطيرة في الكلية

تضخم الثديين لدى الرجال

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروفة (أعراض لم يُحدد شيوهاً بعد):

- نسبة منخفضة للمغنتيزيوم في الجسم: إذا كنت تتناول إيسوميبرازول إينوفاً مدمد لأكثر من ثلاثة أشهر، فإن نسب المغنتيزيوم في دمك قد تنخفض، إن أعراض التي قد تدل على إنخفاض في نسبة سخونة عالية وألم في المفاصل عضلية لا إرادية، توهان، إختلالات، دوار أو زيادة في نظم القلب. رجاءً بلغ الطبيب فوراً إذا شعرت بهذه الأعراض.

قد يؤدي إنخفاض نسب المغنتيزيوم أيضاً إلى إنخفاض في نسب البوتاسيوم أو الكالسيوم في الدم.

تغيرات في تعداد الدم، بما في ذلك ندرة المحببات (إنخفاض خلايا الدم البيضاء)

عدوانية

رؤيا، شعور أو سماع أشياء غير موجودة (هلوسات)

مشاكل خطيرة في الكبد، التي تؤدي إلى قصور كبيدي وإنفاس في الدماغ

ضعف عضلي

مشاكل خطيرة في الكلية

تضخم الثديين لدى الرجال

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروفة (أعراض لم يُحدد شيوهاً بعد):

- نسبة منخفضة للمغنتيزيوم في الجسم: إذا كنت تتناول إيسوميبرازول إينوفاً مدمد لأكثر من ثلاثة أشهر، فإن نسب المغنتيزيوم في دمك قد تنخفض، إن أعراض التي قد تدل على إنخفاض في نسبة سخونة عالية وألم في المفاصل عضلية لا إرادية، توهان، إختلالات، دوار أو زيادة في نظم القلب. رجاءً بلغ الطبيب فوراً إذا شعرت بهذه الأعراض.

قد يؤدي إنخفاض نسب المغنتيزيوم أيضاً إلى إنخفاض في نسب البوتاسيوم أو الكالسيوم في الدم.

تغيرات في تعداد الدم، بما في ذلك ندرة المحببات (إنخفاض خلايا الدم البيضاء)

عدوانية

رؤيا، شعور أو سماع أشياء غير موجودة (هلوسات)

مشاكل خطيرة في الكبد، التي تؤدي إلى قصور كبيدي وإنفاس في الدماغ

ضعف عضلي

مشاكل خطيرة في الكلية

تضخم الثديين لدى الرجال

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروفة (أعراض لم يُحدد شيوهاً بعد):

- نسبة منخفضة للمغنتيزيوم في الجسم: إذا كنت تتناول إيسوميبرازول إينوفاً مدمد لأكثر من ثلاثة أشهر، فإن نسب المغنتيزيوم في دمك قد تنخفض، إن أعراض التي قد تدل على إنخفاض في نسبة سخونة عالية وألم في المفاصل عضلية لا إرادية، توهان، إختلالات، دوار أو زيادة في نظم القلب. رجاءً بلغ الطبيب فوراً إذا شعرت بهذه الأعراض.

قد يؤدي إنخفاض نسب المغنتيزيوم أيضاً إلى إنخفاض في نسب البوتاسيوم أو الكالسيوم في الدم.

تغيرات في تعداد الدم، بما في ذلك ندرة المحببات (إنخفاض خلايا الدم البيضاء)

عدوانية

رؤيا، شعور أو سماع أشياء غير موجودة (هلوسات)

مشاكل خطيرة في الكبد، التي تؤدي إلى قصور كبيدي وإنفاس في الدماغ

ضعف عضلي

مشاكل خطيرة في الكلية

تضخم الثديين لدى الرجال

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروفة (أعراض لم يُحدد شيوهاً بعد):

- نسبة منخفضة للمغنتيزيوم في الجسم: إذا كنت تتناول إيسوميبرازول إينوفاً مدمد لأكثر من ثلاثة أشهر، فإن نسب المغنتيزيوم في دمك قد تنخفض، إن أعراض التي قد تدل على إنخفاض في نسبة سخونة عالية وألم في المفاصل عضلية لا إرادية، توهان، إختلالات، دوار أو زيادة في نظم القلب. رجاءً بلغ الطبيب فوراً إذا شعرت بهذه الأعراض.