

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

סטטור 5
סטטור 10
סטטור 20
סטטור 40
טבליות מצופות

הרכב:

כל טבליית **סטטור 5** מכילה: רוסובסטטין (כמלח סידן) 5 מ"ג
Rosuvastatin (as calcium salt) 5 mg
כל טבליית **סטטור 10** מכילה: רוסובסטטין (כמלח סידן) 10 מ"ג
Rosuvastatin (as calcium salt) 10 mg
כל טבליית **סטטור 20** מכילה: רוסובסטטין (כמלח סידן) 20 מ"ג
Rosuvastatin (as calcium salt) 20 mg
כל טבליית **סטטור 40** מכילה: רוסובסטטין (כמלח סידן) 40 מ"ג
Rosuvastatin (as calcium salt) 40 mg

למרכיבים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר אנא ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

התרופה אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

סטטור מותווה להורדת רמות גבוהות של כולסטרול וטריגליצרידים בדם כאשר שינויים בדיאטה והתעמלות נכשלו לעשות זאת. בעת הטיפול ב**סטטור** יש להמשיך בדיאטה להפחתת כמות הכולסטרול במזון ובפעילות הגופנית. רמות גבוהות של כולסטרול בדם עלולות לגרום לסיכון של התקף לב או לשבץ.

קבוצה תרפויטית

מעכב אנזים HMG-CoA reductase.

סטטור שייכת לקבוצת תרופות הנקראת סטטינים, פועלת להורדת רמת השומנים בדם, הנפוץ ביותר נקרא כולסטרול. ישנם מספר סוגי כולסטרול בדם: "כולסטרול רע" ו"כולסטרול טוב". **סטטור** פועלת ומסייעת לגוף לחסום את ייצור ה"כולסטרול הרע" ובפניו מהגוף ומסייעת להעלות את רמות ה"כולסטרול הטוב".

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- הינך רגיש לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף").
- הינך בהיריון או מניקה. אם נכנסת להיריון תוך כדי שימוש ב**סטטור**, הפסיקי ליטול **סטטור** מיידית וידעי את הרופא שלך. יש להימנע מכניסה להיריון על ידי שימוש באמצעי מניעה מתאימים.
- יש לך מחלת כבד.
- הינך סובל מבעיות כליה חמורות.
- הינך סובל ממיחושים או כאבי שרירים חוזרים או בלתי מוסברים.
- הינך נוטל שילוב תרופתי של סופוסבוביר/ולפטסביר/ווקסילפרביר (המשמשות לטיפול בזיהום ויראלי של הכבד הנקרא הפטיטיס C).
- הינך נוטל ציקלוספורין (למשל לאחר השתלת אברים).
- הינך מתחת לגיל 18.
- אם אחד מאלו נוגע אליך (או אם יש לך ספק), אנא פנה לרופא שלך.

בנוסף, אין להשתמש בטבליות של 40 מ"ג (המינון הגבוה ביותר) אם:

- הינך סובל מבעיות מתונות בתפקוד הכליה (במידה ויש ספק, אנא פנה לרופא).
- הינך סובל מבעיות בפעילות בלוטת התריס (תירואיד).
- הינך סובל ממיחושים או כאבים חוזרים או בלתי מוסברים בשרירים, אם הינך בעל עבר משפחתי או אישי של בעיות בשרירים, או סבלת בעבר מבעיות בשרירים בעת שילת תרופות אחרות להורדת כולסטרול.
- הינך צורך כמויות גדולות של אלכוהול באופן קבוע.
- מוצאך אסיאתי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, ויאטנמי, יפני).
- הינך נוטל תרופות להורדת כולסטרול הנקראות פיברטים.

אנא פנה לרופא אם אחד מאלו נוגע אליך (או אם יש לך ספק).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בסטור לפני הטיפול בסטור ספר לרופא אם:

- הינך סובל מליקוי בתפקוד הכבד, הכליות או בלוטת התריס.
- הינך סובל ממיחושים או כאבים חוזרים או בלתי מוסברים בשרירים, או אם אתה סבלת או בן משפחתך סבל בעבר מבעיות בשרירים, או שיש לך היסטוריה של בעיות בשרירים בעת נטילת תכשירים להורדת כולסטרול. יש ליידע מיד את הרופא המטפל אם מופיעים מיחושים או כאבים בלתי מוסברים בשרירים, במיוחד אם אלו מלווים בהרגשה כללית לא טובה או חום. יש ליידע את הרופא גם במידה והינך סובל מחולשת שרירים מתמשכת.
- הינך סובל או סבלת בעבר ממיאסטניה (מחלה עם חולשת שרירים כללית הכוללת לעיתים שרירים המשמשים בנשימה), או מיאסטניה אוקולרית (מחלה הגורמת לחולשה בשרירי העין), מאחר וסטטינים לעיתים עלולים להחריף את המחלה או לגרום להתרחשותה (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").
- אם אי פעם פיתחת פריחה חמורה בעור או קילוף בעור, שלפוחיות ו/או כאבים בפה לאחר נטילת **סטור** או תרופות קשורות אחרות.
- הינך צורך כמויות גדולות של אלכוהול באופן קבוע.
- הינך נוטל תרופות נוספות להורדת כולסטרול הנקראות פיברטים. אנא קרא עלון זה בעיון אף אם השתמשת בתרופות להורדת כולסטרול בעבר.
- הינך נוטל תרופות המיועדות לטיפול בנגיף הכשל החיסוני האנושי (HIV) כגון: ריטונאביר עם לופינביר ו/או אטאזאנאביר. אנא פנה לסעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופות".
- הינך נוטל או נטלת אנטיביוטיקה המכילה חומצה פוסידית ב-7 הימים האחרונים (לטיפול בזיהום חיידקי בבליעה או בהזרקה). השילוב של חומצה פוסידית ו**סטור** עלול לגרום לבעיות שריר חמורות (רבזימילודיס). אנא פנה לסעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופות".
- הינך מעל לגיל 70 (הרופא יבחר מינון התחלתי של **סטור** המתאים לך).
- הינך סובל מכשל נשימתי חמור.
- מוצאך אסיאתי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, ויאטנמי, יפני). הרופא יבחר מינון התחלתי של **סטור** המתאים לך.

אם אחד המצבים הרשומים מעלה מתייחסת אליך (או אם אינך בטוח):

אל תיטול **סטור 40 מ"ג** (המינון הגבוה ביותר) ובדוק עם הרופא או הרוקח שלך לפני תחילת השימוש של **סטור** בכל מינון.

תגובות עור חמורות כולל תסמונת סטיבנס-ג'ונסון ותסמונת התגובה התרופתית עם אאזנופיליה ותסמינים מערכתיים (DRESS) דווחו בהקשר לטיפול ב**סטור**. הפסק להשתמש ב**סטור** ופנה לעזרה רפואית מיידיית אם הינך מבחין באחד מהתסמינים המתוארים בסעיף 4 "תופעות לוואי".

במספר קטן של מטופלים, סטטינים עלולים להשפיע על הכבד, דבר המזוהה בבדיקת דם פשוטה הבודקת עליה ברמות אנזימי הכבד. לכן, הרופא יבקש לבצע בדיקות דם של תפקודי כבד, לפני ובמהלך הטיפול ב**סטור**.

בזמן שהינך מטופל בתרופה זו, הרופא שלך יבצע מעקב הדוק אם יש לך סוכרת או הינך בסיכון לפתח סוכרת. ייתכן שהינך בסיכון לפתח סוכרת אם יש לך רמות גבוהות של סוכרים ושומנים בדם, או אם יש לך משקל עודף ולחץ דם גבוה.

ילדים ומתבגרים

סטור אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנה.

אינטראקציות/תגובות בין תרופות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיוחד עם אתה לוקח:

- ציקלוספורין (בשימוש לאחר השתלת איברים).
- וארפרין, קלופידוגרל, טיקגרגלור (או כל תרופה אחרת לדילול דם).
- פיברטים (כגון גמפיברזיל או פנופיברט) או כל תרופה אחרת להורדת כולסטרול (כגון אזטימיב).
- תרופות לקלוקל קיבה (משמשות כסותרי חומצה בקיבה).
- אריתרומיצין (אנטיביוטיקה). חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה- ראה למטה וכן בסעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בסטור").
- גלולות למניעת היריון.
- גורפניב (לטיפול בסרטן).
- דרולוטמיד (לטיפול בסרטן).
- קפמטיניב (לטיפול בסרטן).
- טיפול הורמונלי תחליפי.
- פוסטמטיניב (לטיפול בספירת טסיות נמוכה).
- פבוקסוסט (לטיפול ומניעה של רמות גבוהות של חומצת שתן בדם).
- טריפלונמיד (לטיפול בטרשת נפוצה).
- תרופות לטיפול בזיהומים ויראליים, כולל נגיף הכשל החיסוני האנושי (HIV) או דלקת כבד (הפטיטיס מסוג C), לבד או בשילוב עם (אנא ראה סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בסטור") ריטונאביר, לופינביר, אטאזאנאביר, סופוסבוביר, ווקסילפרביר, אומביאסביר, פריטפרביר, דסאבוביר, ולפטסביר, גרזופרביר, אלבסביר, גלקפרביר, פיברנטסביר. ההשפעה של תרופות אלו עלולה להשתנות על-ידי שימוש בו-זמנית עם **סטור** או שהן עלולות לשנות את ההשפעה של **סטור**.
- חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה)- אם עליך ליטול חומצה פוסידית במתן פומי לטיפול בזיהום חיידקי, יהיה עליך להפסיק באופן זמני את הטיפול ב**סטור**. הרופא יאמר לך מתי ניתן לחזור ליטול את התרופה. נטילת **סטור** עם חומצה פוסידית עלולה לגרום לעיתים נדירות לחולשה, רגישות או כאבים בשרירים (רבזימילודיס).

נא ראה מידע נוסף לגבי רבדומיולוזיס בסעיף 4 "תופעות לוואי".

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול סטטור ללא קשר למזון.

היריון, הנקה ופוריות

אין ליטול סטטור אם הינך בהיריון או מניקה. אם נכנסת להיריון תוך כדי שימוש בסטטור הפסיקי ליטול סטטור מיידית ויידעי את הרופא שלך. יש להימנע מכניסה להיריון על-ידי שימוש באמצעי מניעה מתאימים בתקופת הטיפול בתרופה זו. היוועצי עם רופא או הרוקח שלך לפני נטילה של כל תכשיר.

נהיגה ושימוש במכונות

מרבית המטופלים יכולים לנהוג ברכב ולתפעל מכונות בזמן השימוש בסטטור – התרופה לא תפגום בכשירותם לבצע פעולות אלו. אולם חלק מהמטופלים עלולים לחוש סחרחורת תוך כדי השימוש בסטטור. במידה והינך חש סחרחורת עליך לפנות לרופא בטרם הפעלת מכונות או נהיגה ברכב.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה לקטוז. אם נאמר לך על-ידי הרופא שהינך סובל מאי-סבילות לסוכרים מסוימים (לקטוז או סוכרי חלב), היוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו. אנא ראה סעיף 6- "מידע נוסף".

כל טבליית סטטור 5 מכילה 14.5 מ"ג של לקטוז.

כל טבליית סטטור 10 מכילה 29 מ"ג של לקטוז.

כל טבליית סטטור 20 מכילה 58 מ"ג של לקטוז.

כל טבליית סטטור 40 מכילה 116 מ"ג של לקטוז.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

הטיפול עם סטטור יתחיל עם טבלייה אחת של 5 מ"ג או 10 מ"ג פעם ביום, גם אם נטלת לפני כן סטטינים אחרים במינון גבוה יותר.

הבחירה במינון ההתחלתי תהיה תלויה ב:

- רמת כולסטרול.
- רמת הסיכון שתלקה בהתקף לב או שבץ מוחי.
- מידת הסבירות כי תהיה רגיש יותר לתופעת לוואי אפשרית.

ייתכן כי הרופא יחליט לתת את המינון הנמוך ביותר 5 מ"ג כאשר:

- מוצאך אסיאתי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, ויטנמי, יפני).
- הינך בן 70 ומעלה.
- הינך סובל מבעיות מתונות בתפקוד הכליה.
- הינך בסיכון לסבול מכאבי שרירים (מיופתיה).

העלאת המינון ומינון יומי מירבי

ייתכן והרופא יחליט להעלות את המינון שהינך נוטל על מנת שיתאים עבורך. במידה והתחלת עם מינון של סטטור 5 מ"ג, ייתכן והרופא יכפיל את המינון לסטטור 10 מ"ג, לאחר מכן 20 מ"ג ובמידת הצורך יעלה ל-40 מ"ג. במידה והתחלת עם מינון של סטטור 10 מ"ג, ייתכן והרופא יכפיל את המינון ל-20 מ"ג, לאחר מכן במידת הצורך יעלה ל-40 מ"ג. יהיה מרווח של 4 שבועות בין כל העלאת מינון. המינון המקסימלי היומי הינו 40 מ"ג וניתן בדרך כלל לחולים עם רמות גבוהות מאוד של כולסטרול וסיכון גבוה ללקות בהתקף לב או שבץ מוחי, כאשר רמות הכולסטרול אינן יורדות מספיק עם 20 מ"ג..

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נוטלים סותר חומצה מסוג מלחי אלומיניום או מגנזיום, יש ליטול את הסטטור לפחות שעתיים לפני נטילה של סותר חומצה מסוג מלחי אלומיניום/מגנזיום.

יש לבדוק את רמות הכולסטרול באופן קבוע, על מנת לוודא שהכולסטרול שלך הגיע לרמה הרצויה ושרמה זו נשמרת.

ייתכן שהרופא יחליט להעלות את המינון של התכשיר על מנת שתיקח את כמות הסטטור שמתאימה לך.

ניתן ליטול התרופה בכל שעות היום עם או ללא אוכל. מומלץ ליטול את התרופה מדי יום בשעה קבועה.

יש לבלוע הטבליות בשלמותן עם מים.

אין לחצות את סטטור 15 במידת הצורך ניתן לחצות את סטטור 10, סטטור 20 וסטטור 40 לשימוש מייד.

אין מידע לגבי כתישה או לעיסה של הטבלייה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עליך ליצור קשר עם הרופא או לפנות לבית החולים.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה, יש לדלג על המנה שנשכחה וליטול את המנה הבאה בהתאם ללוח הזמנים הרגיל.

אין ליטול שתי מנות ביחד לפצות על זו שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.
אם אתה מפסיק את נטילת התרופה רמות הכולסטרול שלך עשויות לעלות שוב.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסטטור עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת, הפסק את הטיפול בסטטור ופנה לרופא מייד אם:

- יש לך אחת מתגובת רגישות היתר (אלרגיה) הבאות:
 - קושי נשימתי עם או בלי נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ו/או בגרון.
 - נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ו/או בגרון, שעשויות לגרום לקשיי בליעה.
 - גרד חריף בעור (עם הופעת שלפוחיות מורמות).
 - כתמים אדמדמים שאינם מוגבהים, דמויי מטרה או מעגלים על הגוף, לעיתים עם שלפוחיות במרכז, קילוף עור, כיבים בפה, בגרון, באף באיברי המין ובעיניים. לפריחות עור חמורות אלו יכול להיות שקדמו חום ותסמיני דמויי שפעת (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון).
- פריחה ממושטת חום גבוה ובלוטות לימפה מוגדלות (תסמונת DRESS או תסמונת רגישות היתר).
- יש לך כאבי שרירים ומיחושים לא רגילים, אשר נמשכים זמן רב יותר מהמצופה. כמו עם סטטינים אחרים, מספר מצומצם של מטופלים חוו השפעה בלתי נעימה בשרירים, ולעיתים נדירות תופעה זו הופכת למסכנת חיים, פוגעת בשרירים וידועה בשם רבדומיוליזיס (rhabdomyolysis).
- יש לך קרע בשריר.
- יש לך תסמונת דמוית זאבת (lupus-like disease syndrome) (כולל פריחה, הפרעות במפרקים והשפעה על תאי הדם).

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 100):

- כאבי ראש.
- כאבי בטן.
- עצירות
- הרגשת חולי.
- כאב שרירים.
- חולשה
- סחרחורת
- עלייה בכמות החלבון בשתן – אלו בדרך כלל חוזרות לנורמה ללא צורך להפסיק ליטול את התכשיר (רק עבור סטטור 40 מ"ג).
- סוכרת- הסיכון לפתח סוכרת גדול יותר אם הינך בעל רמות גבוהות של שומנים וסוכר בדם, בעל עודף משקל ולחץ דם גבוה. עליך להיות במעקב רפואי במשך תקופת הטיפול.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- פריחה בעור.
- גרד או תגובות עוריות אחרות.
- עלייה בכמות החלבון בשתן –בדרך כלל חוזרות לנורמה ללא צורך להפסיק ליטול את התכשיר (רק עבור סטטור 5 מ"ג, 10 מ"ג ו- 20 מ"ג).

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- תגובה אלרגית חמורה שסימניה כוללים: נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון ו/ או הגרון, קושי בבליעה ונשימה, גרד חמור בעור (עם שלפוחיות מורמות). אם הינך חושב שיש לך תגובה אלרגית, הפסק ליטול סטטור ופנה מייד לעזרה רפואית.
- פגיעה בשריר במבוגרים- ליתר ביטחון, הפסק לקחת סטטור ודבר עם הרופא שלך מייד אם הינך חש במיחושים או בכאבי שרירים לא רגילים הנמשכים יותר זמן מהמצופה.
- כאב בטן חמור (דלקת הבלב).
- עלייה באנזימי כבד בדם.
- דימום או נטייה מוגברת לחבלות בשל רמות נמוכות של טסיות דם.
- תסמונת דמוית זאבת (lupus-like disease syndrome) (כולל פריחה, הפרעות במפרקים והשפעה על תאי הדם).

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות המופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000 מטופלים):

- צהבת (הצהבת העור והעיניים).
- הפטיטיס (דלקת בכבד).
- עקבות דם בשתן.
- כאבי פרקים.
- נזק לעצבים בזרועות וברגליים (כגון חוסר תחושה או תחושת נימול).
- אובדן זיכרון.
- הגדלת החזה בגברים (gynecomastia).

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- שלשול
- שיעול
- קוצר נשימה
- בצקת (נפיחות עקב הצטברות נוזלים).
- הפרעה בשינה, כולל נדודי שינה וחלומות בלהה (סיוטים).
- בעיות בתפקוד המיני.
- דיכאון
- בעיות נשימה כולל שיעול מתמיד ו/או קוצר נשימה או חום.
- פציעה בגיד.
- חולשת שרירים קבועה.
- מיאסטיניה גריביס (Myasthenia gravis), מחלה הגורמת לחולשת שרירים כללית ובמקרים מסוימים גם לחולשה בשרירים המעורבים בנשימה).
- מיאסטיניה אוקולרית (מחלה הגורמת לחולשה בשרירי העין).
- היוועץ ברופא שלך עם הינך חווה חולשה בזרועות או ברגליים אשר מחמירה לאחר תקופות של פעילות, ראייה כפולה או שמיטה של עפעפיים, קושי בבליעה או קוצר נשימה.

דיווח עם תופעות לוואי

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il> בנוסף, ניתן לדווח לחברת "אוניפארם בע"מ".

5. איך לאחסן את התרופה?

- יש לאחסן מתחת ל- 25°C ובמקום מוגן מאור.
- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, Lactose anhydrous, Magnesium oxide heavy, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Opadry white, Opadry brown, Opadry yellow.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

סטטור ארוז בתוך מגשיות (בליסטרים) אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון. עבור **סטטור** קיימים גודלי אריזה של 5, 10, 14, 21, 28, 30 טבליות. ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

סטטור 5 הינן טבליות מצופות עגולות, בצבע בז', קמורות משני צידיהן.

סטטור 10 הינן טבליות מצופות עגולות, בצבע בז', קמורות משני צידיהן, עם קו חציה מצדן האחד.

סטטור 20 הינן טבליות מצופות עגולות, בצבע בז', קמורות משני צידיהן, עם קו חציה מצדן האחד.

סטטור 40 הינן טבליות מצופות מוארכות, בצבע בז', קמורות משני צידיהן, עם קו חציה מצדן האחד.

שם בעל הרישום וכתובת: אוניפארם בע"מ, ת.ד. 21429, ת"א, 6121301.

שם היצרן וכתובת: אוניפארם בע"מ, פארק תעשייה "מבוא כרמל".

מספרי הרישום של התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות:

סטטור 5: 143 12 33069 02

סטטור 10: 143 13 31932 02

סטטור 20: 143 14 31933 02

סטטור 40: 143 15 31934 02

נערך בפברואר 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

למידע נוסף על התכשיר ולעלוני מעודכנים בשפות עברית, ערבית ואנגלית, סירקו את הקוד הבא:
For further information about the medicinal product and for updated patient leaflets in English, Hebrew and Arabic, please scan the following code:

סטטור 5 STATOR



סטטור 10 STATOR



סטטור 20 STATOR



סטטור 40 STATOR



ניתן לפנות לבעל הרישום של התכשיר בבקשה לקבל עלון מודפס לצרכן בשפה האנגלית בכתובת הדואר האלקטרוני info@unipharm.co.il או בטלפון מספר 03-6135050.

To receive a printed patient leaflet in English, you can contact the registration holder by email: info@unipharm.co.il or by telephone: 03-6135050.