



פברואר 2024

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה

חברת טבָע מודיעה על העדכוניים הבאים בעלוןם לרופא ולצרך של התכשירים:

Moxopen Forte 500 mg Capsules

Each capsule contains: Amoxicillin (as Trihydrate) 500 mg

Moxopen Forte 250 mg powder for Suspension

Each 5ml contains: Amoxicillin (as Trihydrate) 250 mg

התוויה כפי שאושרה בתעוזות הרישום:

Infections caused by amoxycillin - susceptible organisms.

Prevention of bacteremia in patients at risk of developing bacterial endocarditis.

ברצוננו להודיע שהעלונים עודכנו, בפירוט שלහן כוללים העדכוניים העיקריים בלבד (תוספות מסומנות בצהוב):

עדכוניים בעלון לצריך

2. לפני השימוש בתרופה

[..]

מוקסיפין עלולה להשפיע על תוצאות של בדיקות מעבדה, התייעץ עם הרופא שלך במידת הצורך

4. תופעות לוואי

יש להפסיק את הטיפול ולפנות מיד לרופא במקרים הבאים:

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100):

פריחה; היסודות העור או השפעות אחרות על העור והעינים; בחילה; הקאה; שלשול; צואה דמית

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000):

אנפילקזיס (תגובה אלרגית חריפה כגון נפיחות באף, בעיניים, בגרון, קשיי נשימה, שלפוחיות בעור, פריחה וקלופי עור); תס敏ינים של בעיות בклיוות (כגון שtan עכור); תס敏ינים של בעיות בכבד (כגון בחילות ותקאות חוזרות ונשנות, כאבי בטן, עיפות יוצאת דופן, הצהבה של העינים או העור, שtan כהה)

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000):

תגובה עורית חריפה (תס敏ינים דמיי שפעת, שלפוחיות וקלופים בעור); תופעות לוואי עוריות חמורות

(SCAR-Severe Cutaneous Adverse Reactions גם להשפיע על איברים אחרים:

- קלופים, קשקשים או שלפוחיות בעור (עם או בלי מוגלה) אשר עלולים להשפיע גם על העינים, הפה, האף או איברי המין, גרד, פריחה חריפה, בליטות מתחת לעור, כאב בעור, שינוי צבע העור (אדום, הצהבה או צבע ארגמני)

נפיחות ואודם של העיניים או הפנים

הרגשה דמוית שפעת, חום, צמרמות, כאבים בגוף, בלוטות לימפה נפוחות, שיעול

קוץ נשימה, כאב או אי נוחות בחזה

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה:

דלקת קרום המוח אספטי (שאינה נגרמת על ידי חיידקים): בלבול, חום, בחילה, עיפות, כאבי ראש פתואומיים או נזקשות של החזואר, רגשות לאו, התקאות.

יש להיעזר ברופא אם מופיעות תופעות הלואין הבאות:

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100):
לשון שחורה הנראית שעירה (דלקת בלשון); שינוי במצב השיניים בילדים (כתמים חומיים, צהובים או אפורים); סחרחות; חרדה

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000):
אלרגיה עורית (סרפדת), גרד; פריחה בפנים; נפיחות

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000):
קושי להירדם (אינסומניה); בלבול או שינויים בהתנהגות; שינויים בתוצאות של בדיקות דם

תופעות לוואי שנצפו לאחר שיוקן
סינדרום קונייס – תגובה אלרגית חמורה שלוליה לגרום לאותם שריר הלב (התקף לב), יתרן ותופע כאב בחזה במקרה של תגובה אלרגית לאמווקסיצילין.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואין חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי
שלא צינה בעлон, עליך להתייעץ עם הרופא.

כמו כן בעلون נדרש בຕצורת כמוסות הוספה ההערה הבאה תחת סעיף 3 – כיצד תשתמש בתרופה:

עבור מטופלים שאינם יכולים לבלווע או הזקוקים לטיפול במינונים נמוכים מ-500 מ"ג, קיימים תכשירים רשומים מותאמים בישראל (כגון תרחיף).

עדכונים בעلون לרופא

3. SERIOUS WARNINGS AND PRECAUTIONS BOX

Serious Warnings and Precautions Box

Hypersensitivity: Serious and occasionally fatal hypersensitivity (anaphylactic) and severe cutaneous adverse reactions (SCAR) have been reported in patients receiving therapy with beta-lactams, including amoxicillin. (See [7 WARNINGS AND PRECAUTIONS, Hypersensitivity](#) and [7 WARNINGS AND PRECAUTIONS, Skin](#)).

7. WARNINGS AND PRECAUTIONS

[..]

Cardiovascular

Kounis syndrome, a serious allergic reaction that can result in myocardial infarction, can occur as chest pain in association with an allergic reaction to amoxicillin.

[..]



7.1.3 Geriatrics

Use in the Elderly: There are no known specific precautions for the use of amoxicillin in the elderly.

Amoxicillin is known to be substantially excreted by the kidney, and the risk of toxic reactions to this Moxypen Forte may be greater in patients with impaired renal function. Because elderly patients are more likely to have decreased renal function, care should be taken in dose selection, and it may be useful to monitor renal function.

8. ADVERSE REACTIONS

8.3 Post-Marketing Adverse Reactions

Central Nervous System: Amoxicillin can lead to cases of aseptic meningitis of unknown frequency.

Other immune system disorders: Kounis syndrome

9. DRUG INTERATIONS

9.4 Drug-Laboratory Test Interactions

Moxypen Forte may:

- cause false-positive reactions when testing for the presence of glucose in urine.
- distort assay results for estriol in pregnant women.

העלונים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות
וניתן לקבלם מודפסים ע"י פניה לחברת טבע.
<https://israeldrugs.health.gov.il>