

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

יורקס

קרם

חומר פעיל

קרומטיטון 10% w/w (crotamiton 10% w/w)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים – ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בפרק המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 5 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלה בגרד ולטיפול במחלת הגרדת (סקביאס).

קבוצה תרפויטית: נוגד גרד, קוטל טפילים לרבות קרדית הסקביאס.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים האחרים של תרופה זו (כמפורט בפרק 6).
- אתה סובל מבעיות בעור המלוות בהפרשות (דלקת עור אקסודטיבית חריפה).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- קרם יורקס מיועד לשימוש חיצוני בלבד. אין להשתמש בו סביב העיניים או הפה. אם בטעות נוצר מגע, יש לשטוף את העיניים או הפה במים.
- אין למרוח יורקס במקרה של אקזמה חריפה או עור מודלק מאוד, על פצעים פתוחים בעור או על עור סדוק.
- התייעץ עם הרופא אם אתה סובל מגרד באיברי המין.
- אתה עלול לסבול מאי נוחות אם יש לך עור רגיש.
- הפסק להשתמש בקרם זה אם אתה חווה גירוי או תופעות לוואי בלתי רצויות אחרות.

ילדים ומתבגרים

התרופה מיועדת גם לילדים ולמתבגרים. עם זאת, בילדים מתחת לגיל 3, יש להתייעץ עם רופא לפני השימוש.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

היריון והנקה

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שאת עשויה להיות בהיריון או מתכננת להרות, פני לרופא או לרוקח לייעוץ טרם השימוש בתרופה זו.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התכשיר מכיל פרופילן גליקול שעלול לגרום גירוי בעור. 1 גרם קרם מכיל 100 מ"ג פרופילן גליקול, השקול ל-10% w/w. התכשיר מכיל צטוסטאריל אלכוהול שעלול לגרום לגירוי בעור (למשל דלקת עור ממגע).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

גרד: יש למרוח יורקס קרם על העור הנגוע 2-3 פעמים ביום עד להקלת הגרד. יורקס מספק הקלה מהגרד במשך 6-10 שעות לאחר כל מריחה. כך יש לנהוג גם במקרים קשים הדורשים טיפול יותר ממושך, מאחר שיורקס נסבל היטב על ידי העור. אם אין הקלה בגרד כעבור 5 ימי טיפול יש להתייעץ עם הרופא.

ילדים מתחת לגיל 3: יש להתייעץ עם רופא לפני השימוש ואין למרוח יורקס יותר מפעם אחת ביום.

גרדת (סקביאס): על החולה לעשות תחילה אמבטיה חמה ולייבש את העור היטב. לאחר מכן יש לשפשף יורקס לתוך העור בכל הגוף (פרט לפנים ולקרקפת) עד שלא ניתן להבחין בעקבות של התכשיר על פני העור. יש לחזור על כך פעם ביום, רצוי בערב, במשך 3-5 ימים. בהתאם לתגובה, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאזורים הרגישים במיוחד להימצאות טפילים (כגון בין אצבעות הידיים והרגליים, פרק כף היד, בית השחי ואיברי המין). יש לכסות שטחי עור מוגלתיים בתחבושת ספוגה ביורקס. במשך תקופת הטיפול יכול החולה לעשות אמבטיה זמן קצר לפני המריחה הבאה. לאחר השלמת הטיפול יש לעשות אמבטיה מנקה ולהחליף מצעי מיטה ובגדים תחתוניים. ילדים מתחת לגיל 3: יש להתייעץ עם רופא לפני השימוש ואין למרוח יורקס יותר מפעם אחת ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. אם בטעות בלעת או ילד בלע מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ביורקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

אם אתה חווה אחת מתופעות לוואי אלו או אחרות, הפסק את השימוש בקרם ופנה לייעוץ רפואי:

- גירוי חמור בעור
- קושי בנשימה
- אנגיואדמה (נפיחות בפנים, בלשון או בגרון)

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי לא שכיחות (uncommon):

- גרד

תופעות לוואי נדירות (rare):

דלקת עור ממגע, רגישות יתר (כמו פריחה, אקזמה, אדמומיות בעור, גירוי בעור)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי השפופרת ואריזת הקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון**
יש לאחסן מתחת ל-30°C.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Purified water, glycerol monostearate, propylene glycol, liquid paraffin, cetostearyl alcohol, isopropyl myristate, polyoxyl 40 stearate.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
שפופרת המכילה 20 גרם קרם בצבע לבן.

בעל הרישום וכתובתו: דיפריס ושות' בע"מ, רח' הברזל 32, תל-אביב

שם היצרן וכתובתו:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, Germany

נערך בפברואר 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 127-17-22132

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.