

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקשיירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

פמוטיידין טבע 20 מ"ג
טבליות

החומר הפעיל וຄומוטו:

כל טבלייה מכילה: פמוטיידין 20 מ"ג (Famotidine 20 mg)

למיידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה ראה סעיף 2 "מיידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מיידע נוספת".

קיים בעיון את העalon עד סופו בטראם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מיידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך ליטול את התרופה על פי ההוראות בסעיף המינון בעalon זה.
היעוץ ברוקח אם הינך זקוק למיידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא במידה וטסמיין המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 14 ימים. התרופה אינה מיועדת לשימוש ילדים מתחת לגיל 12 שנים, מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא. בתיוחות השימוש של תרופה זו ילדים טרם הוכחה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה משמשת למניעה ולטיפול בצרבת וביתר חומציות מערכת העיכול העליונה.

קבוצה רפואיית:

מעכבי הפרשת חומצה במערכת העיכול מקבוצת נוגדי היסטאמין 2.

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לפמוטיידין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 – "מיידע נוספת").
- סבלת מתגובה אלרגית לתרופות המכילות מעכבי הפרשת חומצה (לדוגמה רנטיטידין).
- אתה נוטל מעכבי הפרשת חומצה נוספים.

**ازהרונות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בפמוטיידין טבע ספר לרופא אם:**

- את בהירין או מניקה.
- יש לך קושי או כאבים בזמן הבליעה, הקאות חמורות, צואה שחורה, תחושת חנק, הרגשה מתמשכת של כאב/חוסר נוחות בבטן.
- אתה סובל ממחלת כלויות, יתכן ותידרש התאמת מינון.
- אתה מעל גיל 40 ואתה סובל מастסמים חדשים או שניים בתסמיינים של חומציות יתר או צרבת.
- אתה נוטל תרופות מרשים או תרופות ללא מרשם, כגון נוגדי דלקתAINS (NSAIDs). יתכן שתרופה אלה גורמת לתסמיינים שלך.
- סבלת בעבר מסיבוכים של כיב במערכת העיכול.
- אתה סובל מרידה לא מכובנת במשקל הנלוות לתסמיינים של חומציות יתר או צרבת.
- אתה נוטל תרופה מסווג מעכבי مضאבת פרוטוניים (PPI).
- אתה סובל מצרבת לעתים קרובות (מעל 3 פעמים בשבוע) ו/או מצרבת חמורה.
- יש לך צרבת המלווה בסחרחוות או בהזעה.
- יש לך כאב בחזה או בכף המלווה בקוצר נשימה, בהזעה, בכאב המתפשט לזרוע או לצוואר או בסחרחוות.

ازהירות נספנות בנושא הטיפול בצרבת

צربת וחומציות יתר הן תופעות נפוצות, יחד עם זאת, צربת יכולה להיות סימן למצב רפואי חמור שדורש התערבות רפואית.

הפסק ליטול תרופה זו ותרופות אחרות ללא מרשם שאתה נוטל לטיפול בצרבת פונה לרופא או לרוקח אם:

- אתה סובל מתסמים של צربת במשך יותר מ-3 חודשים וטרם פנית לרופא.
- תשミニ הצרבת נמשכים, מחמורים או חזרים לאחר שימוש בתרופות לטיפול בצרבת במשך 14 ימים רצופים.
- אתה זקוק לעיתים קרובות לטיפול בתרופות נגד צربת במשך 14 ימים רצופים (לדוגמה כל 6 שבועות או לעיתים תכופות יותר).
- אתה משך לסבול מצربת לאחר השימוש בתרופה זו או כל תרופה אחרת ללא מרשם לטיפול בצרבת.

עישון:

בכדי להימנע מתסמים של חומציות יתר עליך להפחית או להפסיק לחלוין את השימוש בסיגריות.

ילדים ומתבגרים

לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתרופה זו ילדים. התרופה אינה מיועדת לשימוש ילדים מתחת לגיל 12 שנים.

תגבות בין-תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לךחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- איטראקונזול (טיפול בזיהומיים פטרייתיים). נטילת פמוטיידן בסמוך לאיטראקונזול יכולה להפחית את יעילות הטיפול האנטי פטריתי.
- קלציום קרובנט (נוגדי חומצה) – יעילות הטיפול בקלציום קרובנט מוחלשת בסמיכות לנטילת פמוטיידן (נוגד היסטמין 2).

שימוש בתרופה ומזהן:

רצוי להימנע ממאכליים ומשקאות שיכולים לגרום לתסמים. יש להימנע או להגביל מאכליים ומשקאות כגון:
משקאות המכילים קפאין (קפה, תה, קקאו וקולה), שוקולד, מאכליים מתוגנים, מאכליים מתובלים או אלכוהול.
אין לשכבר מיד לאחר הארוחה.

המלצות נוספת:

- אם אתה בעל עודף משקל, מומלץ לרדת במשקל.
- הגבה את מראות המיטה.
- לבש בגדים רפואיים באזור הבطن.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:

אין לשתוות יינות או משקאות חריפים בתגובה הטיפול בתרופה.

הירון והנקה:

יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם אתה בהירון או מתכונת להיות בהירון.
אל תשתמשי בתרופה זו כאשר אתה מניקה. פמוטיידן עבר לחלב אם.

נהיגה ושימוש במכוניות:

השימוש בתרופה זו עלול לגרום לשחרחות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב וב�行ת מכונות מסוכנות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים בתרופה:

פמוטיידן טבע 20 מ"ג מכיל לקטוז ועלול לגרום לאלהגיה אצל אנשים הרגישים ללקטוז. אם יש לך רגישות לסתורים מסוימים, היועץ ברופא לפני Nutzungו בתגובה זו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או ברוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון המקורי וילדים מעל גיל 12 שנים:

טיפול בצרבת: טבליה אחת של פומוטידין טבע 20 מ"ג ליום.

למניעת צרבת: טבליה אחת של פומוטידין טבע 20 מ"ג ליום, עם מים, שעה אחת לפני אכילת מזון או שתיתת משקאות, העולמים לגרום לצרבת.

אין לעبور על המנה המומלצת.

משך הטיפול

עליך לפקות לרופא אם התסמינים מחמירים או אינם משתפרים לאחר 14 ימים, או אם התפתחו תסמינים חדשים. אין ליטול פומוטידין מעיל לשבועיים רצופים ללא הוראה מהרופא.

אופן השימוש בתרופה:

- רצוי ליטול את התרופה לפני השינה.
- יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מעט מים.
- אין לחצוץ את הטבליה, לאחר והטבליה ללא קו חציה.
- אין מידע לגבי כתישה או לעיסה של הטבליה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר יתכן שתסבול מהתסמינים הבאים: דופק מהיר, תחושת נמנום, כאב ראש, סחרחות, אי-שקט. יתכן גם תופעות לוואי במערכת העיכול: כאבי בטן, בחילה, הקאה ושלשול.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלבד **בלע לצד מן התרופה**, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד, יש ליטול מנה מייד כשןוצרת, אך בשום אופן אין ליטול יותר משתי טבליות ביוםמה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בפומוטידין טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אחד מהן.

יש לפנות מיד לרופא אם:

- אתה סובל מתגובה אלרגית כגון פריחה בעור, סרפה (אורטיקרייה), התנפחות, גירוד וקושי לנשום.
- יש לך כאב בטן, שלשול, יובש בפה, בחילה והקאות.
- אתה סובל מסחרחות וישנוניות במידה חמורה

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- כאב ראש
- שלשול, הקאות, עצירות, בחילה
- דלקת ריאות, דלקת גרון, מחלת דמוית שפעת
- כאבי גב
- גירוד

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 מעתמשים מתוך 1,000):

- סחרחות
- חולשה ועייפות, אי נוחות וכאב בבטן, כאב בחזה, כאבי שרירים
- חרדה, סחרחות, סינוסיטיס, גוש בשד

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-1-10 מעתמשים מתוך 10,000):

- ישנניות
- יובש בפה
- גרד
- תגובה עורית מסווג טוקסיק אפידרמאל נקרוליזיס (toxic epidermal necrolysis)
- הפרעות בקצב הלב

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- פריחה מסווג סרפדת (אורטיקריה), רגשות יתר, תגובה אנាបילקטית (תגובה אלרגית קשה), בצתות (אנגיאודמה)
- שינויים בתוצאות בדיקות מעבדה, בבדיקה תפוקדי כבד וכליות ובספרת דם. שינויים אלו בדרך כלל אינם משמעותיים.
- צהבת כולסטרולית (חסימתית), הרגשה כללית לא טוביה

תופעות נוספות שדרשו ובעורן לא הוכח קשר סיבתי לטיפול בפתומודין:

אי שקט (איגיטציה), בלבול, היזות, דיכאון, חוסר התמצאות, הפרעה نفسית, נזודי שינה, נשירת שיער, רגשות לארור, תגובה עורית מסווג תסמנת סטיין ג'ונסון, הפרעות בחוש הטעם, תחוושת עקצוצים/ニמול בידים או ברגלים, פרכזים (grand mal seizures), עילפון, מקרים נדירים של אין-אונות (אימפוטנציה), רידיה בספירת תא הדם (אנמיה, נויטרופניה, טרומבוציטופניה, פנציטופניה, לויוקופניה ואגרנוולוציטוזיס), הגדלה הפיכה של החזה בגברים (גנוקומסティיה).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה לעילו, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.gov.il>.

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנע הרעליה!** התרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטוחה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **יש לאחסן במקום יבש מתחם ל- 25°C.**

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, starch, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, lactose monohydrate (0.72mg) , hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), titanium dioxide, polyethylene glycol, iron oxide yellow, iron oxide red.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

טבלייה עגולה וקמורה מצופה בצבע חום בהיר-כתום.
קיימות אריזות של 20 או 30 טבליות ארוזות במגשיות (בליסטר). יתכן ולא כל גDALי האריזה משוקקים.

שם היוצר, בעל הרישום וכתובתו:

טבע ישראל בע"מ,
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 29371-66-111

העלון נערך בפברואר 2024.

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.