

لوتان پلوس أقراص

التريـكـيب:

يحتوي كل قرص من لوتان پلوس على:

لوسارتان پوتاسيوم 50 ملغ
هيدروكلوروتيازيد 12.5 ملغ
لقائمة المواد غير الفعالة في المستحضر، أنظر الفقرة 2
"معلومات هامة حول بعض مركبات لوتان پلوس" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بنمـعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن لوتان پلوس. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، إسأل الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء للعلاج من أكل، لا تعطيه للأطفال. فهو قد يضرهم، حتى ولو بدك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
لوتان پلوس غير مخصص للأطفال والمراهقين ما دون عمر 18 سنة.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لوتان پلوس مخصص لعلاج فرط ضغط الدم، وكذلك لتقليل خطورة حدوث سكتة لدى مرضى يعانون من ضغط دم مرتفع وسماكة في البطين الأيسر (البطين الأيسري) للقلب.

الفصيلة العلاجية: لوتان پلوس هو عبارة عن مزيج من حاجب للمستقبل أنجيوتنسين II (لوسارتان) ومدر للبول من نوع تيازيد (هيدروكلوروتيازيد). أنجيوتنسين II عبارة عن مادة ينتجها الجسم، حيث ترتبط بمستقبلات في الأوعية الدموية وتؤدي إلى تضيقها. ونتيجة لذلك يحدث ارتفاع في ضغط الدم. يمنع لوسارتان ارتباط أنجيوتنسين II بهذه المستقبلات ويؤدي إلى إرخاء الأوعية الدموية، ونتيجة لذلك إلى خفض ضغط الدم. يعمل هيدروكلوروتيازيد عن طريق جعل الكلى تنقل عبرها المزيد من الماء والملح، يساعد هذا الأمر أيضاً على خفض ضغط الدم.

2) قبل تناول لوتان پلوس

لا تتناول لوتان پلوس إذا:

- كنت حساساً (البرجي) ل لوسارتان، هيدروكلوروتيازيد أو لكل واحد من المركبات الأخرى لهذا الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").
- كنت حساساً لمواد أخرى التي تعتبر من مشتقات سولفوناميدات (مثلاً: تيازيدات أخرى، بعض الأدوية المضادة للجراثيم مثل كوتريموكسازول، إسأل طبيبك إذا لم تكن واثقاً).
- وجد لديك خلل خطير في وظيفة الكبد.
- وجدت لديك نسب منخفضة من البوتاسيوم، نسب منخفضة من الصوديوم أو نسب مرتفعة من الكالسيوم، التي لا يمكن تصحيحها بالعلاج.
- كنت تعاني من داء النقرس (gout).
- كنت حاملاً أكثر من 3 أشهر (يُفضل أيضاً الإمتناع عن لوتان پلوس في بداية الحمل - أنظري فقرة "الحمل، الإرضاع والخصوبة").
- وجد لديك ضرر خطير في وظيفة الكلى أو أن كليتيك لا تنتج البول أبداً.
- وجد لديك داء السكري أو خلل في وظائف الكلى وكنتم تتعالج بدواء لخفض ضغط الدم الذي يحتوي على اليوسكريين.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال لوتان پلوس

تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل أن تتناول لوتان پلوس.
إذا كنت تعاني من تدي في الرؤية أو من ألم في العين، فهذه يمكن أن تكون أعراض لتراكم سائل في طبقة الأوعية الدموية للعين (choroidal effusion) أو لارتفاع في ضغط العين ويمكن أن تظهر خلال ساعات حتى

أسابيع من تناول لوتان پلوس. إذا لم يتم علاج هذه الحالة، فهي قد تؤدي إلى فقدان دائم للبصر. إذا وجدت لديك في الماضي حساسية لبيوسلين أو لسولفوناميد، فمن الجائز أن تكون معرضاً لخطورة أكبر في أن تتطور لديك هذه الأعراض.

يتوجب عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تعتقدن بأنك حامل (أو من شأنك أن تصبح حاملاً). لا يوصى بتناول لوتان پلوس في بداية الحمل ويمنع تناوله بعد الشهر الثالث من الحمل، وذلك لأنه قد يسبب ضرراً خطيراً لرضيعك إذا تم تناوله في هذه المرحلة (أنظري فقرة "الحمل، الإرضاع والخصوبة").

قبل العلاج بـ لوتان پلوس من المهم إبلاغ الطبيب إذا:

- كانت لديك مشاكل في التنفس أو مشاكل في الرئتين (بما في ذلك التهاب أو سائل في الرئتين) بعد تناول هيدروكلوروتيازيد في الماضي. إذا تطور لديك ضيق شديد في التنفس أو صعوبات في التنفس بعد تناول لوتان پلوس، توجه فوراً لتلقي علاج طبي.
- عانيت في الماضي من إنتفاخ في الوجه، الشفتين، الحنجرة أو اللسان.
- كنت تتلقى مدرات بولية.
- كنت تخضع لحمية فقيرة بالأملح.
- كنت تعاني أو عانيت من تقيؤات و/أو إسهال شديد.

- وجد لديك قصور في القلب.
- لديك خلل في وظائف كبدك (أنظر الفقرة 2 "لا تتناول لوتان پلوس إذا").
- وجد لديك تضيق في الشرايين المؤدية لكليتيك (تضيق في شرايين الكلية) أو لديك كلية واحدة فقط تعمل، أو إذا اجتزت زراعة كلية في الآونة الأخيرة.
- وجد لديك تضيق في الشرايين (تصلب عصيدي)، ندحة صدرية (الام في الصدر نتيجة تديني وظيفة القلب).
- وجد لديك تضيق في الصمام الأبهرى أو التاجي (تضيق صمامات القلب) أو إنتقال عضلة القلب الصخامي (مرض يؤدي لسماكة عضلات القلب).
- لديك داء السكري.
- كان لديك داء النقرس (gout).

● وجد لديك أو كانت لديك حالة من الحساسية، الربو أو حالة تسبب لك ألماً في المفاصل، طفح جلدي وسخونة (بوتوس - ندبة إحصارية جهازية).- وجدت لديك نسب مرتفعة من البوتاسيوم أو نسب منخفضة من البوتاسيوم
- أو كنت تخضع لحمية فقيرة البوتاسيوم.
- كنت بحاجة لإجراء تخدير (حتى ولو لدى طبيب الأسنان) أو قبل عملية جراحية، أو إذا كنت مقبلاً على إجراء فحوص ووظائف الغدة نظيرة الدرقية.

فأنت ملزم بإبلاغ طبيبك أو الطاقم الطبي بأنك تتناول أقراص لوتان پلوس. كنت تعاني من فرط الألدوستيرونية الأولى (متلازمة تحدث في أعقاب خلل في الغدة الكظرية وتنتقل بزيادة إفراز هورمون الألدوستيرون من قبل الغدة).- كنت تتناول أي واحد من الأدوية التالية التي تستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم:

- مثبطات ACE (مثلاً إنالابريل، ليزينوپريل، رامبيرييل)، خاصة إذا وجدت لديك مشاكل في الكلى تتعلق بالسكري.
- اليوسكريين.

من شأن طبيبك أن يقوم بفحص الأداء الوظيفي لكليتيك، ضغط الدم وكمية الشوارد الكهربائية (مثلاً، البوتاسيوم) في دمك بفواصل زمنية محددة.
أنظر أيضاً معلومات في الفقرة 2 "لا تتناول لوتان پلوس إذا".- كنت تتناول أدوية أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر الفقرة 2 "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية").

- أصبت في الماضي بسرطان الجلد، أو إذا تطورت لديك آفة غير متوقعة في الجلد خلال فترة إستعمال الدواء.
- إن إستعمال هيدروكلوروتيازيد، خاصة لفترة طويلة وبمقادير دوائية مرتفعة، قد يزيد من خطورة تطور أنواع معينة من سرطان الجلد والشفقتين (سرطان جلد من نوع غير الميلانوما).
- يجب حماية الجلد من التعرض للشمس والأشعة فوق البنفسجية (UV) خلال فترة إستعمال لوتان پلوس.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أو من شأنك أن تتناول أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، يتوجب عليك إبلاغ الطبيب المعالج أو الصيدلي عن ذلك.
يجب عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تتناول إضافات البوتاسيوم، بدائل الملح التي تحتوي على بوتاسيوم، أدوية حافظة للبوتاسيوم، أو أدوية أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (مثلاً، أدوية تحتوي على تريميتوپريم)، حيث أن مشاركتها مع لوتان پلوس غير موصى به.

قد يحصل تداخل دوائي بين مواد مدرة للبول مثل هيدروكلوروتيازيد الموجود في لوتان پلوس وبين أدوية أخرى.

لا يجوز تناول لوتان پلوس بمشاركة الأدوية التي تحتوي على ليثيوم من دون إجراء مراقبة حثيثة من قبل طبيبك.

من شأن وسائل الحذر الخاصة (مثلاً: فحوص الدم) أن تكون مناسبة إذا كنت تتناول مدرات بولية أخرى، مسهلات معينة، أدوية علاج داء النقرس (gout)، أدوية السيطرة على نظم القلب أو للسكري (الأدوية الفموية أو الإنسولين).

من المهم أيضاً أن يعرف طبيبك إذا كنت تتناول:

- أدوية أخرى لخفض ضغط دمك.
- ستيرويدات.
- أدوية لعلاج السرطان.
- مسكنات الألم.
- أدوية لعلاج التلوثات الفطرية.
- أدوية لعلاج التهاب المفاصل (داء الرثية).
- مستحضرات تحتوي على الراتنجات لعلاج إرتفاع الكوليسترول، مثل كوليستيرامين.
- أدوية لإرخاء العضلات.
- أدوية آيونية المفعول مثل المورفين.
- "الأمينات الراجعة للضغط - pressor amines" مثل أدرينالين أو أدوية أخرى من نفس المجموعة.
- أدوية السكري التي تعطى عبر الفم أو الإنسولين.
- من الجائز أن يضطر طبيبك لتغيير المقدار الدوائي و/أو لإخذ وسائل حذر أخرى:

إذا كنت تتناول مثبط ACE أو اليوسكريين (أنظر أيضاً الفقرة 2 "لا تتناول لوتان پلوس إذا") - و"تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال لوتان پلوس".

الرجاء بلغ طبيبك بأنك تتناول لوتان پلوس أيضاً إذا كنت مقبلاً على إجراء تصوير وستعطى لك مادة ظليلة تحتوي على اليود.

إستعمال الدواء والطعام

إن الكميات المبالغ فيها من الملح في الغذاء قد تعاكس تأثير أقراص لوتان پلوس.

بالإمكان تناول أقراص لوتان پلوس مع أو بدون طعام.

يجب الإمتناع عن شرب عصير الجريب فروت أثناء تناول أقراص لوتان پلوس.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

يوصى بعدم شرب الكحول أثناء تناول هذه الأقراص. إن الكحول وأقراص لوتان پلوس قد يزيدان من تأثيرات بعضها البعض.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

الحمل

يتوجب عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تعتقدن بأنك حامل (أو من شأنك أن تصبح حاملاً). سوف يوصيك طبيبك عادة بالتوقف عن تناول لوتان پلوس قبل حصول الحمل أو لحظة أن عرفت بأنك حامل ويوصيك بتناول دواء آخر عوضاً عن لوتان پلوس. لا يوصى بتناول لوتان پلوس خلال فترة الحمل ويجنب تناوله بعد الشهر الثالث من الحمل، وذلك لأنه قد يسبب ضرراً خطيراً لرضيعك إذا تم تناوله بعد الشهر الثالث من الحمل.

إحكي لطبيبك إذا كنت مرضعة أو مقبلة على البدء في الإرضاع. لا يوصى بتناول **لوتان بولوس** لدى الأمهات المرضعات، ومن شأن طبيبك أن يختار من أجلك علاجاً آخرًا إذا كنت ترغبين بالإرضاع.

الإستعمال لدى الأطفال والمرهقين

لا توجد معلومات حول إستعمال **لوتان بولوس** لدى الأطفال. لذلك، لا يجوز إعطاء **لوتان بولوس** للأطفال.

الإستعمال لدى الكبار

لوتان بولوس يعمل ويكافئ تحمله بشكل جيد ومتساوي لدى غالبية المرضى البالغين الكبار والأصغر سنًا. بالنسبة لغالبية المرضى الكبار يتطلب الأمر نفس المقدار الدوائي كما هو الحال لدى المرضى الأصغر سنًا.

السياسة وإستعمال الماكينات

عندما تبدأ العلاج بهذا الدواء، لا يجوز إجراء المهام التي تتطلب الإنتباه الخاص (مثلًا: سياقة المركبات أو تشغيل الماكينات الخطرة) إلى أن تعرف كيفية إستجابتك للدواء.

معلومات هامة حول بعض مركبات لوتان بولوس

تحتوي أقراص **لوتان بولوس** على اليوتاسيوم (المحتوى اليوتاسيوم، أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").

تحتوي أقراص **لوتان بولوس** على اللكتوز (المحتوى اللكتوز، أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").

إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لبعض السكريات، إتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

3 كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. من المهم مواصلة تناول **لوتان بولوس** لطالما وصفه طبيبك لك من أجل المحافظة على السيطرة على ضغط دمك. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. بالإمكان تناول **لوتان بولوس** مع أو بدون طعام. يجب بلع الدواء مع كأس من الماء. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

فِرط ضغط الدم

المقدار الدوائي الإعتيادي من **لوتان بولوس** لغالبية مرضى إرتفاع ضغط الدم هو قرص واحد من **لوتان بولوس** لليوم، وذلك للسيطرة على ضغط الدم لطيلة فترة من الزمن قدرها 24 ساعة. المقدار الدوائي اليومي الأعظمي هو قرصين لليوم من **لوتان بولوس**، مرة في اليوم.

المرضى الذين يعانون من ضغط دم مرتفع وسماكة في البطين الأيسر

يتم تحديد المقدار الدوائي من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا دعت الحاجة، بالإمكان شطر الأقراص للإستعمال الفوري.

لا توجد معلومات حول سحق أو وضع القرص.

إذا تناولت لوتان بولوس أكثر مما توجب عليك تناوله

فِرط المقدار الدوائي يمكن أن يؤدي لهبوط في ضغط الدم، ضربات قلب، تباطؤ النبض، تغيرات في صيغة الدم وتجفاف. إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول لوتان بولوس

حاول أن تتناول **لوتان بولوس** بكل يوم كما وُصف لك. لكن، إذا نسيت تناول مقدار دوائي، لا تتناول مقداراً دوائياً إضافياً. بد لع جدول أوقات تناول الإبتاعادي.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

من المهم مواصلة تناول **لوتان بولوس** لطالما وصفه لك طبيبك وذلك للمحافظة على السيطرة على ضغط دمك.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا فُوتت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال **لوتان بولوس** قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدهمن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوقف عن إستعمال الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ الأقرب إذا ظهر:

رد فعل تحسسي شديد (طفح، حكة، إنتفاخ الوجه، الشفتين، الفم أو الحنجرة التي قد تسبب صعوبات في البلع أو في التنفس). هذا عرض جانبي خطير لكنه نادر، حيث يؤثر على أكثر من 1 من بين 10,000 متعالج لكن على أقل من 1 من بين 1,000 متعالج. من الجائز أن تحتاج إلى علاج طبي طارئ أو للمبيت في المستشفى.

نادرة جداً (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10,000 شخص): ضائقة تنفسية حادة (العلامات تشمل ضيق شديد في التنفس، سخونة، ضعف وإرتباك).

أعراض جانبية أخرى التي قد تحدث:

شائعة (قد تؤثر على حتى شخص واحد من بين 10):

سعال، التهاب في الطرق التنفسية العلوية، إحتقان الأنف، التهاب الجيوب الأنفية، مشاكل في الجيوب الأنفية؛ إسهال، ألم في البطن، غثيان، مشاكل في الهضم؛ ألم عضلية أو تقلصات؛ ألم في الرجل، ألم في الظهر؛ أرق، صداع، دوام؛ ضعف، إرهاق، ألم في الصدر؛ إرتفاع نسب اليوتاسيوم في الدم (التي قد تؤدي لعدم سلامة نظم القلب)، إنخفاض نسب الهيموغلوبين؛ تغيرات في وظائف الكلى التي تشمل قصور كلوي؛ سكر منخفض جداً في الدم (إنخفاض السكر في الدم).

غير شائعة (قد تؤثر على حتى شخص واحد من بين 100 شخص):

فقر دم، نطف حمراء أو بنية على الجلد (أحياناً وبالأخص على راحتي القدمين، الرجلين، الذراعين والألية، مع ألم في المفاصل، إنتفاخ اليدين وراحتي القدمين وألم في البطن)، كدمات، تناقص خلايا الدم البيضاء، مشاكل في تخثر الدم، تناقص عدد الصفائح الدموية؛ فقدان الشهية للطعام، إرتفاع نسب حمض البول أو اليوريك (gout)، إرتفاع نسب السكر في الدم، نسب شاذة للشوارد الكهربية في الدم؛ قلق، عصبية، اضطرابات من الهلع (تكرر نوبات الهلع)، إرتباك، إكتئاب، أحلام شاذة، اضطرابات في النوم، غثاس، ضعف الذاكرة؛ الشعور ب"دابباس ولبز" أو شعور مشابه، ألم في الأطراف، رجفان، شقيقة، إغماء؛ شوش الرؤية، الشعور بحرق أو وخز في العينين، التهاب الملتحمة، تدهور الرؤية، رؤية الأشياء بلون أصفر؛ طنين، ضجيج، زفير أو ضربات في الأذنين، دوام (فيرتيجو)؛ ضغط دم منخفض، الذي من شأنه أن يكون متعلق بتغيرات في الوضعية (الشعور بدوار أو بضعف عند الوقوف)، ذبحة (ألم في الصدر)، عدم سلامة نظم القلب، حادث دماغي (TIA)؛ نوبة إقفارية عابرة، "سكتة خفيفة"، نوبة قلبية، خفقان القلب؛ التهاب الأوعية الدموية الذي يترافق غالباً بطفح جلدي أو كدمات؛ ألم في الحنجرة، ضيق تنفس، التهاب القصبات الهوائية، التهاب الرئتين، ماء في الرئتين (الذي يسبب صعوبة في التنفس)، رعاف، رشح، إحتقان؛ إمساك، إمساك شديد، غازات، إنزعاج في البطن، تشنجات في البطن، تغيرات، جفاف في الفم، التهاب الغدد اللعابية، ألم في الأسنان؛ يرقان (إصفرار العينين والجلد)؛ التهاب البنكرياس؛ شرد، حكة؛ التهاب الجلد، طفح، إحمار الجلد، حساسية للضوء، جفاف الجلد، تورد، تعرق، تساقط الشعر؛ ألم في الذراعين، الكتفين، الوركين، الركبتين أو في مفاصل أخرى؛ إنتفاخ المفاصل، تصلب، التهاب العضلات؛ كثرة التبول بما في ذلك الباليين، عدم سلامة الأداء الوظيفي للكلية يشمل التهاب الكلى، ثلوث في المسالك البولية، سكر في البول؛ تناقص الرغبة الجنسية، ضعف جنسي؛ إنتفاخ الوجه، إنتفاخ موضعي (وذمة)، سخونة.

نادرة (قد تؤثر على حتى شخص واحد من بين 1,000 شخص): التهاب الكبد (Hepatitis)، شذوذ في فحوص وظائف الكبد.

غير معروف (لا يمكن تقدير الشيعوع من المعلومات المتوفرة):

سرطان الحبل والشفتين (سرطان جلدي من نوع غير الميلانوما)؛ أعراض تشبه الإنفلونزا؛ ألم عضلية مجهولة السبب مع بول داكن (بلون الشاي) (إحتلال العضلات المخططة)؛ إنخفاض نسب الصوديوم في الدم (hyponatremia)؛ شعور عام غير جيد؛ اضطرابات في حاسة التذوق؛ ضعف في الرؤية أو الألم في العينين جراء ضغط مرتفع (علامات محتملة لتراكم سوائل في طبقة الأوعية الدموية في العين (choroidal effusion) أو جلوكوما حادة ضيقة الزاوية). إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة "يونيفارم م.ض.ب."

5 كيفية تخزين لوتان بولوس؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال **لوتان بولوس** بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب تخزين الدواء دون 25 درجة مئوية وفي مكان محمي من الضوء.

6 معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً على:

Lactose anhydrous, Microcrystalline cellulose, Pregelatinized starch, Magnesium stearate, Opadry white Y-1-7000.

يحتوي **لوتان بولوس** على كمية اليوتاسيوم التالية: 4.24 ملغ (0.108 ميلي مكافئ).

يحتوي **لوتان بولوس** على كمية اللكتوز التالية: 94.2 ملغ.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

لوتان بولوس معبأ ضمن ليوحات (بليستز) بداخل علبة كرتون. يوجد في كل علبة 10، 7، 14، 10، 15، 20، 28 أو 30 قرصاً من الجائز لا تسوق كافة أحجام العلب.

أقراص **لوتان بولوس** هي مطلية، بيضوية، محدبة من كلا الجانبين مع خط للشطر من جانب واحد، ذات لون أبيض.

إسم صاحب الإمتياز وعنوانه: يونيفارم م.ض.ب. ص.ب. 21429، تل أبيب، 6121301.

إسم المنتج وعنوانه: يونيفارم م.ض.ب. يارك الصناعة "مافو كرمل".

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

13795 01

تم إعدادها في أيلول 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.