

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקשיירם) התשמ"ז - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

פקסולוביד™
טבליות מצופות

פקסולוביד מכילה 2 סוגים טבליות עם החומרים הפעילים הבאים :

- כל טבליה מצופה ורודה מכילה :
נירמתרלביר 150 מ"ג nirmatrelvir 150 mg
- כל טבליה מצופה בצבע לבן עד קרם (off-white) מכילה:
ריטונביר 100 מ"ג ritonavir 100mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר : ראה סעיף 2 תחת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספים".

קרא בעיון את **עלון עד סופו** בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

פקסולוביד מיועדת לטיפול במחלה נגיף קורונה 2019 (COVID-19) מאובחנת, במקרים שאינם זמינים לתוספת חמצן ואשר נמצא בסיכון מוגבר להדרדרות למחלה COVID-19 חמורה.

קבוצה רפואיית: אנטיוירלי .

מחלה ה- 19- COVID נגרמת על ידי נגיף הנקרא נגיף הקורונה. פקסולוביד עוצרת את התרבותת הנגיף בהתאם, דבר העוצר את התרבותת הנגיף בגוף. זה יכול לעזור לך להתגבר על הזיהום הנגיפי, ויכול למנווע מפרק לפתח מחלת חמורה.

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים נירמלטרלביר, ריטונביר או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות. נטילה של פקסולוביד עם תרופות אלו עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות או מסכנות חיים או להשפיע על אופן הפעילים של פקסולוביד :
 - אלפוזוסין (טיפול בתסמינים של ערמוניית מוגדלת)
 - רנוולזין (טיפול בכאים כרוניים בחזה [אנגינה])
 - דרונדרזון, פרופאפנון, כינידין (טיפול במלחות לב ולתקין קצב פעימות לב לא סדיר)
 - ריפמפיקין, ריפפנטין (טיפול בziehomim Chiyakim)
 - אפלוטמיד, נרטיניב, ונטוקליקס (טיפול בסרטן)
 - קארבאאמזפין, פנוברביטל, פיטואין, פרימידון (למניעה ושליטה בפרכוסים)
 - קוליצין (טיפול בשיגdon)
 - טרפאנדין (טיפול באלהרגיות)
 - לורסידון (טיפול בסכיזופרניה)
 - פימוזיד, קווטיאfine (טיפול בסכיזופרניה, הפרעה דו קוטבית, דיכאון חמור ומחשבות ורגשות בלתי רגילים)
 - סילודזין (טיפול בבלוטת ערמוניית מוגדלת)
 - אפלרנון ואיוביידין (טיפול בעוויות לב ו/או כלי דם)
 - דהידרארגוטמין ורגוטמין (טיפול בכאבי ראש ממיגרנות)
 - ארגונובין ומתיילארגונובין (משמש לעצירת דימום מוגבר שעלול להתרכש בעקבות לידת או הפליה)
 - ציסאפריד (להקלת בעיות קיבת מסויימות)

- פוליבוטון (טיפול בעורק הריאתי)
- פוליבוטין, סימבסטין, לומיטheid (להורדת כולסטרול)
- אלטריפטן (טיפול בכאבי ראש מיגרנותיים)
- לומקט/or/אבקפטור(טיפול בシステיק פיברוזיס)
- פינרנון (טיפול במחלת כלות קרונית המקושרת לסכרת II TYPE II)
- נלקסגול (טיפול בעצירות כתוצאה משימוש מאופיאודים)
- אונופיל, רדנפיל (טיפול בעורק הריאתי [ידעו גם בשם אימפרונציה])
- סילדנafil, טדלייל (טיפול בעורק הריאתי [ידעו גם בשם אימפרונציה] או יתר לחץ דם ריאתי עורקי [לחץ דם גבוה בעורק הריאתי])
- קלורואזפאט, דיאזפאם, אסטוזום, פלורוזם, טרייזולם, מיאזולים במתן דרך הפה (משמשים להקלת על חרדה ו/או בעיות שינה)
- טולבפטן המשמש לטיפול בהיפונתרמיה (רמות נמוכות של נתון בدم)

ażhorot miyadot haengutot leshimosh batraofa

- **תגובה אלרגיות-** כולל תגבות אלרגיות חמורות (ידועות בשם אנפילקסיס), יכולות להתרחש אצל אנשים הנוטלים פקסולוביד, אפילו לאחרguna אחת בלבד . הפסק ליטול פקסולוביד ווצר קשור עם רופא מייד אם אתה מקבל את אחד מהסימנים הבאים של תגובה אלרגית :
 - קושי לבלווא או לנשום
 - נפיחות של הלשון, הפה והפנים
 - היצרות בגרון
 - צרידות
 - גירוד
 - פריחה בעור
- **סיכון להתקפות עמידות ל- HIV –** אם יש לך Ziham HIV לא מטופל ו/או לא מבוקר, פקסולוביד עלול להוביל לך שתרופות מסוימות ל-HIV לא יפעלו באותה מידת בעודי .

לפני הטיפול בתראופה ספר לרופא אם :

- יש לך או הייתה לך מחלת כבד . הפרעות באנזימי כבד, הפטיטיס (דלקת כבד) וצהבת התרחשו בחולים אשר קיבלו ריטוניבר.
- יש לך או הייתה לך מחלת כלות .
- יש לך לחץ דם גבוה . יתכן שהרופא שלך יצריך לבדוק את לחץ הדם שלך לפני נטילת פקסולוביד ובזמן שאתה נוטל תרופה זו. הי' דיווחים על לחץ דם גבוה אצל אנשים הנוטלים פקסולוביד, במיוחד אצל אנשים מבוגרים .

ילדים ומבוגרים
אין לחת פקסולוביד לילדים ומבוגרים מתחת לגיל 18 , מכיוון שלא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בילדים ומבוגרים .

תגובה בין תרופתיות
אם אתה לוקח או אם לך תרופה אחרת, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח .

- ישנן תרופות אחרות שאין ליטול יחד עם פקסולוביד. ראה סעיף 'אין להשתמש בתראופה אם'. כמו כן ספר לרופא אם אתה נוטל, נטلت לאחרונה או עשי ליטול תרופות אחרות כלשהן . במיוחד ספר על :
- תרופות המשמשות לטיפול בסרטן , כגון אפטיניב, אבטמציליב, סריטיניב, דסטיניב, אנקורפניב, פוסטמנטיניב, איברוטיניב, איבוסידיניב, נילוטיניב, יונבלסטין ווינקריסטין .
 - תרופות המשמשות לדילול דם (נגדית קרשה), כגון וורפרין, ריברוקסבן, דיביגטן ואפיקסבן
 - תרופות המשמשות לטיפול בפרכוסים, כגון דיזולפרואקס, למוטריג'ן וקלונאנזפאם
 - תרופות המשמשות להפסקת עישון, כגון בופרופיון
 - תרופות המשמשות לטיפול באלהגיוט, כגון פקספנדין ולוראטדין
 - תרופות המשמשות לטיפול בziehomim פטרייתיים (אנטי פטרייתיים) , כגון איטראקונזול וויריקונזול
 - תרופות המשמשות לטיפול בתסמונת קושינג- כאשר הגוף מייצר עודף קורטיזול, כגון טבליות קטוטוקונזול

- תרופות המשמשות לטיפול בזיהום HIV, כגון אפאבירןץ, מאראיבירוק, רלטגרביר, זידובודין וביקטגרביר/אמטריציטאבין/טנופובייר
- תרופות המשמשות לטיפול בזיהומיים (כמו אנטיביוטיקות ונטרי-מיוקובקטריאליים), כגון אטוביוקין, קלריטרומיצין, אריתרומיצין, חומצה פוסידית (במثان דרך הפה או מثان עור וריד), בדקיולין, ריפאבטון, דלאמניד, סולפמתוקסוזול/טרימטופרים
- תרופות המשמשות לטיפול בסכיזופרניה ובמחשבות ורגשות חריגים, כגון קלוזאפין
- תרופות המשמשות להפרעות נפשיות או הפרעות במצב הרוח, כגון הלופרידול, רספרידון ותיזוריידין
- תרופות המשמשות לטיפול בלחץ דם גבוה בכלי הדם הריאתיים, כגון בוסונטן וריזיגואט
- תרופות המשמשות לטיפול בלחץ דם גובה (יתר לחץ דם), כגון אמלודיפין, דילטיאזם, פלודיפין, לרקנידיפין, נירדרדיפין, ניפדייפין וורפמייל
- תרופות המשמשות לטיפול בעבויות לב /או כל דם כגון אליסקירן, טיקגרלור, צילוסטוזול וקלופידיוג'רל
- ודייסופירמיד
- תרופות המשמשות לטיפול בסיסטיק פיברוזיס, כגון אביקפטור, אלקסקפטור/טזקפטור/איבקפטור ו- טזקפטור/איבקפטור
- תרופות המשמשות לטיפול בסכרת כגון סקסגאליפטן
- תרופות המשמשות לטיפול בדלקת כבד נגיפית (הפטיטיס C), כגון גלקפרבריר/פיברנטספיר ו- סופוסוביר/ולפטספיר/ווקסילאפרבריר
- תרופות המשמשות להורדת הכלולסטרול בדם, כגון אטורבסטטין, פלובסטטין, פרבסטטין ורוזובסטטין
- תרופות המשמשות לטיפול באכבי בבריחת שתן כגון רימגפנטן
- תרופות המשמשות לטיפול בעבויות נפשיות כגון אורפיירוזול, ברקסיפירוזול וקריפרדין
- תרופות המשמשות לטיפול בהפרעות אוטואימוניות כולל דלקת מפרקים שగונית, דלקת מפרקים פסוריינית או קוליטיס כיבית, כגון טופסיטיניב ואופדיםיטיניב.
- תרופות המשמשות לטיפול באכבי חמור, כגון מורפין, פנטניל, אוקסיקודון, מתdone, בופרנוורפין, תרופות אחרות דמיות מורפיין, פטידיין ופרוקסיקם
- תרופות המשמשות כתרופות הרגעה, היונטיות ומשרי שינה, כגון אלפראצולאם, בוספiron וזולפידם
- תרופות המשמשות לטיפול בהפרעת קשב או הפרעת שינה הנקראית נורקלופסיה, כגון אמפתמין סטרואידים כולל קורטיקואיסטרואידים המשמשים לטיפול בדלקת, כגון בודסוניד, דקסמתזון, פוליטיקזון, פרדניזולון וטריאמצינולון
- תרופות המשמשות לטיפול באסתמה ובעוות אחרות הקשורות לריאות, כגון מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD), כגון סאלמטרול וטאפיילין
- תרופות המשמשות לטיפול בדיכאון, כגון אמיטריפטילין, פלאואוקסטין, אימיפרמין, נורטריפטילין, פרוקסטן וסרטראליין
- תרופות המשמשות לטיפול תחלIFI בבלוטת התריס, כגון לבוטירוקסין
- תרופות המשמשות לטיפול בערמוניות מגדלת, כגון טמסולואין
- כל אחת מהתרופות הבאות :
- אמצעי מניעה דרך הפה או מדבקה המכילה אתניל אסטרדיול המשמשים למניעת הריאן
- מידוזולם בהזרקה (משמש להרגעה/טשטוש [מצב ערך רגוע מאוד של שלווה או נמנום במהלך בדיקה או הליך רפואי] או הרדמה)

לפקסולוביד תגבות בין תרופתיות עם תרופות רבות. **שמור רשיימה של התרופות שלך כדי להראות לרופא או לרוקח שלך.** אל תתחל ליטול תרופה חדשה מבלי לידע את הרופא שלך. הרופא יכול לסייע לך אם זה בטוח ליטול פקסולוביד עם תרופות אחרות.

שימוש בתרופה ומazon ניתן ליטול פקסולוביד עם או ללא מזון

הירין והנקה

אם את בהירין, חשוב שתיתכן שאתה בהירין או מתכונת להרhot,attiיעץ עם הרופא לפני Nutzung התרופה. אין מספיק מידע שפקסולוביד בטוח לשימוש בהירין. אם אתה בהירין, לא מומלץ להשתמש בפקסולוביד אלא אם מצבך הרפואי מחיב טיפול זה.

מומלץ להימנע מפעילות מינית או להשתמש באמצעי מניעה בזמן נטילת פקסולוביד ובמשך 7 ימים לאחר סיום הנטילה של פקסולוביד באמצעות מאכע זיהירות. אם את משתמשת באמצעות מאכע מניעה הורומונליים, מומלץ להשתמש בקונדומים או באמצעות מאכע מנעה לא הורומונליים אחרים, מכיוון שפקסולוביד עשוי להפחית את היעילות של מאכע מנעה הורומונליים. הרופא שלך ייעז לך לגבי משך ההתקאה הנדרשת של מאכע המנעה שלך.

אין מידע על השימוש בפקסולוביד בהנקה. אין להניך את תינוקך בזמן נטילת פקסולוביד ובמשך 7 ימים לאחר סיום הנטילה כאמצעי זיהירות.

נהיגה ושימוש במכונות
לפקסולוביד לא צפוי להיות השפעה על נהיגה או על שימוש במכונות.

מידע חשוב על חלק המרכיבים של התרופה
פקסולוביד מכילה לקטוז - אם נאמר לך על ידי הרופא שלך כי יש לך אי סבירות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא בטרם השימוש בתכשיר.
פקסולוביד מכילה נתרן - טבליות נירמטרלביר וריטונביר מכילות כל אחת כמות של פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן למנה, כולל נחשים "נטולי נתרן".

3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמייד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן השימוש המקובלים בדרך כלל הם:

פקסולוביד מרכיבת מ- 2 תרופות: נירמטרלביר וריטונביר. המנה המומלצת הינה 2 טבליות נירמטרלביר (טבליות ורודות) עם טבליה אחת של ריטונביר (טבליה לבנה) דרך הפה, פעמיים ביום מdryום (בבוקר ובערב) .

כל מגש בלייסטר מכיל 4 טבליות נירמטרלביר (150 מ"ג כל אחת) ו-2 טבליות ריטונביר (100 מ"ג כל אחת) ומתחאר אליו טבליות צדפות להינטל בבוקר ובערב (על פי צבעי הרקע השונים).
משך הטיפול הינו 5 ימים. עברו כל מנה, יש ליטול את כל ה-3 טבליות יחד באותו מועד.

אם התסמים שלך חממים או אינם משתפרים לאחר 5 ימים, התיעז עם הרופא שלך.

אם יש לך מחלת כליות, אנא שוחח עם הרופא לקבלת מינון מתאים של פקסולוביד .

יש לבלוע את הטבלייה בשלמותה עם או ללא מזון . אין ללעוס, לחצוט או לכתוש את הטבליות לאחר שהשפעת המנתן בדרך זו לא נבדקה.

אין לטעור על המנה המומלצת.

יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם נטלת מינון גבוי יותר של פקסולוביד או אם בטעות בעלך לצד מהתרופה
פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול פקסולוביד

אם החמצת מנתה של פקסולוביד בטוחה של 8 שעות מהזמן שאתה נטל אותה בדרך כלל , תול אותה ברגע שנזכרת. אם החמצת מנתה ביותר מ- 8 שעות, דלג על המנה שנשכחה וטול את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול 2 מנות פקסולוביד בו זמןנית .

אין ליטול מנתה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.

אם אתה מפסיק ליטול פקסולוביד
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התיעוץ עם הרופא

אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנר זוקם להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפקסלוVID עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הללו. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהם.

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שימושיות ב- עד 1-10 משתמשים מתוך 100):

- שלשול
- הקאה
- בחילה
- שינוי בחוש הטעם (כגון טעם מתכתי, מר)
- כאב ראש

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שימושיות ב- 10-1-10 משתמשים מתוך 1,000):

- תגובה אלרגית (כגון גרד או פריחה עורית)
- לחץ דם גבוה
- כאב בטן
- כאב שרירים

תופעות לוואי נדירות (תופעות שימושיות ב 10-1-10 משתמשים מתוך 10,000):

- תגובה אלרגית חמורה הדועה בשם 'אנפילקסיס' (כגון נפיחות של הלשון, הפה והפנים, קושי לבולע או לנשום, היצרות בגרון או צרידות)
- תחושה כללית רעה

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת, או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות קישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הביתי של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת! תרופה זו יכולה לגרום אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כן תמנע הרעלת. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא."
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתyiיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין תנא אחסון מיוחד. מומלץ לשמור בטמפרטורת בחדר.

6. מידע נוסף

נוסך על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

טבלית נירמטרלביר:

microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, colloidal silicon dioxide, sodium stearyl fumarate

: ציפוי (Opadry Pink)

HPMC 2910/Hypromellose, titanium dioxide, macrogol/PEG, iron oxide red.

טבלית ריטונביר:

copovidone, calcium hydrogen phosphate, sorbitan laurate, sodium stearyl fumarate, silica, colloidal anhydrous, ethanol (It will not appear in the final product except in trace)

: (Opadry white ציפוי

HPMC 2910/Hypromellose 6cp (E464), titanium dioxide (E171), macrogol /PEG ,MW 400 (E1521), hydroxypropyl cellulose (E463), talc (E553b), macrogol/PEG, MW 3350,MACROGOL 4000 (E1521),silica, colloidal anhydrous (E551), polysorbate 80 (E433).

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה:

אריזת פקסלוביד מכילה 30 טבליות מצופות המחולקות ב- 5 מגשי בליסטר ארוזים בקרטון.

כל מגש בליסטר מכיל 4 טבליות נירטראלביר (50 מ"ג כל אחת) ו-2 טבליות ריטונביר (100 מ"ג כל אחת) ומתאראילו טבליות צריכות להינטל בבוקר ובערב (על פי צבע הרקע השונים).

טבליה מצופה נירטראלביר 150 מ"ג : טבליה ורודה, בצורת אליפסה עם הטבעה של 'PFE' בצד אחד ו-'CL' בצד השני.

טבליה מצופה ריטונביר 100 מ"ג : טבליה בצבע לבן עד קرم (off-white), בצורת קפסולה עם הטבעה של 'H' בצד אחד ו-'R9' בצד השני.

בעל הרישום וכותבו: פיבר פרמצטטיקה ישראל בע"מ, רח' שנקר 9, הרצליה פיתוח 46725.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות הוא:

לשם הפשתות ולהקלת הקRIAה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

02/2024 אושר ב-