

## نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

### **ويلبوترين XR 150 ملغ أقراص ذات تحرير مطول**

يحتوي كل قرص على:

بوپروپیون هیدروکلورید (bupropion hydrochloride) 150 ملغ

### **ويلبوترين XR 300 ملغ أقراص ذات تحرير مطول**

يحتوي كل قرص على:

بوپروپیون هیدروکلورید (bupropion hydrochloride) 300 ملغ

لائمة المواد غير الفعالة ومثيرة للحساسية في المستحضر، انظر الفقرة 6 – "معلومات إضافية".  
 إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك  
 أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.  
 وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.  
 ويلبوترين XR غير مخصص للعلاج لدى أطفال دون عمر 18 سنة.

#### **1. لأي غرض مخصص الدواء؟**

ويلبوترين XR هو دواء مخصص لعلاج نوبات الاكتئاب الكبير. بعد استجابة مرضية، يكون استمرار العلاج باستعمال  
 ويلبوترين XR ناجعاً في منع الانتكاس.  
**الفصيلة العلاجية:**  
 مضادات الاكتئاب الأخرى (other antidepressants).

هو يعتبر مستجبياً لمركبات كيميائية في الدماغ تسمى نورأدرينالين ودوپامين.

#### **2. قبل إستعمال الدواء**

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) لبوپروپیون أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6).
  - كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على بوپروپیون
  - تم تشخيصك على أنه تعاني من الصرع أو لديك سابقة لاختلالات
  - يوجد لديك أو كان لديك اضطراب في الأكل (مثلاً، الشره (bulimia) أو القهم العصبي ((anorexia nervosa))
  - كان لديك ورم في الدماغ
  - كنت تشرب عادة المشروبات الروحية بشكل مفرط وقد توقفت للتو أو أنه على وشك التوقف عن شربها
  - كانت لديك مشاكل كبدية خطيرة
  - كنت قد توقفت مؤخراً عن تناول أدوية مهدئة، أو إذا كنت على وشك التوقف عن تناولها في الوقت الذي تتناول
  - ويلبوترين XR
  - كنت تتناول أو قد تناولت أدوية أخرى للاكتئاب أو لداء الباركينسون تسمى مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOIs) خلال الـ 14 يوماً الأخيرة.
- إذا إنطبقت عليك إحدى هذه الحالات، تحدث فوراً مع الطبيب، بدون تناول ويلبوترين XR.**

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء  
 تحدث مع الطبيب قبل إستعمال ويلبوترين XR.

#### **متلازمة بروغادا**

إذا كانت لديك حالة تسمى متلازمة بروغادا (متلازمة وراثية نادرة تؤثر على نظم القلب) أو إذا حدثت سكتة قلبية أو موت  
 مفاجئ في عائلتك.

## الأطفال والمرأهقون

وبلبوترین XR غير مخصص للعلاج لدى أطفال دون عمر 18 سنة.

هناك خطورة زائدة لسلوكيات وأفكار إنتشارية عندما يُعالج الأطفال دون عمر 18 سنة بمضادات الإكتئاب.

## الكبار

يجب أن يعرف الطبيب قبل أن تتناول وبلبوترین XR إذا:

- كنت تشرب كميات كبيرة من الكحول بشكل دائم
  - كان لديك سكري الذي لأجله تستعمل الإنسولين أو أقران
  - كان لديك إصابة خطيرة في الرأس أو سابقة لرضاة في الرأس
- تبين أن وبلبوترین XR يسبب نوبات (إختلالات) لدى ما يقارب 1 من بين 1,000 شخص. يرجح أكثر أن يحدث هذا العرض الجانبي لدى أشخاص من المجموعات المذكورة أعلاه. إذا كان لديك نوبة صرع خلال العلاج فعليك التوقف عن تناول وبلبوترین XR. لا تستمر في العلاج وتوجه إلى الطبيب
- كنت تعاني من إضطراب ثانٍ القطب (تغيرات قصوى في المزاج)، لأن وبلبوترین XR قد يؤدي إلى عوارض لهذا المرض
  - كنت تتناول أدوية أخرى للإكتئاب، فإن إستعمال هذه الأدوية سوية مع وبلبوترین XR يمكن أن يؤدي لمتلازمة السيروتونين، حالة بإمكانها أن تشكل خطراً على الحياة (أنظر "تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية" في هذه الفقرة)
  - كانت لديك مشاكل في الكبد أو في الكلى، قد يكون لديك احتمال أكبر للمعاناة من أمراض جانبية.  
إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه، تحدث ثانية مع الطبيب قبل تناول وبلبوترین XR. قد يرغب بأن يكرس اهتماماً خاصاً لعلاجك، أو أن يوصي بعلاج آخر.

## أفكار إنتشارية وتفاقم الإكتئاب

إذا كنت مكتئباً، فقد تراودك أحياناً أفكار بليذاء النفس أو الإنتحار. قد تزداد هذه الأفكار عند البدء في تناول مضادات الإكتئاب لأول مرة، حيث تستغرق هذه الأدوية وقتاً كي تبدأ بالتأثير، على الأغلب نحو أسبوعين، بل أكثر من ذلك في بعض الأحيان. هناك إحتمالية أكبر بأن تعاني من هذا إذا:

- كانت لديك في الماضي أفكار إنتشارية أو لإلحاق الأذى بنفسك.
  - كنت شاباً يافعاً. أظهرت المعلومات من التجارب السريرية وجود خطورة زائدة لسلوك إنتشاري لدى كبار دون عمر 25 سنة الذين يعانون من حالات نفسية والذين عولجوا بمضاد للإكتئاب.
- إذا كانت لديك أفكاراً بليذاء النفس أو الإنتحار في أي وقت كان، اتصل بالطبيب أو توجه إلى المستشفى فوراً.
- قد تجد أنه من المفيد أن تحكي لأحد أقربائك أو صديقك قريباً بأنك تعاني من الإكتئاب، وأن تطلب منهم قراءة هذه النشرة. يمكنك أن تطلب منهم أن يبلغوك إذا كانوا يعتقدون أن الإكتئاب لديك ينقاوم، أو إذا كانوا قلقين بخصوص تغيرات في سلوكك.

## تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو تناولت أدوية أخرى للإكتئاب أو لمرض پاركينسون التي تسمى مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOIs) خلال الـ 14 يوماً الأخيرة، إحك للطبيب بدون تناول وبلبوترین XR (أنظر أيضاً "لا يجوز إستعمال الدواء إذا" في الفقرة 2).

إذا كنت تتناول، إذا تناولت مؤخراً أو من الجائز أن تتناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. من الجائز أن يغير جرعة الـ وبلبوترین XR، أو يقترح تغيير بأدوينك الأخرى.

لا تندمج أدوية معينة مع وبلبوترین XR. قد يزيد بعضها من احتمال حدوث نوبات أو إختلالات. قد تزيد أدوية أخرى من خطورة حدوث أعراض جانبية أخرى. فيما يلي تفصيل لبعض الأمثلة، لكن هذه ليست قائمة كاملة.

قد يكون هناك احتمال أكبر من المعتاد لحدوث إختلالات إذا:

- كنت تتناول أدوية أخرى للإكتئاب أو لأمراض نفسية أخرى
- كنت تتناول تينوفيلين للربو أو لمرض رئوي
- كنت تتناول ترامادول، مسكن قوي للألم
- تناولت أدوية مهدئة، أو إذا كنت على وشك التوقف عن تناولها بينما ما زلت تتناول وبلبوترین XR (أنظر أيضاً "لا يجوز إستعمال الدواء إذا" في الفقرة 2)
- كنت تتناول أدوية ضد الملاريا (مثل ميفلوكون أو كلوروكون)
- كنت تتناول منشطات أو أدوية أخرى للسيطرة على الوزن أو الشهية للطعام
- كنت تتناول ستيرونيدات (عن طريق الفم أو بالحقن)

- كنت تتناول مضادات حيوية تسمى كوبينولونات
  - كنت تتناول أنواع معينة من مضادات الهيستامين التي قد تسبب الميل إلى النوم
  - كنت تتناول أدوية للسكري.
- إذا إنطبقت عليك إحدى هذه الحالات، تحدث مع الطبيب فوراً، قبل تناول ويلبوترین XR. يدرس الطبيب الفوائد والمخاطر من أجلك عند تناول ويلبوترین XR.

- قد يكون هناك احتمال أكبر من المعتاد لحدوث أعراض جانبية أخرى إذا:
- كنت تتناول أدوية أخرى للإكتئاب (مثل أميتربيتين، فلوكوكسيتين، باروكسيتين، سيتالوپرام، إسيتالوپرام، فينلافاكسين، دوسولبيين، ديسيرامين أو إيميرامين) أو لأمراض نفسية أخرى (مثل كلوزاپين، ريسپریدون، تيوريدازين أو أولانزابين).
  - من شأن ويلبوترین XR أن يتفاعل مع أدوية معينة تستعمل لعلاج الإكتئاب وقد تقاسي من تغيرات في الحالة النفسية (مثلاً، عدم هدوء، هلسة، غبوبة)، وتغيرات أخرى مثل حرارة الجسم فوق 38°C، إرتفاع نظم القلب، عدم استقرار ضغط الدم ومنعكشات مفرطة، تصلب العضلات، فلة التنفس وأعراض الجهاز الهضمي (مثلاً غثيان، تقيؤ، إسهال).
  - كنت تتناول أدوية لداء الباركنسون (ليفووديا، أمانتادين أو أورفينادين)
  - كنت تتناول أدوية تؤثر على قدرة جسمك على تفكك ويلبوترین XR (كاربامازيبين، فينيتوين، فالبروات)
  - كنت تتناول أدوية معينة تستعمل لعلاج السرطان (مثل سيكلووفوسفاميد، إيفوسفاميد)
  - كنت تتناول كلوبيدوغريل الذي يستعمل بشكل خاص لمنع حدوث سكتة
  - كنت تتناول حاجبات بيتا معينة (مثل ميتوبرولول)
  - كنت تتناول أدوية معينة لعدم إنتظام نظم القلب (بروپافينون أو فليكاينيد)
  - كنت تستعمل لصقات نيكوتين لمساعدة على الإقلاع عن التدخين.
- إذا إنطبقت عليك إحدى هذه الحالات، تحدث مع الطبيب فوراً، قبل تناول ويلبوترین XR.

- قد يكون ويلبوترین XR أقل نجاعة
- إذا كنت تتناول ريتونافير أو إيفاقيريز، أدوية لعلاج تلوث HIV.
- إذا إنطبق هذا عليك، إحك للطبيب. سوف يفحص الطبيب مدى نجاعة ويلبوترین XR بالنسبة لك. قد يكون من الضروري رفع جرعتك الدوائية أو تغيير علاج الإكتئاب لديك إلى علاج آخر. لا ترفع جرعة ويلبوترین XR خاصتك بدون إستشارة الطبيب، حيث إن هذا الأمر قد يزيد من خطورة حصول أعراض جانبية لديك، يشمل إختلالات.

- قد يقل ويلبوترین XR من نجاعة أدوية أخرى
- إذا كنت تتناول تاموكسيفن الذي يستعمل لعلاج سرطان الثدي.
  - إذا إنطبق هذا عليك، تحدث مع الطبيب. قد تكون هناك حاجة لتغيير العلاج بعلاج آخر للإكتئاب لديك.
  - إذا كنت تتناول ديجوكسين لعلاج القلب.
  - إذا إنطبق هذا عليك، تحدث مع الطبيب. قد يدرس الطبيب ملامحة المقدار الدوائي لديجوكسين.

- ### استخدام الدواء واستهلاك الكحول
- يمكن للكحول أن يؤثر على طريقة عمل ويلبوترین XR وعندما يؤخذان سوية، يمكنهما في حالات نادرة، أن يؤثرا على أعصابك أو على حالتك النفسية. بعض الأشخاص يجدون أنهم أكثر حساسية للكحول عندما يتناولون ويلبوترین XR. قد يوصيك الطبيب بعدم شرب الكحول (بيرة، نبيذ أو مشروبات روحية) عندما تتناول ويلبوترین XR، أو أن تحاول أن تقلل جداً من الشرب. لكن إذا كنت معتاداً على شرب كميات كبيرة من الكحول في الوقت الحالي، فلا تتوقف بشكل مفاجئ؛ فقد يزيد ذلك من خطر الإصابة بنوبات صرع.
- تحث مع الطبيب بخصوص شرب الكحول قبل أن تبدأ بتناول ويلبوترین XR.**

- ### التأثير على فحوص البول
- قد يشوش ويلبوترین XR على فحوص بول معينة لتشخيص أدوية أخرى. إذا توجب عليك الخضوع لفحص بول، إحك للطبيب أو المستشفى بأنك تتناول ويلبوترین XR.

- ### الحمل والإرضاع
- لا تتناولـي ويلبوترـين XR إذا كنتـ في فـترة الـحمل، تـعتقدـينـ بأنـهـ منـ الجـائزـ أنـكـ حـاملـ أوـ تـخطـطـينـ لـلـحملـ، إـلاـ إـذاـ أـوصـىـ الطـبـبـ بـذـلـكـ. إـسـتـشـيرـيـ الطـبـبـ أوـ الصـيـدـلـيـ قـبـلـ تـناـولـ هـذـاـ الدـوـاءـ. بـعـضـ الـأـبـحـاثـ، لـكـ لـيـسـ جـمـيعـهـاـ، أـشـارـتـ إـلـىـ إـرـفـاعـ خـطـورـةـ حـدـوـثـ نـشـوـهـاتـ خـلـقـيـةـ، خـاصـةـ نـشـوـهـاتـ قـلـبـيـةـ، لـدـىـ رـُضـعـ تـناـولـتـ أـمـهـاـتـهـمـ وـيلـبـوـتـرـينـ XRـ. مـنـ غـيرـ المـعـرـفـ فـيـماـ إـذـاـ

كان ذلك في أعقاب إستعمال ويلبوترین XR. يمكن لمركبات ويلبوترین XR أن تنتقل إلى حليب الأم. إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول ويلبوترین XR.

### السيارة وإستعمال الماكنات

إذا كان ويلبوترین XR يسبب لك الدوار أو الشعور بأنك توشك على الإغماء، لا تقد أو تشغل أية أدوات أو ماكنات.

### 3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

قد يستغرق فترة من الزمن حتى تبدأ الشعور بتحسن. يستغرق فترة من الزمن حتى يتم الحصول على تأثير كامل للدواء، في بعض الأحيان أسبوع أو أشهر. عندما يبدأ شعورك بالتحسن، قد يوصيك الطبيب بالإستمرار بتناول ويلبوترین XR لمنع عودة الإكتئاب.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية الإعتيادية للكبار فقط هي قرص واحد من عيار 150 ملغ مرة في اليوم.

قد يزيد الطبيب جرعتك الدوائية إلى 300 ملغ مرة في اليوم إذا لم يتحسن الإكتئاب لديك بعد عدة أسبوعين.

خذ جرعة أقراص ويلبوترین XR خاصةك في الصباح. لا يجوز تناول ويلبوترین XR أكثر من مرة واحدة في اليوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

القرص مطلي بقشرة التي تحرر الدواء ببطء داخل جسمك. قد تلاحظ شيئاً في البراز لديك يبدو مثل قرص. إنها القشرة الفارغة التي تخرج من جسمك.

ابل الأقراص بشكلها الكامل. لا يجوز مضغها، سحقها أو شطرها – إذا قمت بذلك، هناك خطرة بأن تأخذ مقدار دوائي مفرط، حيث أن الدواء سيتحرر إلى داخل جسمك بشكل أسرع. سوف يزيد ذلك من إمكانية حدوث أعراض جانبية لديك، يشمل نوبات (اختلالات).

بعض الأشخاص يستمرون بتناول قرص واحد من عيار 150 ملغ في كل يوم خلال كامل فترة علاجهم. قد يصف لك الطبيب ذلك إذا كانت لديك مشاكل كبدية أو كلوية.

### مدة العلاج

فقط أنت والطبيب يمكنكم أن تقررا كم من الوقت عليك تناول ويلبوترین XR. قد يستغرق أسبوعين أو أشهر من العلاج حتى تلاحظ تحسن أيًّا كان. تحدث عن أعراضك مع الطبيب بشكل دائم ليتم التقرير كم من الوقت عليك تناوله. عندما تبدأ بالشعور بتحسن، قد يوصيك الطبيب بالإستمرار بتناول ويلبوترین XR لمنع عودة الإكتئاب.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

إذا كنت تتناول أقراصًا أكثر من اللازم، قد تزيد من خطرة حدوث نوبات أو اختلالات.

لا تتأخر. إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، انتظر وتناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد.

لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب المراقبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن تناول ويلبوترین XR أو تقليل الجرعة الدوائية بدون إستشارة الطبيب أولاً، حتى ولو طرأ تحسن على حالي الصحية.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لذلك.

إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

## **القنية مغلقة بقطاء صعب للفتح من قبل الأطفال**

تعليمات الفتح: لإزالة الغطاء، يجب الضغط للأسفل وفي نفس الوقت التدوير لليسار (عكس إتجاه عقارب الساعة).  
تعليمات الإغلاق: يجب وضع الغطاء على الطرف المفتوح للقنية والتدوير بإتجاه اليمين (في إتجاه عقارب الساعة) حتى يُغلق تماماً.

## **4. الأعراض الجانبية**

كما بكل دواء، إن إستعمال ويلبوترين XR قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

### **أعراض جانبية خطيرة نوبات أو إختلالات**

نحو 1 من كل 1,000 شخص الذين يتناولون ويلبوترين XR معرض لخطرة حدوث نوبة (إختلاج أو تشنج). يزيد إحتمال حدوث ذلك إذا كنت تتناول ويلبوترين XR أكثر من اللازم، إذا كنت تتناول أدوية معينة، أو إذا كنت معرضاً لخطرة أعلى من المعادل لحدث نوبات. إذا كنت قلقاً، تحدث مع الطبيب.  
إذا اخترت نوبة، إحك للطبيب بعد أن تتعافي. لا تتناول أقراصاً إضافية.

### **ردود فعل تحسسية**

قد يطور بعض الأشخاص ردود فعل تحسسية تجاه ويلبوترين XR. تشمل هذه:

- جلد أحمر أو طفح (يشبه الشرى)، حويصلات أو درنات حاكمة (شرى) على الجلد. إن بعض أنواع الطفح الجلدي هذه قد توجب علاجاً في المستشفى، خاصة إذا كنت تعاني أيضاً من آلام في الفم أو في العينين.
- صفير غير اعتيادي بالتنفس أو صعوبات في التنفس
- إنفاس في الجفونين، الشفتين أو اللسان
- آلام في العضلات أو المفاصل
- إنهايار أو فقدان الوعي.

إذا كانت لديك أية علامات لرد فعل تحسسي إتصل بالطبيب حالاً. لا تتناول أقراصاً إضافية.

قد تستمر ردود الفعل التحسسية لفترة طويلة. إذا وصف لك الطبيب شيئاً ليساعدك بخصوص أعراض الحساسية، تأكد من تناول العلاج حتى نهايته.

طفح جلدي لـ لوبيوس (ذئبة) أو تفاقم في أعراض الدلوبيوس  
شيوع غير معروف - لا يمكن تقدير الشيوع من المعلومات المتوفرة لدى أشخاص يتناولون ويلبوترين XR.  
يعتبر الدلوبيوس إضطراب في الجهاز المناعي الذي يؤثر على الجلد وأعضاء أخرى.  
← إذا قاسيت من احتدامات لـ لوبيوس، طفح جلدي أو آفات ( خاصة في المناطق المعرضة للشمس ) خلل تناول ويلبوترين XR، إتصل بالطبيب فوراً، لأنه من الجائز أن يحتاج الأمر إلى التوقف عن العلاج.

### **بثار طفحي معمم حاد (Acute Generalised Exanthematous Pustulosis -AGEP)**

شيوع غير معروف - لا يمكن تقدير الشيوع من المعلومات المتوفرة لدى الأشخاص الذين يتناولون ويلبوترين XR.  
تشمل أعراض AGEP طفح مع بثور/حويصلات مليئة بالقيح.

← إذا كان لديك طفح مع بثور/حويصلات مليئة بالقيح، اتصل بالطبيب على الفور، لأنه قد تكون هناك حاجة للتوقف عن العلاج.

### **أعراض جانبية إضافية**

#### **أعراض جانبية شائعة جداً**

قد تظهر هذه لدى أكثر من 1 من كل 10 أشخاص:

- صعوبات في النوم. تأكد من تناولك ويلبوترين XR في الصباح
- صداع
- جفاف في الفم
- شعور بغثيان، تقيؤ.

## أعراض جانبية شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص:

- سخونة، دوار، حكة، تعرق وطفح جلدي (في بعض الأحيان بسبب رد فعل تحسسي)
- رجفان، ضعف، إرهاق، الالم في الصدر
- شعور بالقلق أو العصبية
- ألم البطن أو إضطرابات أخرى في الجهاز الهضمي (إمساك)، تغيرات في مذاق الطعام، فقدان الشهية للطعام (anorexia)
- إرتفاع ضغط الدم يكون خطيراً أحياناً، تورّد
- طنين في الأذنين، إضطرابات في الرؤية.

## أعراض جانبية غير شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 100 شخص:

- شعور بالإكتئاب (أنظر أيضاً الفقرة 2 "تحذيرات خاصة تتعلق بـاستعمال الدواء"، تحت "أفكار إنتحارية وتفاقم الإكتئاب")
- شعور بإرباك
- صعوبة في التركيز
- نظم قلب متسرع
- إنخفاض في الوزن.

## أعراض جانبية نادرة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 1,000 شخص:

- اختلالات.

## أعراض جانبية نادرة جداً

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10,000 شخص:

- خفقان القلب، إغماء
- تشنجات، تصلب العضلات، حركات خارجة عن السيطرة، مشاكل في المشي أو في التناول
- شعور بقلة الراحة، عدم الهدوء، عدوانية، أحلام غريبة، شعور بالوخز أو قلة الإحساس، فقدان الذاكرة
- إصفرار الجلد أو بياض عينيك (يرقان) الذي قد يحدث بسبب إرتفاع إنزيمات الكبد، التهاب الكبد (hepatitis)
- ردود فعل تحسسية شديدة؛ طفح سوية مع آلام في المفاصل والعضلات
- تغيرات في نسب السكر في الدم
- تبول زائد أو أقل من المعتاد
- عدم السيطرة على التبول (تبول لا إرادي، تسرب بول)
- طفح شديد في الجلد قد يظهر في الفم وفي أجزاء أخرى من الجسم وقد يشكل خطراً على الحياة
- تفاقم الصدفية (يقع ثنيات من جلد أحمر)
- شعور بالإنفصال عن الواقع أو شعور غريب (تبدد الشخصية)؛ رؤية أو سماع أشياء غير موجودة (هلوسة)؛ الشعور أو الإعتقد بأشياء غير صحيحة (أوهام)؛ الشك بشكل شديد (ذهان خيالي).

## أعراض جانبية شيوها غير معروفة

ظهرت أعراض جانبية أخرى لدى عدد قليل من الأشخاص لكن شيوها الدقيق غير معروف:

- أفكار عن إلحاق الأذى بنفس أو أفكار إنتحارية خلال تناول ويلبوترين XR أو مباشرة بعد التوقف عن العلاج (أنظر الفقرة 2 "قبل استعمال الدواء"). إذا كان لديك مثل هذه الأفكار، اتصل بالطبيب أو توجه إلى المستشفى بشكل فوري
- فقدان العلاقة بالواقع وعدم القدرة على التفكير أو الحكم على الأمور بذهن صافي (ذهان)، أعراض أخرى يمكن أن تشمل هلوسة و/أو أوهام
- شعور مفاجئ بالخوف الشديد (نوبة هلع)
- تأتّأة
- إنخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، إنخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء (leucopenia) وإنخفاض في عدد الصفائح الدموية (thrombocytopenia)
- إنخفاض بنسبة الصوديوم في الدم (hyponatremia)
- تغيير في الحالة النفسية (متلاً، عدم هدوء، هلوسة، غيبوبة)، وتغيرات أخرى مثل حرارة الجسم فوق 38°C، إرتفاع نظم القلب، عدم استقرار ضغط الدم ومنعكسات مفرطة، تصلب العضلات، قلة التنفس و/أو أعراض الجهاز الهضمي (متلاً غثيان، نقيف، إسهال)، أثناء تناول ويلبوترين XR سوية مع أدوية لعلاج الإكتئاب (مثل پاروكسيتين، سينالوپرام،

إسيتالوپرام، فلوكسيتين وفينلافاكسين).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

### التبلیغ عن اعراض جانبیة

بإمكان التبلیغ عن اعراض جانبیة لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبیة عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبیة، أو عن طريق تصفیح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

### 5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجا رؤية الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقىء بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون 25°C. يجب التخزين في العلبة الأصلية للحماية من الرطوبة والضوء.
- للإستعمال خلال 30 يوماً من الفتح.
- تحتوي القنينة على وعاء صغير محكم الإغلاق يحتوي على فحم وجel سيليكا لحفظ على الأفراص جافة. إن ترك الوعاء في القنينة لا ينفع.
- يمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة المهملات في البيت. قم باستشارة الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من أدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. إن ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

### 6. معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً:  
يحتوي القرص على:

Polyvinyl alcohol, glycerol dibehenate.

يحتوي طلاء القرص على:

Ethylcellulose, povidone K-90, methacrylic acid ethyl acrylate copolymer dispersion (Eudragit L30 D-55), macrogol 1450, silicon dioxide, triethyl citrate.

جبر للطباعة:

Shellac glaze, iron oxide black (E172), ammonium hydroxide.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أقراص ويلبوري XR 150 ملغ هي أقراص مدورة بلون أبيض كريم حتى أصفر شاحب مع طباعة "GS 5FV 150" بحرأسود على جانب واحد وملساء من الجانب الثاني. تتوفر بقاني بولي إيتيلين بيضاء التي تحتوي على 7، 30 أو 90 (3X30) قرصاً. القنينة مغلفة بعثاء صعب للفتح من قبل الأطفال.

أقراص ويلبوري XR 300 ملغ هي أقراص مدورة بلون أبيض كريم حتى أصفر شاحب مع طباعة "GS 5YZ 300" بحرأسود على جانب واحد وملساء من الجانب الثاني. تتوفر بقاني بولي إيتيلين بيضاء التي تحتوي على 7، 30 أو 90 (3X30) قرصاً. القنينة مغلفة بعثاء صعب للفتح من قبل الأطفال.  
من الجائز لا تسوق كافة أحجام العلب.

• صاحب الإمتياز: چلاكسوسميكلайн (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتح تکفا.

• المنتج: بوش هيلث كومپانیس INC، مانیتوبا، كندا.

• رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

ويلبوري XR 150 ملغ: 140-05-31653

ويلبوري XR 300 ملغ: 140-06-31654

• من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في كانون الأول 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.  
العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK.  
© 2023 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

*Wel PT v16.2*