

אורומוקס[®]
טבליות

חומר פעיל

כל טבלייה מכילה 250 מ"ג אצטАЗולאמיד (acetazolamide 250 mg).

לרשימת החומרים הבaltı פיעלים וארגניים בתכשיר ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשותה לטיפול במחלותך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

- טיפול משלים בבצקת הנובעת מאי-ספיקת לב או בבצקת הנגרמת לטיפול רפואי.
- טיפול משלים בסוגים שונים של ברקית (גלאוקומה).
- להקלת ומונעה של מחלת גבהים אקוטית.

קובוצה **טרופיתית**: מעכבר האנדיזם קרבוניק أنها ידראץ.

2. לפני השימוש בתרופה אם:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיס (אלרגי) לתרופות ממשפחת הסולפונאמידים, לנגורות סולפונואמיד כולם אצטАЗולאמיד או לפחות ממרכיבי התרופה האחרים (כמפורט בפרק 6).
- אתה סובל מבעיות חמורות בכבד.
- אתה סובל או סבלת בעבר מבעיות חמורות בכליות.
- אתה סובל מסווג מסוים של גלאוקומה הידוע כברקית כרונית של זווית צרה שאינה מלאה בגודש (הרופא יכול לסייע לך).
- אתה סובל מפעילות מופחתת של בלוטות יותרת הכליה – בלוטות מעלה הכליות (ידוע גם כמחלת אדיסון).
- יש לך רמות נמוכות של נתרן ו/או אשלגןدم או רמות גבוהות של כלורدم (הרופא ייעז לך).
- את בהריון.

اذහרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול באורומוקס ספר לרופא אם:

- אתה סובל או סבלת בעבר מבעיות בכליות, כגון אבנים בכליות.
- אתה סובל מבעיות ריאה, כגון ברונכיט (דלקת סمفונות) כרונית או אמפייזמה, הגורמות לקשי נשימה.
- אתה מעלה גיל 65.
- אנשים מוגבלים תחומי מחשבות אלו, פנה מיד לרופא.
- התכשיר עלול להשפיע על בדיקות רפואיות מסוימות. אם אתה מבצע בדיקות רפואיות, עליך לספר לרופא שאתה נוטל אורומוקס.
- ירידת בריאות או כאב בעיניים עלולים להיות תסמינים של הצטברות נזול בשכבות כלי הדם של העין (תפליט כוראידלי או היפרדרות הכוראידי). הדבר עלול להתרחש תוך מספר שעות מניטילת אורומוקס. שוחח מיד עם הרופא אם אתה חווה תסמים אלה.

אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות
אם אתה לוקח או אם לך תרופה אחרת, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על נך לרופא או לרוקח. במיעוד אם אתה לוקח:

- תרופות לבן כגון גליקוזידים של הלב (למשל דיגוקסין)
- תרופות להורדת לחץ הדם
- תרופות לדילול הדם (למשל אפרפין, גליקלזיד)
- תרופות לאפילפסיה או להתקפים (בעיקר פניטואין, פרימידון, קרבמזהפין או טופירמט)
- תרופות המשפיעות על המטבוליזם של חומצה פולית, למשל מתוטרקטט, פירימטמין או טרימטופרים סטרואידים כגון פרדיניזולין
- אספירין ותרופות דומות, למשל חומצה סליצילית או כוילן סליצילאט לפצעים בפה
- תרופות אחרות מקבוצת התרופות הנΚראת מעכבי האנדומים קרבוניק אנהידראז (למשל דורצולאמיד או ברינחולאמיד המשמשות גם לטיפול באלאוקומה)
- אמפטמינים (מריצים), קינידין (טיפול בקצב לב לא סדרי), מתנאמין (למניעת זיהומיים בדרכי השתן) או ליתיום (טיפול בעבויות נפשיות חמורות)
- טיפול בסודיום ביקרבונט (טיפול ברמות חומצה גבוהות בגוף)
- ציקלוספורין (המשמש לדיכוי מערכת החיסון)

שימוש בתרופה ומדוזן

יש לבלווע את התרופה עם מים. יש ליטול את התרופה עם או מיד אחרי הארוחה.

הירין והנקה

אם את בהירין או מיניקה, חשוב שתאת בהירין או מתכנתה להיכנס להירין, יש להיעזר ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

הירין

אין ליטול את התרופה אם את בהירין, חשוב שתאת בהירין או מתכנתה להיכנס להירין.

הנקה

ניתן ליטול את התרופה אם את מיניקה אך רק לאחר היעזרות ברופא.

נהיגה ושימוש במכונות

אם התרופה גורמת לך לתחושת ישנוונות או בלבול, אין לנוהג או להפעיל מכונות. התרופה עלולה לעיתים לגרום לקוצר ראייה. אם תופעה זו מתרכשת ואתה מרגיש שאין יכול לנוהג יותר בבטחה, יש להפסיק לנוהג ולפנות לרופא.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התכשיר מכיל לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך איסביולות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא לפני Nutzung התרופה.

התכשיר מכיל פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן בטבלייה, כך שלמעשה נוחש 'נטולת נתרן'.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטעות בטעות למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון משתנה מאדם לאדם כתלות במצבם.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

אלאוקומה:

מבוגרים: מבוגרים: 250-1,000 מ"ג (4-1 טבליות) ליום במנות מחולקות.

ב仄ת:

מבוגרים: מבוגרים: מבוגרים: מנה התחלתית 375-250 מ"ג (1.5-1.5 טבליות) פעמיים ביום בבוקר. הרופא יתאים את המינון ויאמר לך באיזה תכיפות ליטול את המנה שלך.

מחלות גבריים:

4-4 טבליות ליום במנות מוחלקות.
במקרה של עליה מהירה (כגון במצב חילוץ), המינון המומלץ הוא 4 טבליות ליום.
עדיף להתחיל את הטיפול 24-48 שעות לפני העלייה ולהמשיך ל-48 שעות בזמן ההימצאות בגובה או כל זמן
שדרוש להקל על התסמיינים.

אין לעזוזו ניתן לחצוט או לכטוש את הטבליה במידת הצורך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בעל יلد מן התוropa, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים, והבא אריזת התוropa אליו.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדירוש, יש ליטול מנה מייד כשןצורת. עם זאת, אם הזמן לנטיילת המנה הבאה הוא שעתים או פחות, דילג על המנה שנשכחה והמשך ליטול את הטיפול בזמן הנטילה הרגילים. אין ליטול שתי מנות ביחד על מנת לפחות על המנה שנשכחה.

יש להתמיד טיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתוropa ללא התיעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוoya ומנה בכל פעע שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתוropa, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באורומוקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול אפילו אחת מהן.

- כל התרופות עשויות לגרום לתגובה אלרגית, למורות שתגובה אלרגית חמורה היא נדירה מאוד. אם אתה חש בצלצופים פתאומיים, קשיי נשימה, נפיחות בעפעפים, בפנים או בשפתים, פריחה או גירוד (במיוחד המשפע על כל הגוף), פנה לרופא מייד.
- אורומוקס עלול להשפיע על התאים בدم, ולכן אתה עלול להיות בסיכון גבוה יותר לזרימות ושהדם לא "יקרש" כראוי. אם אתה סובל מכאוב גרכן או חום או אם אתה מבחין בחברות או נקודות קטנות אדומות או סגולות על העור, פנה לרופא מייד. אם אתה חש בחולשת שרירים או אם יש לך פרכוים, פנה לרופא מייד.
- אורומוקס עלול להשפיע על הכאב והחליות. אם אתה חש בכAbb בגב התחתון, כאב או צריבה בעת מתן שתן, קושי במתן שתן, או אם אתה מפסיק לחתת שתן, יש לך דם בשתן, צואה בהירה, או אם העור שלך או העיניים צהבהבים, פנה לרופא. כמו כן, יש לפנות לרופא אם הוצאה שחורה או דמיית זפת, או אם אתה מבחין בدم בצואה.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעו):
כאב ראש; שלשול; בחילה או הקאה, אי-יבוד תניון, צמא, טעם מתכת בפה; סחרורת, אי-יבוד שליטה מלאה על הידיים או הרגליים; הסמקה; עליה בתדרירות מתן השתן; עייפות או עצבנות; תחושה של התרגשות יתר; הרגשת קהות או עקצוץ באצבעות הידיים או הרגליים, או תחושת קור בגפיהם; דיכאון; ישונניות או בלבול; אי-יבוד חזק מימי; צלצלים באוזניים או קשיי שמיעה; קוצר ראייה זמני אשר נעלם לאחר הורדת המינון או הפסקת הטיפול; רירדה בראייה או כאב בעיניים בשל הצטברות נזול בשכבת כל' הדם של העין (תפליט כוראידלי או היפרדות הכרואיד).

דוחו מקרים נדירים של פריחות בעור כולל רגימות מוגברת לאור השימוש. אם יש לך פריחות לא רגימות כלשהן בעור, עדכן את הרופא.

כאשר נוטלים או רטמים לתקופת ארכואה, התכשיר יכול להשפיע על רמת האשלגן או הנתרן בدم. הרופא עשוי לבצע בדיקות דם כדי לוודא שזה לא קורה.
בטיפול ארוך טווח, עשוי להתרחש גם דילול עצם או סיכון לבנים בклיות. לעיתים עלולות להופיע רמות סוכר גבוהות או נמוכות בדם.

יש לפנות מיד לרופא אם אתה מפתח תגובה עורית חמומה: פריה אדומה, קשחתה עם בליטות מתחת לעור ושלפוחיות (exanthematous pustulosis).

אם הופעה תופעת לואי, אם אחת מתופעות הלואאי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לואי שלא צינה בעlion, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לואי לשירות הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי קר תמנוע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התגובה (exp) המופיע על גבי האריזה. תאריך התגובה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

- יש לאחסן מתחת ל- 25°C .
- ח' מדף לאחר פתיחת הבקבוק: 8 חודשים
- אין להשליך תרופות לביב או לאשפפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאין בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמר על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, corn starch, talc, gelatin, glycerin, sodium starch glycolate, magnesium stearate.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליות לבנות עגולות, בצד אחד מופיע הכיתוב "53Z" ובצד השני ישנו קו חציה.
בקבוק המכיל 30 טבליות עם מכסה עמיד בפני ילדים.

היצן ובעל הרישום כתובבו: תרו תעשייה רוקחית בע"מ, רח' הקיטור 14, מפרץ חיפה 2624761

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00 21225 94 016

נערך בינואר 2024.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.