



## نشرة للمستهلكة بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

### فلوريت, أقراص

كل قرص يحتوي على: إيثينيل إستراديول (Ethinylestradiol) 0.03 ملغ وجيستودين (Gestodene) 0.075 ملغ.

المواد غير الفعالة ومسببات الحساسية (مستأجرة) في الدواء - انظري للبند 6 "معلومات إضافية" وللبند 2 "معلومات مهمة حول جزء من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعملي الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجهي إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. هذا الدواء وصف لك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدا لك أن وضعهم الطبي مشابه.

#### 1. لأي غرض مخصص الدواء؟

فلوريت مخصص لمنع الحمل.

كل واحد من الأقراص يحتوي على هرمونين أنثويين، إستروجين (إيثينيل إستراديول) وپروجيستوجين (جيسودين).

الفصيلة العلاجية: أقراص مدمجة لمنع الحمل، دمج إستروجين وپروجيستوجين.

بعض الأمور المهمة التي يجب معرفتها عن أقراص منع الحمل المدمجة:

- عند تناولها بالشكل الصحيح، أقراص منع الحمل المدمجة تعتبر واحدة من الطرق القابلة للعكس الأكثر موثوقية في منع الحمل.
- إنها تزيد قليلاً من الاخطار (احتمال الخطر) للخنثار (جلطات دموية) في الأوردة والشرايين، خاصةً في السنة الأولى أو عند تناول من جديد بعد التوقف ل- 4 أسابيع أو أكثر.
- عليك أن تكوني متيقظة والتوجه إلى الطبيب إذا كانت لديك مخاوف بأنك تعانين من أعراض جلطة دموية (انظري للبند 2 "فلوريت والخنثار (جلطات دموية)").
- فلوريت، كباقي أقراص منع الحمل، لا تمنع الإصابة بعدوى ال- HIV (إيدز) أو أمراض أخرى التي تنتقل بالعلاقات الجنسية. إذا كنت تعتقدين أنك قد تكوني باخطار (احتمال خطر)، يجب استعمال وافي ذكري (كوندوم) بالإضافة لقرص منع الحمل.

#### 2. قبل استعمال الدواء

قبل أن تبدئي بتناول فلوريت ينبغي عليك قراءة المعلومات عن الخنثار (جلطات دموية) في بند 2. من المهم بشكل خاص قراءة الجزء المتعلق بأعراض الخنثار (انظري للبند 2 "فلوريت والخنثار (جلطات دموية)").

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

كنت موجودة بأحد الأوضاع التالية. في حال كان لديك أحد الأوضاع المفصلة في الأسفل عليك إخبار الطبيب بذلك. سيتناقش الطبيب معك بخصوص وسائل أخرى لمنع الحمل الأكثر ملاءمة لك.

- كنت حساسة (أرجية) للمواد الفعالة (إيثينيل إستراديول أو جيسودين) أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظري للبند 6).
- لديك (أو كان لديك في أي وقت مضى) جلطة دموية في وعاء دموي في الساقين (خنثار في الأوردة العميقة، DVT)، في الرئة (انصمام رئوي، PE)، أو في أعضاء أخرى.
- معلوم لك أنك تعانين من اضطراب الذي يؤثر على تخثر الدم، على سبيل المثال نقص في بروتين C، نقص في بروتين S، نقص في مضاد الثرومبين III، عامل 5 لايدن أو أجسام مضادة للفوسفوليبيد.
- كنت على وشك الخضوع لعملية جراحية أو إذا كان من المتوقع أن تكوني في وضع من قلة الحركة لفترة طويلة (انظري "فلوريت والخنثار (جلطات دموية)").
- كانت لديك في أي وقت مضى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
- يوجد لديك (أو كانت لديك في أي وقت مضى) ذبحة صدرية (وضع يؤدي إلى ألم قوي في الصدر ومن الممكن أن يكون علامة أولية لنوبة قلبية) أو نوبة إقفارية عابرة (TIA) أعراض سكتة دماغية مؤقتة).

- يوجد لديك أحد الأمراض التالية التي قد تزيد الاخطار (احتمال الخطر) لتشكّل جلطة دموية في الشرايين:
  - سكري وخيم مع ضرر في الأوعية الدموية
  - ضغط دم مرتفع جداً
  - مستويات مرتفعة من الدهون في الدم (كوليسترول أو ثلاثي الجليسريد)
  - وضع من فرط الهوموسيستئين
- يوجد لديك أو كان لديك في أي وقت مضى التهاب البنكرياس (pancreatitis) مع مستويات مرتفعة من الدهن/ثلاثي الجليسريد في الدم.
- يوجد لديك (أو كان لديك في أي وقت مضى) نوع من الصداع النصفي الذي يُدعى "صداع نصفي مع أورة".
- يوجد لديك سرطان ثدي أو شك بوجود سرطان الثدي.
- يوجد لديك سرطان في بطانة الرحم، عنق الرحم أو المهبل.
- يوجد لديك ورم في الكبد (خبيث أو حميد).
- يوجد لديك مرض كبد ووظيفة الكبد لم تُعد للوضع السليم بعد.
- يوجد لديك نزيف غير مفسّر من المهبل (حتى تلقي تشخيص من الطبيب).
- أنت حامل أو هنالك احتمال بأنك حامل.
- أنت مرضعة.
- يوجد لديك التهاب الكبد C (التهاب كبد فيروسي)، وتتعالجين بأدوية تحتوي على أومبنتاسفير/باريتاوبريفير/ريتونافير، داسابوفير، جليكاوبريفير/بيبرينتاسفير أو سوفوسوفير/قلفطسفير/فوكسيفر (انظري "تفاعلات بين الأدوية").

#### تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

##### يجب التوجه لتلقي علاج طبي بشكل فوري:

إذا لاحظت وجود أعراض ممكنة لجلطة دموية التي من شأنها أن تدل على أنك تعاني من جلطة دموية في الساق (أي خثار في الأوردة العميقة)، من جلطة دموية في الرئة (انصمام رئوي)، من نوبة قلبية أو سكتة دماغية (انظري "فلوريت والخثار (جلطات دموية)").

لمعلومات حول أعراض الآثار الجانبية الوخيمة هذه توجهي للبند 2 "كيفية تمييز أعراض الجلطة الدموية".

- إذا كان لديك أحد الأوضاع التالية، يجب استشارة الطبيب قبل البدء بتناول فلوريت. أيضاً في حال تطوّرت أو تفاقم واحد أو أكثر من الأوضاع في فترة العلاج بفلوريت يجب استشارة الطبيب:
- إذا كان لديك مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي (أمراض التهابية مزمنة في الأمعاء).
- إذا كانت لديك ذئبة حُمَامِيَّة مَجْمُوعِيَّة (SLE – مرض يؤثر على جهاز المناعة).
- إذا كانت لديك متلازمة انحلال الدم- اليوريمي (HUS – اضطراب بجهاز تخثر الدم الذي من الممكن أن يؤدي إلى فشل كلوي).
- إذا كان لديك فقر دم منجلي (مرض وراثي في كريات الدم الحمراء).
- إذا كانت لديك مستويات مرتفعة من الدهون في الدم (فرط ثلاثي جليسريد الدم) أو إذا كان هنالك تاريخ عائلي لهذا الوضع. وجد أن فرط ثلاثي جليسريد الدم مرتبط بزيادة الاخطار (احتمال الخطر) لتطور التهاب البنكرياس (pancreatitis).
- كنت على وشك الخضوع لعملية جراحية أو إذا كان من المتوقع أن تكوني في وضع من قلة الحركة لفترة طويلة (انظري "فلوريت والخثار (جلطات دموية)").
- إذا كنت بعد ولادة، فأنت باخطار متزايد لتشكّل جلطات دموية. عليك أن تسأل الطبيب بعد كم من الوقت من الولادة تستطيعين استعمال فلوريت.
- إذا كان لديك التهاب في الأوردة تحت الجلد (خثار الأوردة السطحية).
- إذا كان لديك دوالي في الأوردة.
- إذا كانت لديك عُقَبَات (nodules) في الثدي، داء كيسي ليفي في الثدي، تصوير ثدي بالأشعة السينية (X-ray) غير سليم أو تصوير ثدي شعاعي (mammogram) غير سليم.
- إذا كنت تعاني من آلام رأس وخيمة أو الصرع.
- إذا كنت تعاني من اكتئاب.
- إذا كان لديك مرض في كيس المرارة، في القلب أو في الكلى.
- ضغط دم عالي.
- سكري.
- اضطراب في الأيض المعروف باسم البرفيرية.

- مشاكل في الكبد.
- ظهور بقع بنية على الوجه والجسم كذلك التي تظهر في فترة الحمل (كلف).
- ورم ليفي في الرحم (ورم حميد (ليس سرطاني) الذي يكبر من نسيج ليفي عضلي لجدار الرحم).
- مشكلة بوضع العدسات اللاصقة.
- صداع نصفي (شقيقة).
- اضطرابات في الرؤية.
- رَفَص سيدنهام (مرض يتميز بحركات جسم سريعة، حركات تشنجية وغير متناسقة التي تؤثر في الأساس على الوجه، القدمين واليدين).
- شبيه الفقاع الحملّي - Pemphigoid gestationis (مرض جلدي مصحوب ببثور يحدث أثناء الحمل).
- فقدان سمع المتعلق بتصلب الأذن.
- اضطرابات في مستويات الدهون في الدم (مستويات مرتفعة أو منخفضة من الدهون في الدم).
- نقص في الكالسيوم المصحوب بتشنجات في العضلات.
- التهاب في الأوردة (phlebitis).
- انتفاخ في الوجه، في العيون، في الفم أو صعوبات في التنفس.
- إذا كنت تواجهين أعراض الوذمة الوعائية مثل إنتفاخ الوجه، اللسان و/أو الحنجرة و/أو صعوبة في البلع أو طفح جلدي (شرى) التي قد تكون مصحوبة بصعوبة في التنفس، توجّهي لطبيبك على الفور. المستحضرات التي تحتوي على استروجينات قد تسبب أو تفاقم أعراض الوذمة الوعائية الوراثية والوذمة الوعائية المكتسبة.

#### اضطرابات نفسية

هنالك نساء اللواتي قمن بالتبليغ عن اكتئاب أو مزاج اكتئابي أثناء استعمال وسائل هرمونية لمنع الحمل بما في ذلك عند استعمال فلوريت، قد يكون الاكتئاب جدياً وقد يؤدي أحياناً لأفكار انتحارية. إذا كنت تعائشين تغيرات في المزاج وأعراض للاكتئاب، تواصل مع طبيبك لاستشارة طبية إضافية في أقرب وقت ممكن.

#### فلوريت والخُثار (جلطات دموية)

إن استعمال وسائل المنع الهرمونية المُدمجة مثل فلوريت يزيد من الاختطار (احتمال الخطر) لتطوير جلطات دموية مقارنةً بالاختطار لدى النساء اللواتي لا يستعملن هذه الوسائل. في حالات نادرة، جلطة دموية بإمكانها سد وعاء دموي والتسبب بمشاكل وخيمة. جلطات دموية قد تتطور:

- في الأوردة [خُثار وريدي، انصمام خُثاري في الأوردة (VTE)].
- في الشرايين [خُثار شرياني، انصمام خُثاري في الشرايين (ATE)].

الشفاء من جلطات دموية ليس دائماً كامل. في حالات نادرة، قد تبقى علامات وخيمة أو في حالات نادرة جداً من الممكن أن تكون مميتة.

من المهم التذكّر أن الاختطار (احتمال الخطر) العام لتطور جلطة دموية ضارة نتيجةً لاستعمال فلوريت هو صغير.

#### كيفية تمييز أعراض الجلطة الدموية؟

توجهي للطبيب بشكل مستعجل إذا لاحظت واحد أو أكثر من الأعراض التالية.

هل تشعرين بواحد أو أكثر من العلامات التالية؟	مَمَّ قد تعانين؟
<ul style="list-style-type: none"> <li>• انتفاخ في إحدى الساقين أو على طول وريد في الساق أو القدم خصوصاً عندما يكون مصحوباً ب:</li> <li>• ألم أو حساسية في الساق التي تظهر فقط عند الوقوف أو المشي</li> <li>• الشعور بالسخونة بنفس الساق</li> <li>• تغيرات في لون جلد الساق، مثل أن تصبح شاحبة، حمراء أو زرقاء.</li> </ul>	خُثار في الأوردة العميقة
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ضيق تنفس فجائي وغير مفسّر أو تنفس سريع</li> <li>• سعال فجائي بدون سبب والذي قد يكون مصحوباً بدم</li> <li>• ألم حاد في الصدر الذي قد يشتد عند التنفس العميق</li> <li>• شعور بالدوار أو الدوخة</li> <li>• نبض سريع أو غير منتظم</li> <li>• ألم شديد في البطن</li> </ul>	انصمام رئوي

	إذا لم تكوني متأكدة، توجهي للطبيب لأن جزء من هذه العلامات مثل السعال أو ضيق التنفس من الممكن أن يتم الاعتقاد بشكل خاطئ بأنها علامات لوضع بسيط مثل عدوى في الجهاز التنفسي (على سبيل المثال رشح).
خُثار في وريد شبكية العين (جلطة دموية في الوعاء الدموي الخاص بالعين)	علامات التي تظهر على الأغلب بعين واحدة: <ul style="list-style-type: none"> <li>● فقدان بصر فوري أو</li> <li>● تشوش رؤية غير مصحوب بألم الذي من شأنه أن يتطوّر لفقدان بصر.</li> </ul>
نوبة قلبية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● الشعور بألم في الصدر، عدم راحة، ضغط، ثقل</li> <li>● شعور بالضغط أو الامتلاء في الصدر، في الذراع أو تحت عظم الصدر</li> <li>● شعور بالامتلاء، صعوبة في الهضم أو الشعور بالاختناق</li> <li>● شعور بعدم الراحة في القسم العلوي من الجسم الذي يتشعب إلى الظهر، الفك، الحلق، الذراع والبطن</li> <li>● تعرق، غثيان، تقيؤ أو دوخة</li> <li>● ضعف شديد، قلق أو ضيق تنفس</li> <li>● نبض سريع أو غير منتظم.</li> </ul>
سكتة دماغية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ضعف فجائي أو عدم الشعور في الوجه، في الذراع أو في الساق، بالأخص في جانب واحد من الجسم</li> <li>● ارتباك فجائي، صعوبة في التكلم أو في الفهم</li> <li>● صعوبة فجائية في الرؤية بعين واحدة أو في كلتا العينين</li> <li>● صعوبة فجائية في المشي، دوخة، فقدان التوازن أو التناسق</li> <li>● صداع وخيم أو متواصل الذي يظهر فجأة بدون سبب معروف</li> <li>● فقدان الوعي أو الإغماء مع أو بدون نوبة.</li> </ul> <p>أحياناً قد تكون أعراض السكتة الدماغية قصيرة جداً مع شفاء كامل وشبه فوري، لكن ما زال عليك التوجه لتلقي علاج طبي بشكل مستعجل لأنك قد تكونين عرضة لسكتة دماغية أخرى.</p>
انسداد أو عية دموية أخرى بواسطة جلطة دموية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● انتفاخ وتغير لون الطرف بشكل طفيف للأزرق</li> <li>● ألم حاد وفجائي في البطن (بطن حاد).</li> </ul>

### خُثار وريدي

#### ماذا قد يحدث إذا تشكلت جلطة دموية في الوريد؟

- إن استعمال وسائل منع حمل هرمونية مدمجة مرتبط بارتفاع الاختطار (احتمال الخطر) لتطوّر جلطات دموية في الأوردة (خُثار وريدي). مع ذلك، هذا العرض الجانبي نادر. من الممكن أن يحدث بأعلى وتيرة خلال السنة الأولى لاستعمال وسيلة منع حمل هرمونية مُدمجة.
- إذا تطورت جلطة دموية في وريد في الساق أو في القدم، فإنها قد تؤدي لخُثار في الأوردة العميقة.
- إذا انتقلت جلطة دموية من الساق واستقرت في الرئة، فمن الممكن أن تؤدي لانصمام رئوي.
- في أحيان نادرة جداً من الممكن أن تتشكّل جلطة دموية في وريد في عضو آخر مثل العين (خُثار في وريد شبكية العين).

#### متى يكون الاختطار (احتمال الخطر) الأعلى لتطوّر جلطة دموية في الوريد؟

الاختطار (احتمال الخطر) الأعلى لتطوّر جلطة دموية في الوريد هو خلال السنة الأولى لتناول وسيلة منع حمل هرمونية مدمجة للمرة الأولى. قد يكون الاختطار أعلى أيضاً عندما تعاودين تناول وسيلة منع حمل هرمونية مُدمجة (مستحضر مطابق للذي أخذته في الماضي أو مستحضر آخر) بعد توقف دام 4 أسابيع أو أكثر. بعد السنة الأولى، يقل الاختطار ولكنه دائماً يبقى أعلى بقليل بالمقارنة مع عدم تناولك لوسيلة منع حمل هرمونية مُدمجة. عندما تتوقفين عن تناول فلوريت الاختطار لديك لتطوّر جلطة دموية يعود إلى الوضع الطبيعي خلال أسابيع معدودة.

#### ما هو الاختطار (احتمال الخطر) لتطوّر جلطة دموية؟

الاختطار متعلق بالميل الطبيعي لديك لتطوّر خُثار وريدي وبنوع وسيلة منع الحمل الهرمونية المُدمجة التي تتناولينها. الاختطار العام لتطوّر جلطة دموية في الساق أو في الرئتين (خُثار في الأوردة العميقة أو انصمام رئوي) عند استعمال فلوريت هو منخفض.

- من بين كل 10,000 امرأة لا تقوم بتناول وسيلة منع حمل هرمونية مُدمجة وليست حاملاً, نحو 2 نساء سيتطور لديهن جلطة دموية في السنة.
- من بين كل 10,000 امرأة تتناول وسيلة منع حمل هرمونية مُدمجة المحتوية على ليفونورجيستريل, نورثيسترون أو نورجيستيما, نحو 5-7 ستتطور لديهن جلطة دموية في السنة.
- من بين كل 10,000 امرأة تتناول وسيلة منع حمل هرمونية مُدمجة المحتوية على إيثينيل إستراديول وجيستودين مثل **فلوريت**, نحو 9-12 امرأة ستتطور لديهن جلطة دموية في السنة.
- الاختطار لتطویر جلطة دموية بتغير وفقاً لتاريخك الطبي (انظري "عوامل تزيد من الاختطار لديك لتشكّل جلطة دموية في الوريد" في الأسفل).

#### عوامل تزيد من الاختطار لديك لتشكّل جلطة دموية في الوريد:

الاختطار لتشكّل جلطة دموية عند تناول فلوريت هو منخفض, لكن هنالك حالات التي من شأنها زيادة هذا الاختطار. يكون الاختطار لديك أعلى:

- إذا كانت لديك زيادة في الوزن (BMI فوق 30 كغم/متر<sup>2</sup>)
- إذا كانت لأحد أقاربك من الدرجة الأولى جلطة دموية في الساق, في الرئة أو في عضو آخر في سن مبكرة نسبياً (مثلاً تحت جيل 50 سنة). في هذه الحالة يمكن أن يكون لديك اضطراب وراثي في جهاز تخثر الدم
- إذا كان عليك الخضوع لعملية جراحية أو إذا كنت في حالة من قلة الحركة لفترة طويلة بسبب إصابة أو مرض, أو إذا كانت ساقك موجودةً بجبس, من الممكن أن تكون حاجة لإيقاف استعمال **فلوريت** قبل عدة أسابيع من العملية الجراحية أو أثناء الفترة التي تكون فيها حركتك مقيدة. إذا كان عليك إيقاف استعمال **فلوريت**, اسأل طبيبك بشأن متى يمكنك البدء بتناول **فلوريت** من جديد
- مع التقدم بالعمر (خاصةً بعد جيل 35 سنة)
- إذا أنجبت قبل عدة أسابيع

الاختطار لتشكّل جلطة دموية يرتفع كلما كانت لديك أوضاع أكثر التي تزيد من الاختطار.

يمكن أن يزيد الطيران (أكثر من 4 ساعات) بشكل مؤقت الاختطار لديك لحصول جلطة دموية, خاصةً إذا كانت لديك أوضاع أخرى التي تزيد الاختطار.

من المهم إخبار الطبيب إذا كان أحد الأوضاع المذكورة أعلاه ينطبق عليك, حتى لو لم تكوني متأكدة. من المحتمل أن يقرر الطبيب بأن تتوقفي عن تناول **فلوريت**.

إذا تغير واحد أو أكثر من هذه الأوضاع أثناء استعمال **فلوريت**, على سبيل المثال إذا عايش أحد أفراد أسرتك من الدرجة الأولى خثاراً لسبب غير معروف أو إذا حصلت لديك زيادة ملحوظة في الوزن, أخبر طبيبك بذلك.

#### خثار شرياني

##### ماذا قد يحدث إذا تشكّلت جلطة دموية في الشريان؟

كما في الجلطة الدموية في الوريد, جلطة دموية في الشريان قد تسبب مشاكل وخيمة. على سبيل المثال هي قد تؤدي لنوبة قلبية أو لسكتة دماغية.

#### عوامل تزيد من الاختطار لديك لتشكّل جلطة دموية في الشريان:

- من الجدير بالذكر أن الاختطار لنوبة قلبية أو لسكتة دماغية نتيجةً لتناول **فلوريت** هو منخفض جداً ولكنه قد يرتفع:
- مع التقدم بالعمر (فوق جيل 35 سنة)
- إذا كنت مدخنة. يوصى بالتوقف عن التدخين خلال تناول وسائل منع حمل هرمونية مُدمجة مثل **فلوريت**. إذا لم تتجحي بالتوقف عن التدخين وكنت فوق جيل 35 سنة, من شأن طبيبك أن يوصيك باستعمال وسيلة منع من نوع آخر.
- إذا كان لديك وزن زائد
- إذا كان لديك ضغط دم مرتفع غير مسيطر عليه بواسطة علاج دوائي
- إذا كان لأحد أقربائك من الدرجة الأولى نوبة قلبية أو سكتة دماغية في سن مبكرة (تحت جيل 50 سنة). في هذه الحالة, يمكن أن يكون لديك اختطار أعلى للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية
- إذا كانت لديك أو لدى أحد أقربائك من الدرجة الأولى مستويات مرتفعة من الدهون في الدم (كوليسترول أو ثلاثي الجليسريد)
- إذا كنت تعانين من الصداع النصفي, على وجه الخصوص صداع نصفي مع أورة
- إذا كانت لديك مشكلة في القلب (اضطرابات في صمامات القلب, اضطراب في نظم القلب المسمى رجفان أذيني)
- إذا كان لديك سكري.

إذا كان لديك أكثر من واحد من هذه الأوضاع أو إذا كان أحدها وخيمًا بشكل خاص، فإن الاختطار لتشكّل جلطة دموية قد يكون أعلى.

إذا تغير أحد هذه الأوضاع خلال استعمال فلوريت، على سبيل المثال إذا بدأت بالتدخين، أحد أقرانك من الدرجة الأولى عايش خنارًا لسبب غير معروف أو إذا حصلت عندك زيادة ملحوظة في الوزن، أخبري طبيبك بذلك.

### أقراص منع الحمل والسرطان

الاختطار لسرطان الثدي موجود لدى كل امرأة سواءً كانت تتناول أقراص منع الحمل أم لا تتناولها. يظهر سرطان الثدي بشكل نادر لدى النساء ما دون جيل 40 سنة، لكن الاختطار يرتفع كلما أصبحت المرأة أكبر سنًا.

سرطان الثدي منتشر أكثر بقليل لدى النساء اللواتي يتناولن أقراص منع الحمل مقارنةً بالنساء اللواتي لا يتناولن أقراص منع الحمل. إذا توقفت المرأة عن تناول قرص منع الحمل، هذا يؤدي إلى أن 10 سنوات بعد التوقف عن تناول قرص منع الحمل يكون الاختطار لتشخيص سرطان الثدي في هذه المرأة مشابهًا للاختطار الخاص بامرأة لم تتناول قرص منع الحمل أبدًا.

يبدو أنه من الأقل ترجيحًا بأن ينتشر سرطان الثدي في الجسم لدى النساء اللواتي تم اكتشاف سرطان الثدي لديهن وتتناولن أقراص منع الحمل مقارنةً بالنساء اللواتي لم يتناولن أقراص منع الحمل.

ليس واضحًا فيما إذا كان قرص منع الحمل يسبب اختطارًا متزايدًا لسرطان الثدي. من الجائز أن النساء اللواتي يتناولن أقراص منع الحمل يتم فحصهن في أحيان أكثر تكرارًا ولهذا فإن اكتشاف سرطان الثدي يكون أكبر. الاختطار لاكتشاف سرطان الثدي ليس متأثرًا بالمدة الزمنية التي تناولت بها المرأة أقراص منع الحمل بل بالعمر الذي توقفت به عن تناول قرص منع الحمل. وذلك لأن الاختطار لسرطان الثدي يزداد كلما كانت المرأة أكبر بالسن.

التبليغات عن أورام خبيثة في الكبد لدى النساء اللواتي يتناولن أقراص منع الحمل لفترة طويلة هي نادرة. تمت مشاهدة أورام حميدة في الكبد لدى النساء اللواتي تتناولن قرص منع الحمل. التوقف عن تناول قرص منع الحمل من الممكن أن يكون إلزاميًا إذا كان هنالك اضطراب فجائي أو مستمر في وظيفة الكبد. يمنع تناول قرص منع الحمل إلى أن ترجع وظيفة الكبد لوضعها السليم.

بعض الأبحاث تشير إلى أن تناول أقراص منع الحمل ممكن أن يزيد من الاختطار لسرطان عنق الرحم، لكن هذا من الممكن أن يحدث بسبب الفرق في أنماط السلوك الجنسي وليس بسبب قرص منع الحمل. على كل النساء أن يجرين فحص أطاخة عنق الرحم بشكل منتظم. إن العدوى المزمنة بواسطة فيروس الورم الخليمي البشري (HPV) هو عامل الاختطار الأكثر أهمية لسرطان عنق الرحم.

يجب فحص المخاطر المحتملة مقابل حسنات تناول قرص منع الحمل.

### تضرر الرؤية

تم التبليغ عن حالات خنار في العصب البصري (إغلاق الشريان البصري المركزي الذي يؤدي لفقدان رؤية فجائي بشكل عام كامل تقريبًا) عند تناول قرص منع الحمل. يجب التوقف عن تناول قرص منع الحمل إذا كان هنالك فقدان رؤية غير مفسر، جزئي أو كامل، انتفاخ سريع في مقلة العين، رؤية مزدوجة أو أي تغيير فجائي في الرؤية.

### مرض في كيس المرارة

في عدد من الأبحاث تم التبليغ عن ارتفاع بالاختطار النسبي لمرض في كيس المرارة لدى النساء اللواتي يتناولن أقراص منع الحمل وإستروجينات.

### نزيف غير منتظم

كما في بقية أقراص منع الحمل، قد تعاشين في الأشهر الأولى نزيفًا غير منتظم من المهبل (بقع أو نزيف بين الدورات الحيضية) بين الطمث والآخر. من الممكن أن تضطري لاستعمال وسائل نظافة ملائمة، ولكن استمري بتناول أقراص منع الحمل كالمعتاد. يتوقف النزيف غير المنتظم من المهبل بشكل عام عندما يعتاد جسمك على أقراص منع الحمل (بشكل عام بعد 3 دورات من تناول أقراص منع الحمل). من فضلك توجهي إلى الطبيب إذا استمر، ازداد أو بدأ مجددًا.

إذا نسيت تناول قرص منع الحمل وبعد ذلك لم تتلقي نزيفًا في الفترة الخالية من أقراص منع الحمل، يجب فحص إمكانية وجود حمل.

إذا نسيت تناول قرص منع حمل واحد (أو أكثر)، وأقمت علاقات جنسية غير محمية، من الممكن أن تكوني حاملًا. استشيري الطبيب أو الصيدلي بالنسبة لوسائل منع الحمل في حالات الطوارئ.

بعد استعمال أقراص منع الحمل هنالك نساء اللواتي من الممكن أن يعايشن انقطاع الحيض (انقطاع الدورة الشهرية) أو نَدْرَة الطَّمُوث (حيض نادر أو خفيف جدًا), خاصة إذا كان هذا الوضع موجودًا مُسبقًا.

### التدخين

أخبري الطبيب إذا بدأت تدخين خلال تناول **فلوريت**.  
الاحتظار لَحْثَار الشرايين ولنوبة قلبية أو سكتة دماغية أثناء تناول **فلوريت** يزداد إذا كنت مدخنة. من المفضل التوقف عن التدخين عندما تتناولين وسيلة منع هرمونية مُدمجة مثل **فلوريت**. إذا لم تتجحي بالإقلاع عن التدخين وكنت فوق عمر 35 سنة, من الممكن أن يوصيك طبيبك باستعمال وسيلة منع من نوع آخر.

### الفحوصات, المتابعة والفحوصات المخبرية

سيفحصك الطبيب قبل أن يصف لك **فلوريت**; يجب إعادة الفحص بشكل منتظم. وتيرة وطبيعة الفحوصات يجب أن تكون مرتكزة على تعليمات وخبرة عملية ويجب ملاءمتها للمرأة بشكل فردي. خلال الفحص يجب قياس ضغط الدم, ويجب أن يشمل فحص الرحم والأعضاء المجاورة, الثديين, الحوض والبطن. يجب أن ينتبه الطبيب كذلك للتاريخ العائلي.

يجب إجراء فحص أُلطَاخَة عنق الرحم (PAP) إذا كانت المتعالجة نشطة من الناحية الجنسية أو إذا كان هنالك استبطاب آخر.

قبل إجراء فحوصات دم يجب إبلاغ الطبيب بأنك تتناولين قرص منع الحمل لأن المستحضر من الممكن أن يؤثر على نتائج الفحوصات.

### تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذين, أو أخذت في الآونة الأخيرة, أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومكملات غذائية, أخبري الطبيب أو الصيدلي بذلك.

أدوية معينة من شأنها أن تتداخل مع فعالية قرص منع الحمل. جزء من الأدوية قد يؤدي لمنع فعالية قرص منع الحمل وقد يؤدي لنزيف شاذ (نزيف بين الدورات الشهرية) ودورة شهرية غير منتظمة, هذه تشمل:

- أدوية لعلاج الصرع (مثل فينيتوين, بريميدون, كاربامازيبين, أو كسكاربازيبين, توپيرامات)
- قسم من الأدوية لعلاج السل (ريفامبتين)
- فينيلبتازون, ديكساميثازون (أدوية مضادة للالتهابات)
- مودافينيل (لعلاج اضطرابات النوم المتزايدة خلال النهار)
- قسم من الأدوية لعلاج ال-HIV/إيدز (مثبطات البروتياز)
- أدوية معينة للتهدئة والنوم (التي تدعى "باربيتورات")
- جريسفولافين (دواء لعلاج حالات العدوى الفطرية)
- أدوية تؤدي لتقليل وقت مرور الطعام في الجهاز الهضمي
- مضادات حيوية معينة (على سبيل المثال ريفامبيسين)
- خليط عشبي المعروف غالبًا ب-St. John's wort (هيريكوم بيرفوراتوم).

إذا كنت تتناولين أحد الأدوية التي ذكرت اعلاه فيجب استعمال وسيلة منع إضافية, مثلًا الواقي الذكري (كوندوم), في وقت تناولها بالإضافة لذلك خلال ال-7 أيام القادمة. من الممكن أن يرشدك الطبيب لاستعمال وسائل المنع الإضافية هذه لفترة زمنية أطول. بالإضافة لذلك, اتبعي التعليمات بـ "إذا نسيت تناول **فلوريت**" بنند 3 بهذه النشرة.

**St. John's wort** (هيريكوم بيرفوراتوم): نزيف بين الدورات الحوضية وحالات حمل غير مخطط لها تم التبليغ عنها لدى نساء اللواتي يتناولن أقراص منع الحمل و- **St. John's wort**. إذا كان هنالك استعمال بنفس الوقت لقرص منع الحمل و- **St. John's wort**, مفضل استعمال وسيلة منع غير هرمونية بنفس الوقت, كالواقي الذكري (كوندوم).

أدوية معينة ممكن أن تقلل من فعالية إنزيمات الكبد. هذا الأمر من الممكن أن يسبب زيادة مركبات قرص منع الحمل في الدم. أمثلة لأدوية كهذه تشمل أتورفاستاتين, إندينافير, فلوكونازول وترولياندوميسين.  
أدوية تؤثر على امتصاص قرص منع الحمل في الأمعاء (مثلًا حمض الأسكوربيك (فيتامين C) وپاراسيتامول) من الممكن أن تكون ذات تأثير مشابه.

قد يؤثر قرص منع الحمل على الطريقة التي تعمل بها أدوية أخرى, أو يزيد الاحتظار لأعراض جانبية محتملة. هذه تشمل أدوية معينة التي تتفكك عن طريق الكبد (مثلًا سيكلوسبورين, ثيوفيلين, كورتيكوستيروئيدات) والأدوية فلوناريزين ولموتريجين.

لا يجوز استعمال **فلوريت** إذا كنت تعانين من التهاب الكبد C (التهاب كبد فيروسي) وكنت تتناولين أدوية تحتوي على أمبيتاسفير / پاريتاڤر / ريتوناڤر / داساڤوڤر, چليكاڤرڤيڤر / ڤيڤرڤيتاسڤير أو سوفوسڤوڤر / فلڤسڤير / فوكسيلڤرڤر هذه

المستحضرات من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع في نتائج وظائف الكبد (ارتفاع في إنزيمات الكبد من نوع ALT) في فحوصات الدم.  
سيصف لك الطبيب وسائل منع حمل أخرى قبل بدء العلاج بهذه الأدوية.  
بعد أسبوعين من إنهاء العلاج بهذه الأدوية فإنه بالإمكان البدء مجددًا باستعمال فلوريت. انظري للبند "لا يجوز استعمال الدواء إذا".

لمنع اختناقات أو عدم النجاعة التي تتبع من تفاعلات بين الأدوية, يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول دواء إضافي في فترة استعمال فلوريت.

### الحمل, الرضاعة والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة, تعتقدين أنه من الممكن أن تكوني حاملاً أو تخططين للحمل, استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء. إذا دخلت لحمل, توقفي عن تناول الحبوب حالاً واستشيري الطبيب. استعمال وسيلة منع أخرى, كالواقي الذكري (كوندوم), إلى أن يتم تأكيد الحمل. كميات قليلة من وسائل المنع الستيروئيدية و/أو مُستقلبات لوحظوا في حليب الأم لأمهات مرضعات, وعدد من الأعراض الجانبية تشمل بقران وتضخم الثديين تم الإبلاغ عنها لدى الطفل. بشكل عام استعمال قرص منع الحمل غير محبذ إلى أن تقطم الأم بشكل نهائي الطفل عن الرضاعة.

### السياقة واستعمال الآلات

لا يوجد ل-فلوريت تأثير معروف على القدرة على السياقة أو استعمال الآلات.

### معلومات مهمة حول جزء من مركبات الدواء

يحتوي فلوريت على لاكتوز وسوكروز. إذا قيل لك من قبل طبيب أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة, استشيري الطبيب قبل تناول هذا الدواء.  
هذا الدواء يحتوي على أقل من 1 ميلي مول صوديوم (23 ملغ) في القرص, من الممكن القول أنه فعلياً "خالي من الصوديوم".

## 3. كيف تستعملين الدواء؟

يجب دائماً استعمال الدواء وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكوني متأكدة بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

### بالنسبة للعبوة

صممت العبوة لتساعدك لتتذكر أن تأخذي القرص في موعده.  
كل شريط يحتوي على 21 قرصاً. كل قرص مشار إليه على الشريط باسم اليوم في الأسبوع وبسهم يشير إلى اتجاه التقدم.  
يجب تناول القرص الأول في اليوم الأول من الحيض بحسب اليوم بالأسبوع المشار إليه على الشريط. هذا هو اليوم الذي عليك أن تبدئي فيه كل مرة شريط جديد.  
استمري بتناول الأقراص باتجاه الأسهم إلى أن تنتهي جميع الأقراص.  
الجرعة الاعتيادية بشكل عام هي: قرص واحد كل يوم في ساعة ثابتة, منذ اليوم الأول من الحيض ولمدة 21 يوماً متتالية وبعد ذلك توقف ل- 7 أيام عن تناول أقراص منع الحمل. في هذه الاستراحة بشكل عام يظهر الحيض.

يجب بلع القرص بأكمله مع القليل من الماء إذا اقتضت الحاجة لذلك. يمنع سحق/شطر/مضغ قرص منع الحمل لأن هذه الأفعال من الممكن أن تعيق امتصاص المواد الفعالة في القرص وبذلك تضر بنجاعته.  
الجرعة وطريقة العلاج تحددان من قبل الطبيب فقط.  
لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.  
مدة العلاج تحدد من قبل الطبيب.

### البدء في الرزمة الأولى

#### كيف تبدئين بالرزمة الأولى عندما لم تستعملي في الشهر الأخير وسائل منع هرمونية؟

يجب تناول القرص الأول في اليوم الأول من الحيض, هذا هو اليوم الأول للدورة الشهرية – اليوم الذي يبدأ به النزيف. سوف تكونين محمية حالاً. إذا بدأت بتناول القرص الأول بأي يوم آخر, عليك أن تستعملي وسيلة منع أخرى بالإضافة, مثل الواقي الذكري (كوندوم), خلال 7 الأيام الأولى من تناول الأقراص. هذا صحيح فقط بالنسبة للشريط الأول. بالإمكان تناول القرص بأية ساعة, لكن يجب بلع القرص بنفس الساعة كل يوم, بشكل عام من المريح أخذ القرص قبل النوم أو أول شيء في الصباح.  
بعد أن أنهيت تناول جميع ال- 21 قرصاً في الشريط, قومي باستراحة مدتها 7 أيام بدون أقراص. كما يبدو سيكون لديك نزيفاً في قسم من هذه الأيام.

لا توجد هنالك حاجة لاستعمال وسائل منع إضافية بفترة الاستراحة ذات ال-7 أيام بشرط أنك تناولت جميع ال-21 قرصًا بشكل متتالي، وبشرط أن تبدئي الشريط التالي في موعده.

### الشريط التالي

بعد استراحة ذات 7 أيام بدون أقراص، ابدئي بالشريط التالي. افعلي ذلك سواءً توقف النزيف أم لا. على هذا النحو فإن تناول كل شريط يبدأ دائمًا في نفس اليوم من الأسبوع.

### بدء الاستعمال بعد الولادة أو الحمل

سينصحك الطبيب بالنسبة لتناول أقراص منع الحمل بعد الولادة، الإجهاض المُحَرَّض أو الإجهاض الطبيعي. بالإمكان البدء بتناول **فلوريت** حالًا بعد الإجهاض الطبيعي أو الإجهاض المُحَرَّض الذي حدث بـ 3 الأشهر الأولى من الحمل.

إذا كانت الولادة على ما يرام بدون مضاعفات متأخرة، كنت تتحركين بشكل كامل، لست مرضعة ولم يكن لديك توقيف حمل في الشهر الرابع، الخامس أو السادس من الحمل، تستطيعين أن تبدئي بتناول **فلوريت** 28 يومًا بعد الولادة أو الإجهاض. يجب استعمال وسائل منع إضافية (مثل الواقي الذكري (كوندوم)) بـ 7 الأيام الأولى من تناول قرص منع الحمل. إذا قمت بعلاقات جنسية غير محمية بعد اليوم ال-21، لا تبدئي بتناول **فلوريت** إلى أن يبدأ الحيض. إذا كنت مرضعة، قرص منع الحمل المُدمج ليس موصى به بالنسبة لك لأنه من الممكن أن يقلل تدفق الحليب. إذا كانت لديك أسئلة بالنسبة للبدء بـ **فلوريت** بعد الولادة أو الحمل، اسألني الطبيب أو الصيدلي.

### الانتقال من أقراص منع حمل أخرى لفلوريت

إذا انتقلت لتناول أقراص منع الحمل **فلوريت** بعد أن استعملت قرص منع حمل آخر، اتبعي تعليمات الطبيب.

في حال التغيير من قرص منع حمل مُدمج آخر ذو 21 يومًا من نوع إستروجين-بروجستيرون لـ **فلوريت**، يجب تناول **فلوريت** في اليوم التالي لإنهاء تناول سلسلة قرص منع الحمل السابق.

في حال التغيير من أقراص منع حمل مُدمجة أخرى من نوع إستروجين-بروجستيرون ذات 28 يوم، ابدئي بتناول **فلوريت** في اليوم الذي بعد تناول القرص **الفعال** الأخير من قرص منع الحمل الآخر.

في كل واحدة من الحالتين غير متوقع حدوث نزيف حتى إنهاء السلسلة الأولى من **فلوريت**. لا توجد هنالك حاجة لوسائل منع إضافية في هذه الحالات.

### الانتقال من قرص منع حمل يحتوي على بروجيستيرون فقط أو وسائل منع محقونة أو مزروعة لفلوريت

إذا انتقلت من قرص منع حمل يحتوي على بروجيستيرون فقط، تستطيعين التوقف عن تناول قرص منع الحمل الذي يحتوي على بروجيستيرون فقط في يوم معين والبدء بتناول **فلوريت** في اليوم التالي في نفس الساعة. يجب استعمال وسيلة منع أخرى، مثل الواقي الذكري (كوندوم)، لمدة 7 الأيام الأولى من تناول الشريط الأول.

إذا انتقلت من حقنة لمنع الحمل أو زرع يمكنك البدء باستعمال **فلوريت** في يوم إخراج الزرع أو في اليوم الذي كان من المفروض أن تعطى به الحقنة التالية.

يجب استعمال وسيلة منع إضافية (مثل واقي ذكري (كوندوم)) لمدة 7 الأيام الأولى من تناول الشريط الأول.

### إذا لم يظهر نزيف بعد إنهاء الشريط

إذا تناولت جميع أقراص منع الحمل بالشكل الصحيح فإنه من غير المرجح أن تكوني حاملًا. لكن، عليك أن تتأكد أن لك نسبتك حاملًا قبل أن تبدئي الشريط التالي.

### إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى من فلوريت

قد يؤدي تناول أقراص **فلوريت** بشكل مفرط لغثيان، تقيؤات، حساسية في الثديين، دوخة، ألم في البطن، نعاس/تعب. من الممكن أن يظهر نزيف لدى قسم من النساء. في حالة جرعة زائدة، تواصل مع الطبيب أو الصيدلي.

إذا بلع طفل عن طريق الخطأ من الدواء، توجهي فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضري عبوة الدواء معك.

### إذا نسيت تناول فلوريت

إذا مرت أقل من 12 ساعة من الموعد الذي كان عليك أن تتناولي به القرص، تناولي القرص فورًا عندما تتذكرين، واستمري بتناول الأقراص التالية كالمعتاد.

إذا مرّت أكثر من **12 ساعة** من الموعد الذي كان عليك أن تتناول به القرص، يجب تناول القرص الأخير الذي نسبت فوراً عند تذكرك واستمري بتناول بقية الأقراص بشكل اعتيادي، حتى لو أن ذلك يعني تناول 2 أقراص بنفس اليوم. استمري في تناول **فلوريت** حتى إنهاء الشريط كالمعتاد واستعملي وسائل منع حمل إضافية (مثل الواقي الذكري (كوندوم)) خلال 7 الأيام التالية.

إذا استمرت ال- 7 أيام التي كان من المطلوب بها استعمال وسيلة منع إضافية إلى ما بعد اليوم الذي ستتناولين به القرص الأخير في الشريط الحالي، يجب بدء الشريط التالي في اليوم الذي يلي تناول القرص الأخير من الشريط الحالي بدون توقف.

في هذه الحالة سيحدث نزيف من المهبل (حيض) فقط عند انتهاء الشريط الثاني. إذا لم تتلقي الحيض عند انتهاء الشريط الثاني يجب التوجه للطبيب فوراً، قبل البدء باستعمال شريط جديد.

#### إذا كنت تعانين من التقيؤ أو الإسهال

من الممكن ألا يعمل قرص منع الحمل. إذا ظهر الإسهال أو التقيؤ خلال **4 ساعات** من تناول القرص، اتبعي التعليمات في "إذا نسبت تناول فلوريت – إذا مرت أقل من 12 ساعة من الموعد الذي كان عليك به تناول القرص". القرص الإضافي يجب تناوله من شريط احتياطي.

إذا ظهر التقيؤ أو الإسهال بعد أكثر من **4 ساعات** من تناول القرص، استمري بتناوله كالمعتاد، لكنك من الممكن أن لا تكوني محمية من اليوم الأول لظهور الإسهال أو التقيؤ. استعملي وسيلة منع إضافية، مثل الواقي الذكري (الكوندوم)، خلال فترة الإسهال والتقيؤ حتى البدء باستعمال الشريط التالي.

#### إذا كنت تريدين التوقف عن تناول الدواء

تستطيعين التوقف عن استعمال فلوريت بكل لحظة. إذا لست معنية في الدخول لحمل، استشيرى الطبيب بالنسبة لوسائل منع ناجعة أخرى.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحققى من المصق والجرعة في كل مرة تتناولين فيها دواء. ضعي النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشيرى الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال مع أي دواء، قد يسبب استعمال فلوريت أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزعي من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن ألا تعانين من أي واحد منها.

إذا كنت تعانين من عرض جانبي، بالأخص إذا كان وخيمًا أو مستمرًا أو إذا كنت تشعرين بتغيير معين في صحتك وكنت تعتقدن أنه من الممكن أنه ينبع من استعمال فلوريت، توجهي إلى الطبيب.

الارتفاع باختطار (احتمال خطر) تشكّل جلطات دموية في الأوردة (خُثار الأوردة) أو في الشرايين (خُثار الشرايين) موجود لدى جميع النساء اللواتي يستعملن وسائل منع هرمونية مُدمجة. لمعلومات مفصلة أكثر انظري للبنء 2 "قبل استعمال الدواء".

#### توجهي حالاً للطبيب إذا كنت تشعرين بأحد الأعراض التالية:

• انتفاخ في الوجه، الشفتين أو الحنجرة الذي يسبب صعوبة في البلع أو في التنفس وكذلك حكة وطفح جلدي. الأمر ممكن أن يكون إشارة لحساسية وخيمة لفلوريت.

- طفح جلدي وخيم وفجائي
- ألم رأس شديد أو صداع نصفي
- صعوبة في الرؤية أو في التكلم
- ألم أو انتفاخ في الساقين
- إغماء
- ألم في الصدر أو في البطن
- ضيق في التنفس
- خَدَر في اليد أو في الساق
- سعال دموي
- كثر في الثديين.

#### أعراض جانبية وخيمة

توجهي للطبيب على الفور إذا كنت تواجهين واحدًا من الأعراض التالية للوذمة الوعائية: إنتفاخ الوجه، اللسان و/أو الحنجرة و/أو صعوبة في البلع أو طفح جلدي (شرى) التي قد تكون مصحوبة بصعوبة في التنفس (أنظري أيضًا "تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء").

سيوقف الطبيب استعمال فلوريت كما يبدو إذا:

- ظهر يرقان
- ارتفع ضغط الدم
- كنت تعاني من وضع الذي من الممكن أن يتفاقم عند استعمال قرص منع الحمل ويظهر علامات تدهور (انظري بند 2 قبل استعمال الدواء).

إذا كان لديك نزيف أثناء تناول الأقراص

في بداية استعمال الأقراص من الممكن أن يحدث نزيف بين الدورات الحوضية أو نزيف مع بقع, لكن من المفروض أن ينتظم الحيض بعد عدة شهور. لكن إذا كان النزيف شديدًا, مستمرًا أو متكررًا استشيرى الطبيب.

قد يؤدي فلوريت لأعراض جانبية خفيفة. أبلغى الطبيب إذا كانت الأعراض التالية تقلقك:  
أعراض جانبية شائعة جدًا (أعراض تظهر لدى أكثر من مستخدمة واحدة من بين عشرة):

- ألم رأس, يشمل صداع نصفي
- نزيف بين الدورات الحوضية/بقع.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدمات من بين 100):

- ألم في البطن/انقباضات في البطن
- غثيان وتقيؤ
- تغييرات في وزن الجسم
- تغييرات في الرغبة الجنسية
- مزاج اكتئابي, عصبية
- دوخة
- حساسية في الثديين أو إفراز من الثديين
- حب الشباب
- نزيف غير منتظم أو نزيف مؤلم أو انقطاع النزيف
- احتباس السوائل أو انتفاخ
- تغييرات في الإفرازات المهبلية, عدوى مهبلية مثل فطريات في المهبل.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدمات من بين 1,000):

- تغييرات في الشهية
- طفح, ظهور بقع بنية على الوجه والجسم كالتى تحدث في الحمل (كُلف), حكة
- شعر خفيف أو شعر غير عادي
- ارتفاع في ضغط الدم
- تغييرات في مستويات الدهون في الدم
- تشنجات في البطن, انتفاخ.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدمات من بين 10,000):

- ردود فعل أرجية وخيمة تشمل وذمة وعائية وشرى (انتفاخ في الجلد المصحوب بحكة وشرية)
- عدم تحمل الجلوكوز
- مشاكل في استعمال العدسات اللاصقة
- حمى عقدية (Erythema nodosum)
- انخفاض في مستويات حمض الفوليك في الدم
- ركود الصفراء الذي يسبب اليرقان (تدفق غير سليم لسائل المرارة في الكبد الذي يؤدي لاصفرار الجلد)
- جلطة دموية ضارة في الوريد أو في الشريان على سبيل المثال:
  - في الساق أو في القدم (خُثار الأوردة العميقة)
  - في الرئة (انصمام رئوي)
  - نوبة قلبية, سكتة دماغية, سكتة دماغية صغيرة أو أعراض عابرة تشبه السكتة الدماغية, ظاهرة معروفة بإسم نوبة إقفاريه عابرة
  - جلطات دموية في الكبد, في المعدة/الأمعاء, في الكلى.

الاحتمال لجلطة دموية ممكن أن يكون أعلى إذا كان لديك أحد الأوضاع الأخرى التي تزيد من الاختطار (انظر للبند 2 لمعلومات إضافية عن عوامل تزيد من الإختطار لجلطات دموية ولأعراض الجلطات الدموية).

- أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستخدمة واحدة من بين 10,000):
- جلطات دموية ضارة في الوريد أو الشريان على سبيل المثال في العين.
  - الاحتمال لجلطة دموية ممكن أن يكون أعلى إذا كان لديك أحد الأوضاع الأخرى التي تزيد من الاختطار (انظر للبند 2 لمعلومات إضافية عن عوامل تزيد من الإختطار لجلطات دموية ولأعراض الجلطات الدموية).
  - مرض في كيس المرارة (يشمل حصى في كيس المرارة)
  - التهاب في البنكرياس (pancreatitis), اضطراب في الدم الذي يدعى متلازمة انحلال الدم اليوريمية (وضع به الجلطات الدموية تسبب فشل كلوي)
  - تأزم داء الذئبة الحمامية (مرض التهابي الذي يمكنه أن يؤثر على أجزاء كثيرة في الجسم بما في ذلك الجلد, المفاصل وأعضاء داخلية), البرفيرية والرَّص (اضطراب حركي)
  - التهاب في عصب الروية (من الممكن أن يؤدي إلى عمى جزئي أو كامل)
  - تفاقم في حالة الدوالي الوريدية
  - التهاب القولون الإقفاري (التهاب في أعقاب تدفق دم غير كافي للقولون)
  - ورم حميد في الكبد
  - سرطان في الكبد
  - حمى وطفح جلدي في الوجه والأطراف.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الموجه للاستشارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنبني التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ومجال رؤيتهم وبذلك تمنعي التسمم. لا تسببي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (תאריך תפוגה) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين في العبوة الأصلية، تحت 25 درجة مئوية.
- لا يجوز التخلص من الأدوية في المجاري أو سلة النفايات المنزلية. اسألي الصيدلي حول كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. سوف تساعد هذه الوسائل في حماية البيئة.

## 6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركبات الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Lactose monohydrate, sucrose, maize starch, calcium carbonate, talc, macrogol 6000, povidone, titanium dioxide (E171), silica colloidal anhydrous, magnesium stearate, sodium calcium edetate, quinoline yellow (E104)

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

- أقراص صفراء، مستديرة محدبة من الجهتين.
- الأقراص تأتي بأشرطة (بليسترات) من 21 قرص. كل عبوة تحتوي على 1، 3 أو 4 أشرطة (بليسترات).
- من الممكن ألا تسوق جميع أحجام العبوات.
- تم التنقيح في أيلول 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 140-57-31528-00

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ص., شارع دكسل 1, أور عكيفا 3060000, إسرائيل