

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

### קונסרטה™, טבליות בשחרור מושהה

כל טבליה של קונסרטה 18 מ"ג מכילה מתילפנידט הידרוכלוריד Methylphenidate Hydrochloride 18mg  
כל טבליה של קונסרטה 27 מ"ג מכילה מתילפנידט הידרוכלוריד Methylphenidate Hydrochloride 27mg  
כל טבליה של קונסרטה 36 מ"ג מכילה מתילפנידט הידרוכלוריד Methylphenidate Hydrochloride 36mg  
כל טבליה של קונסרטה 54 מ"ג מכילה מתילפנידט הידרוכלוריד Methylphenidate Hydrochloride 54mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 6 "מידע נוסף"  
**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.  
אם יש לך שאלות נוספות, פני אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

### 1. למה מיועדת התרופה?

קונסרטה מיועדת לטיפול בהפרעת קשב וריכוז עם היפראקטיביות (ADHD) בילדים מעל גיל 6, מתבגרים ומבוגרים עד גיל 65.

קונסרטה יכולה לשפר את הקשב, את הריכוז, ולהקטין אימפולסיביות והיפראקטיביות באנשים עם ADHD.

קונסרטה אמורה להינתן כחלק מתכנית טיפולית ל-ADHD שיכולה לכלול ייעוץ או טיפולים אחרים.

**קבוצה תרפויטית:** מעורר מערכת העצבים המרכזית.

### 2. לפני השימוש בתרופה

#### אין להשתמש בתרופה אם אתה או ילדך:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (Methylphenidate Hydrochloride) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 – "מידע נוסף").
- סובל מטיקים או סינדרום טורט (Tourette's Syndrome) או שקיימת היסטוריה משפחתית של סינדרום טורט. טיקים הינם תנועות או קולות חזרתיים בלתי נשלטים.
- נוטל כעת או נטלת/ת במהלך 14 יום לפני התחלת הטיפול בקונסרטה תכשיר לטיפול בדכאון ממשפחת מעכבי האנזים מונואמין אוקסידז (MAO (monoamine oxidase inhibitor).
- אין להשתמש בקונסרטה בילדים מתחת לגיל 6 היות והתרופה לא נחקרה בקבוצת גיל זו.

## אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני התחלת הטיפול בקונסרטה ספר לרופא אם אתה או ילדך סובל או סבלת או שקיימת

היסטוריה משפחתית של אחד מהמצבים הבאים:

- התמכרות/תלות או שימוש לרעה באלכוהול, תרופות מרשם או סמי רחוב.
- בעיות בלב, מחלת לב, מום בלב או לחץ דם גבוה.
- קיימת היסטוריה משפחתית של מוות פתאומי.
- בעיות נפשיות כגון: פסיכوزה, מאניה, הפרעה דו קוטבית (בי פולרית) או דיכאון, או שקיימת היסטוריה משפחתית של אובדנות, הפרעה דו-קוטבית או דיכאון.
- תנועות או קולות חזרתיים בלתי נשלטים (טיקים) או סינדרום טורט, או שיש היסטוריה משפחתית של טיקים או סינדרום טורט.
- פרכוסים או תוצאות של סקירה מוחית (EEG) לא תקינה.
- בעיות סירקולציה (זרימת דם) באצבעות הידיים והרגליים.
- בעיות במערכת העיכול- חסימה או היצרות במעיים
- בעיות בעיניים, כולל לחץ מוגבר על העין, גלאוקומה, או בעיות בראיה מקרוב (רוחק ראייה)
- בהריון או מתכננת הריון. לא ידוע אם קונסרטה עלול לפגוע בעובר.
- מניקה או מתכננת להניק. לא ידוע אם קונסרטה עובר לחלב אם. יש להתייעץ עם הרופא לגבי התזונה המיטבית עבור התינוק בעת טיפול בקונסרטה.

**הבעיות הבאות דווחו בשימוש במתילפנידט הידרוכלוריד ותרופות מעוררות אחרות :**

### שימוש לרעה, שימוש מכוון שלא בהתאם לעלון והתמכרות

לתכשיר קונסרטה יש סיכון גבוה לשימוש לרעה שעלול להוביל לבעיות בנטילת התרופה, כולל התמכרות. שימוש לרעה בקונסרטה, תרופות אחרות שמכילות מתילפנידט ותרופות המכילות אמפטמין, עלול להוביל למנת יתר ומוות. הסיכון למנת יתר ומוות עולה כשנוטלים מנות גבוהות יותר של קונסרטה או כשנוטלים באופן שאינו מאושר, כגון הסנפה או הזרקה.

- רופאך צריך לבדוק את הסיכון עבורך ועבור ילדך לשימוש לרעה, שימוש שלא בהתאם לעלון והתמכרות לפני התחלת הטיפול בקונסרטה, וינטר את הטיפול שלך או של ילדך.
- קונסרטה עלול לגרום לתלות גופנית לאחר שימוש ממושך, גם אם נלקח על פי הנחיית רופאך.
- אין לתת קונסרטה לאף אחד אחר. ראה סעיף 1 "למה מיועדת התרופה" למידע נוסף.
- יש לשמור קונסרטה במקום בטוח ולהשליך כל תרופה שנותרה. ראה סעיף 5 "איך לאחסן את התרופה?".
- יש לספר לרופאך אם אתה או ילדך סבלת משימוש לרעה או תלות באלכוהול, תרופות מרשם או סמי רחוב.

### בעיות הקשורות בלב

- מוות פתאומי בחולים הסובלים מבעיות לב או מום לבבי.

- שבץ והתקפי לב במבוגרים.

- עלייה בלחץ דם ודופק.

בדרך כלל, אין להשתמש בקונסרטה בילדים, מתבגרים או מבוגרים הסובלים ממום בלב או בעיות חמורות אחרות בלב.

**פנה באופן מיידי לרופא או לחדר מיון של בית החולים הקרוב, אם אתה או ילדך מפתחים תסמינים של בעיות לב כגון כאב בחזה, קוצר נשימה או עילפון במהלך השימוש בקונסרטה.**

### **עליה בלחץ דם ודופק**

תרופות מעוררות עלולות לגרום לעליה בלחץ הדם ודופק.

רופאך יעקוב אחרי מדדי לחץ דם ודופק במידה והנך נוטל תרופות לטיפול ביתר לחץ דם ודופק מואץ.

### **בעיות נפשיות (פסיכיאטריות)**

- תרופות מעוררות עלולות לגרום או להחמיר בעיות התנהגות או מחשבות במטופלים עם

בעיה נפשית קיימת.

- הופעה או החמרה של הפרעה ביפולארית (דו-קוטבית).

- תופעות פסיכוטיות חדשות (כגון שמיעת קולות או ראייה של דברים שלא קיימים) או הופעה

של תסמינים מאניים חדשים.

ספר לרופאך על בעיות נפשיות שהנך או ילדך סובל מהם, או היסטוריה משפחתית של התאבדות, מחלה ביפולארית או דיכאון.

**יש לפנות לרופא באופן מיידי אם אתה או ילדך חווים הופעה חדשה או החמרה של תסמינים נפשיים או בעיות במהלך השימוש בקונסרטה, בייחוד שמיעה של קולות וראייה של דברים לא אמיתיים, אמונה בדברים לא אמיתיים, או הופעת תסמינים חדשים של מאניה .**

### **ילדים ומתבגרים**

אין להשתמש בקונסרטה בילדים מתחת לגיל 6 היות והתרופה לא נחקרה בקבוצת גיל זו.

### **בדיקות ומעקב**

הרופא יבדוק אותך או את ילדך לבעיות לב לפני תחילת הטיפול בקונסרטה.

הרופא יבצע ניטור בדיקות דם, לחץ הדם וקצב הלב, לך או לילדך, באופן קבוע במהלך הטיפול עם קונסרטה.

יש לנטר לעיתים קרובות את הגובה והמשקל של ילדים הנוטלים קונסרטה.

ייתכן והטיפול בקונסרטה יופסק במידה ותמצא בעיה במהלך ניטורים אלו.

### **אינטראקציות/ תגובות בין תרופתיות**

**אם אתה או ילדך לוקח, או אם לקח/ת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם**

**ויטמינים ותוספי מזון, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

קונסרטה בשילוב עם תרופות מסוימות עלולות לגרום לתופעות לוואי חמורות. לעיתים קיים צורך

להתאים את המינונים של התרופות בתקופת הנטילה של קונסרטה. הרופא שלך יקבל החלטה האם

ניתן ליטול קונסרטה עם תרופות אחרות.

### **במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה או ילדך לוקח את אחד הבאים:**

- תרופות ממשפחת מעכבי האנזים מונואמיין אוקסידז (MAOI). אין ליטול קונסרטה אם אתה או ילדך נוטל כעת או נטלת במהלך 14 יום לפני התחלת הטיפול בקונסרטה תכשירים לטיפול בדכאון ממשפחת מעכבי האנזים מונואמיין אוקסידז (MAOI) (ראה גם פרק 2- סעיף "אין להשתמש בתרופה").
- תרופות לטיפול בלחץ דם.
- תרופות שמשפיעות על כיווץ כלי דם (כגון תרופות לטיפול בצינון או אלרגיה המכילות נוגדי גודש).
- תרופות נוגדות קרישה מקבוצת הקומרינים (כגון וורפרין).
- תרופות לטיפול בפרקוסים (כגון פנוברביטל, פניטואין, פרימדון).
- תרופות לטיפול בדיכאון (כגון נוגדי דיכאון טריציקליים ומעכבי ספיגת סרוטונין).
- תרופה לטיפול במחלת נפש – ריספרידון.

יש להכיר את התרופות שאתה או ילדך נוטל. יש לשמור רשימת תרופות שלך או של ילדך על מנת להציג לרופא ולרוקח את רשימת התרופות שאתה או ילדך נוטל, כשמקבלים תרופה חדשה. **אין להתחיל בנטילת תרופות חדשות במהלך הטיפול בקונסרטה מבלי לשוחח קודם עם הרופא שלך.**

### **אם הנך עומד לעבור ניתוח**

יש להודיע לרופאך אם הנך עומד לעבור ניתוח. זאת משום שאסור ליטול מתילפנידט ביום הניתוח עם סוג מסוים של תרופת הרדמה. קיים סיכון לעליית לחץ דם בזמן ניתוח.

### **שימוש בתרופה ומזון**

יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מים או נוזל אחר. הטבליה יכולה להילקח עם או ללא מזון.

### **הריון, הנקה ופוריות**

אם את בהריון, מניקה או מתכוננת להרות, יש לדווח לרופא אשר יחליט האם הנך יכולה ליטול קונסרטה.

### **נהיגה ושימוש במכונות**

חומרים ממריצים עלולים לפגום ביכולתך או ביכולת ילדך להפעיל מכונות מסוכנות או לנהוג ברכב. יש לפעול בזהירות, ולבצע פעולות אלו רק כאשר אתה או ילדך בטוח שהתרופה אינה משפיע על היכולת לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות.

### **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

קונסרטה מכילה לקטוז. היוועץ ברופא לפני תחילת השימוש בתרופה אם הנך סובל מאי סבילות לסוכרים מסוימים.

נתרן- תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול (23 מ"ג) נתרן פר טבליה, כלומר היא למעשה נחשבת ל"נטולת נתרן".

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.  
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.  
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.  
**אין לעבור על המנה המומלצת**  
קונסרטה הינה טבליה בשיחרור ממושך. היא משחררת את התרופה לגוף לאורך היום. על כן אין ללעוס, לכתוש או לחצות את הטבליה.  
יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מים או נוזל אחר.  
ספר לרופא אם אתה או ילדך לא יכול לבלוע את הטבליה בשלמותה, יתכן ויהיה צורך לרשום לך/לילדך תרופה אחרת.  
הטבליה יכולה להילקח עם או ללא מזון.  
יש ליטול את הטבליה פעם ביום, בבוקר.  
טבלית קונסרטה לא מתמוססת בשלמותה בגוף. לאחר שכל התרופה השתחררה, ייתכן כי תבחין לעיתים בטבליה ריקה בצואה, דבר זה תקין.  
יתכן והרופא יפסיק את הטיפול בקונצרטת מדי פעם, לזמן מה על מנת לבדוק את תסמיני הפרעת הקשב והריכוז עם היפראקטיביות (ADHD).

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** עלולות להופיע תופעות לוואי כתוצאה ממינון יתר:  
השפעות על הלב ולחץ הדם: שינויים והפרעות בקצב הלב, יתר לחץ דם או תת לחץ דם.  
השפעות על מערכת העצבים המרכזית: אגיטציה ועליה בתנועות בלתי נשלטות, תחושת בילבול, הזיות (ראיה, תחושה ושמיעה של דברים לא מציאותיים). סינדרום סרטונין, פירכוסים, שבץ וקומה.  
חום גבוה מסכן חיים ותמס שריר (רבדומיליזיס).  
**אם נטלת מנת יתר** או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיידי לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.  
**אם שכחת ליטול את התרופה** בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.  
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.  
**אם אתה מפסיק את נטילת התרופה**, התייעץ עם הרופא טרם הפסקת השימוש בתרופה.  
**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה.** הרכב משקפיים  
**אם הינך זקוק להם.**  
**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה**, היוועץ ברופא או ברוקח.

#### 4. תופעות לוואי

- כמו בכל תרופה, השימוש בקונסרטה טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
- התכשיר קונסרטה עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות. יש לפנות מיד לרופא במקרים הבאים:**
- **שימוש לרעה, שימוש מכוון שלא בהתאם לעלון והתמכרות.** (ראה סעיף 2 לפני השימוש בתרופה).
  - **סימנים של אלרגיה** כגון פריחה, גרד או חרלת על העור, נפיחות של הפנים, שפתיים, לשון או חלקים אחרים בגוף, קוצר נשימה, ציפופים או קושי בנשימה.
  - **תסמינים של בעיות לב** כגון כאב בחזה, קוצר נשימה או עילפון. תופעות הלוואי הבאות דווחו בשימוש במתילפנידט או סטימולנטים אחרים: מוות פתאומי בחולים הסובלים מבעיות לב או מום לבבי, שבץ והתקפי לב במבוגרים עלייה בלחץ דם ודופק. ,
  - **עליה בלחץ דם ודופק.** תרופות מעוררות עלולות לגרום לעליה בלחץ הדם ודופק. רופאך יעקוב אחרי מדדי לחץ דם ודופק במידה והנך נוטל תרופות לטיפול ביתר לחץ דם ודופק מואץ.
  - **בעיות נפשיות (פסיכיאטריות)** - הופעה חדשה או החמרה של תסמינים נפשיים או בעיות נפשיות במהלך השימוש בקונסרטה. בייחוד ראייה ושמיעה של דברים לא אמיתיים, אמונה בדברים לא אמיתיים או חשודים. בעיות התנהגותיות או מחשבתיות, דיכאון, הפרעה דו קוטבית. (ראה סעיף 2 לפני השימוש בתרופה)
  - **פרכוסים.** במידה ואתה או ילדך מפתח פרכוסים, רופאך ינחה להפסיק את הטיפול.
  - **זקפה כואבת וממושכת (פריאפיזם).** קרו מקרים של פריאפיזם שדרש ניתוח בקרב מטופלים במתילפנידט. **אם אתה או ילדך מפתח פריאפיזם, יש לפנות לעזרה רפואית באופן מיידי.**
  - **בעיות בזרימת דם באצבעות הידיים והרגליים** (Peripheral vasculopathy) כולל תופעת ריינו (Raynaud's phenomenon). התסמינים עלולים לכלול:
    - חוסר תחושה, תחושת קרירות או כאב באצבעות הידיים או הרגליים.
    - שינוי בצבע עור מחיוור לכחול ולאדום באצבעות הידיים או הרגליים.תפנה לרופא אם הנך או ילדך סובל מאובדן תחושה, כאב, שינוי בצבע עור, או רגישות לטמפרטורה באצבעות הידיים או הרגליים.
  - **יש לפנות לרופא באופן מיידי אם לך או לילדך מתפתחים סימנים של פצעים לא מוסברים באצבעות הידיים או הרגליים בעת הטיפול בקונסרטה.**
  - **האטה בגדילה (גובה ומשקל) בילדים.** יש לבצע בדיקות תכופות של גובה ומשקל בילדים בזמן הטיפול בקונסרטה. ייתכן ויהיה צורך בהפסקת טיפול אם ילדך לא גדל או עולה במשקל כצפוי.
  - **תיתכן חסימה במעיים.** מאחר שטבליות קונסרטה לא משנות את צורתן במעיים (מערכת העיכול), אין ליטול קונסרטה באנשים עם בעיות חמורות במעיים (היצרות חמורה של מעיים).
  - **בעיות בעיניים (עליה בלחץ תוך עיני וגלאוקומה).** יש לפנות לרופא מיידי, אם הנך או ילדך מפתח שינויים בראיה או כאבים, נפיחות או אודם בעיניים.
  - **שינויים בראייה או טשטוש ראייה.**

- הופעה או החמרה של טיקים או החמרה של סינדרום טורט. יש להודיע לרופא מיידית, אם הנך או ילדך סובל מהופעה או החמרה של טיקים או החמרה של סינדרום טורט בזמן הטיפול בקונסרטה.

#### **תופעות לוואי נוספות :**

#### **תופעות לוואי שכיחות מאוד :**

בקרב ילדים: כאב בטן עליונה

בקרב מבוגרים:

- ירידה בתאבון
- כאב ראש
- יובש בפה
- בחילה
- נדודי שינה
- חרדה
- סחרחורת
- ירידה במשקל
- עצבנות
- הזעה מוגברת

#### **תופעות לוואי שכיחות שנצפו במחקרים קליניים :**

בילדים ובמתבגרים: כאבים בבטן העליונה, הקאה, חום, נזופרינגיטיס (דלקת ריריות האף והלוע עם נזלת מוגלתית), סחרחורת, נדודי שינה, שיעול, כאב בפה ובלוע.  
 במבוגרים: דופק מהיר, דפיקות לב, ורטיגו (תחושת סחרור), טשטוש ראייה, יובש בפה, בחילה, קשיי עיכול, הקאה, עצירות, נרגנות, זיהום בדרכי נשימה עליונות, ירידה במשקל, ירידה בתיאבון, אנורקסיה (הפרעת אכילה), מתח בשרירים, כאב ראש, סחרחורת, רעד, עקצוץ (פרסתזיה), טשטוש (סדציה), כאב ראש של מתח, נדודי שינה, חרדה, נדודי שינה ראשוניים, מצב רוח דיכאוני ודיכאון, עצבנות, חוסר שקט, תוקפנות, דיכאון, חריקת שיניים, ירידה בחשק מיני, אי יציבות רגשית, תחושת בילבול, מתח, כאבים בפה ובלוע, הזעת יתר.

#### **תופעות לוואי נוספות שדווחו במחקרים קליניים:**

ספירת כדוריות לבנות נמוכה (לויקופניה), יובש בעיניים, ליקויי אקומודציה (מיקוד ראייה), גלי חום, אי נוחות או כאב בבטן, שלשול, חולשה, עייפות, הרגשת מתח/עצבנות, תחושת צמא, דלקת בסינוסים, עלייה ברמת האינזים אלנין אמינוטרנספראז, עליה בקצב לב, ובלחץ דם, רשרוש בלב, התכווצות שרירים, לאות (lethargy), ישנוניות, פעילות פסיכו-מוטורית מוגברת, כעס, דריכות יתר, שינויים במצב רוח, תנודות תכופות במצב הרוח, התקף פאניקה, הפרעת שינה, נטייה לבכי, טיקים, אין אונות, קוצר נשימה, פריחה בעור, פריחה מקולרית, יתר לחץ דם.

## **תופעות לוואי נוספות שדווחו בשימוש בתכשיר:**

פנציטופניה (מספר נמוך מדי של כל תאי הדם-אדומים, לבנים וטסיות), ירידה בטסיות (תרומבוציטופניה), תרומבוציטופניה פורפורה (דימום המאפיין ספירת טסיות נמוכה מאד). תעוקת חזה, דופק איטי, הפרעות בקצב לב. ראייה כפולה, עליה בלחץ תוך-עיני, אישונים מורחבים, בעיות ראייה. כאבים בחזה, אי נוחות בחזה, ירידה בהשפעת התרופה או בתגובה לתרופה, חום גבוה. פגיעה בתאי כבד, אי ספיקת כבד חריפה. תגובת רגישות יתר (אלרגיה) כגון אנגיואדמה, תגובה אנפילקטית, התנפחות של האוזן, שלפוחיות על פני העור, קילופי עור, חרלת (מחלת עור), גרד, גירוי בעור ו/או זיהום בעור, פריחה. עליה ברמת האנזים alkaline phosphates בדם, עליה ברמת בילירובין בדם, עליה ברמת אנזימי הכבד בדם, ספירת כדוריות לבנות וטסיות לא תקינה. כאבי מפרקים, כאבי שרירים, עוויתות שרירים, תמס שריר (רבדומיליזיס). פירכוס, דיסקינזיה (תנועות חוזרות בלתי רצוניות), סינדרום סרטונרגי (בשילוב עם נטילת תרופות מסוימות), טיקים מוטוריים ומילוליים. הרגשת חוסר התמצאות (דיסאורנטציה), הזיות שוא (חזותיות או קוליות), מאניה, דיבור מופרז, שינויים בדחף המיני, זקפה מתמשכת וכואבת (פריאפיזם), נשירת שיער במקומות שונים בגוף (אלופציה), אדמומיות בעור (אריתמה), כיווץ כלי הדם בקצות אצבעות הידיים והרגליים, בדרך כלל בעקבות חשיפה לקור (תסמונת ריינו).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

## **5. איך לאחסן את התרופה?**

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. יש לאחסן קונסרטה במקום בטוח, כגון משרד נעול. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. יש לאחסן מתחת ל- 25°C. יש לסגור הבקבוק היטב. השלך טבליות קונסרטה שנותרו, שאינן בשימוש או שפג תוקפן על פי כללי זהירות הבאים: יש לערבב את הטבליות עם חומר לא רצוי, לא רעיל כמו לכלוך, זבל חתולים או שאריות קפה משומשות כדי להפוך אותן לפחות מושכות לילדים וחיות מחמד. יש להניח את התערובת בכלי כגון שקית ניילון



סגורה ולהשליך לפח הביתי.

## 6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

polyethelene oxide 200K, povidone K29-32, succinic acid, stearic acid, butylated hydroxytoluene (BHT), polyethylene oxide 7000K, sodium chloride, ferric oxide black, ferric oxide yellow, ferric oxide red (27mg and 54 mg tablets only), cellulose acetate 398-10, polpxamer 188, hypromellose 2910, 3 cps, phosphoric acid.

ציפוי צבע:

lactose monohydrate, HPMC, titanium dioxide, triacetin, ferric oxide yellow (18mg and 54 tablets only), stearic acid (18mg tablet only), black iron oxide (27mg tablet only), ferric oxide red (54mg tablet only).

ציפוי שקופי:

HPMC, polyethylene glycol (macrogol 400), carnauba wax.

דיו להדפסה:

black iron oxide, isopropyl alcohol, propylene glycol, HPMC, purified water.

כל טבליה של 18mg מכילה : לקטוז מונוהידרט 6.84 מ"ג Lactose Monohydrate

כל טבליה של 27mg מכילה: לקטוז מונוהידרט 5.20 מ"ג Lactose Monohydrate

כל טבליה של 36mg מכילה: לקטוז מונוהידרט 17.60 מ"ג Lactose Monohydrate

כל טבליה של 54mg מכילה: לקטוז מונוהידרט 8.00 מ"ג Lactose Monohydrate

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

18 מ"ג: טבליה בצורת קפסולה בצבע צהוב עליה הטבעה בדיו שחור של הסימון "alza 18"

27 מ"ג: טבליה בצורת קפסולה בצבע אפור עליה הטבעה בדיו שחור של הסימון "alza 27"

36 מ"ג: טבליה בצורת קפסולה בצבע לבן עליה הטבעה בדיו שחור של הסימון "alza 36"

54 מ"ג: טבליה בצורת קפסולה בצבע חום-אדום עליה הטבעה בדיו שחור של הסימון "alza54"

כל אריזה מכילה 30 טבליות.

**בעל הרישום :** ג"י סי הלת'קר בע"מ, קיבוץ שפיים, 6099000.

**היצרן:** יאנסן-סילג מניופקטורנג, LLC, גוראבו, פוארטו ריקו, 00778, ארצות הברית.

נערך בינואר 2024 לפי הנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות :

קונסרטה 18 מ"ג – 126-85-30589

קונסרטה 27 מ"ג – 134-47-31123

קונסרטה 36 מ"ג – 126-86-30590

קונסרטה 54 מ"ג – 126-87-30591

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

מבוסס על עלון אמריקאי מאוקטובר 2023.