

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

**إنجيريكس بي 20 مكغ
معلق للحقن**

يحتوي كل مقدار دوائي (1 مل) على: 20 مكغ من مولد الضد لالتهاب الكبد B (Purified hepatitis B antigen)

**إنجيريكس بي 10 مكغ
معلق للحقن**

يحتوي كل مقدار دوائي (0.5 مل) على: 10 مكغ من مولد الضد لالتهاب الكبد B (Purified hepatitis B antigen)

لائحة المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر، انظر البند 2 - "معلومات مهمة عن قسم من مرکبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".
إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه لآخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

إنجيريكس بي هو لقاح نشط يستعمل ضد تلوث الكبد (يرقان) الناجم عن فيروس التهاب الكبد من نوع B.
إنجيريكس بي 20 مكغ
اللقاح مخصص للكبار والمرأهقين من عمر 16 سنة وما فوق.
إنجيريكس بي 10 مكغ
اللقاح مخصص للرضيع حديثي الولادة، للأطفال وللمراهقين حتى عمر 15 سنة (يشمل عمر 15 سنة).

التهاب الكبد B هو مرض تلوثي للكبد يسببه فيروس. هنالك أشخاص موجود في أجسادهم الفيروس الذي يسبب لمرض التهاب الكبد B ولا يمكنهم التخلص منه. لا يزال بإمكانهم نقل العدوى لأشخاص آخرين وهم معروفون كحاملي العدوى. ينتشر المرض عن طريق الفيروس الذي يدخل الجسم بعد ملامسة سوائل الجسم، غالباً دم من شخص مصاب.

إذا كانت الأم حاملة للفيروس فيمكنها نقل الفيروس لرضيعها أثناء الولادة. من الممكن أيضاً الإصابة بالفيروس عن طريق حامل للعدوى، مثلاً، عن طريق ممارسة الجنس غير المحمي، مشاركة إبر للحقن أو علاج بمعدات طبية التي لم تخضع للتبييض بشكل مناسب.

إن الأعراض الأساسية للمرض تشمل صداع، سخونة، الشعور بمرض ويرقان (إصفار الجلد والعينين)، ولكن لا تظهر علامات للمرض على حوالي ثلاثة من كل 10 مرضى.

الفصيلة العلاجية: لقاح لالتهاب الكبد B.

كيف يعمل اللقاح؟

يحتوي إنجيريكس بي على كمية صغيرة من "الغلاف الخارجي" لفيروس التهاب الكبد B. هذا "الغلاف الخارجي" ليس معدياً ولا يمكن أن يجعلك مريضاً.

• عندما يتم إعطاؤك اللقاح، فإنه ينشط جهاز المناعة في الجسم، لتجهيزه لحماية نفسه من هذه الفيروسات في المستقبل.

• لن يحميك إنجيريكس بي في حال تم إصابتك فعلاً بالفيروس الذي يسبب لالتهاب الكبد B.

• بإمكان إنجيريكس بي فقط مساعدتك في حماية نفسك من تلوث الفيروس الذي يسبب لالتهاب الكبد B.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الergicي) لـ إنجيريكس بي أو لأحد مركبات اللقاح الأخرى (المفصلة في فقرة 6).
- يوجد لديك سخونة مرتفعة.

لا يجوز إستعمال إنجيريكس بي إذا إنطبقت عليك إحدى هذه الحالات المذكورة أعلاه. إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تلقي إنجيريكس بي. الرجاء إحكام طبيبك أو الصيدلي إذا عانيت في الماضي من حساسية أو إذا عانيت ذات مرة من مشاكل صحية أياً كانت بعد تلقي لقاح.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل أن تتلقى إنجيريكس بي إحكام طبيبك أو الصيدلي إذا كنت:

مُتعالج بغسيل الكلى بسبب مشكلة في الكلى أو تعاني من مرض قد يؤثر على جهاز المناعة لديك. أشخاص متعالجون بغسيل الكلى، أشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد طويلة الأمد، حاملو التهاب الكبد C أو HIV لا يزالوا بإستطاعتهم تلقي إنجيريكس بي من قبل طبيهم. السبب لذلك هو أن التلوثات الخاصة بالتهاب الكبد B يمكنها أن تكون خطيرة على هؤلاء المتعالجين. معلومات إضافية عن مشاكل في الكلى وغسيل الكلى تجدوها في فقرة 3.

إذا لم تكن واثقاً من أن إحدى الحالات المذكورة أعلاه يتعلق بك، تحدث مع طبيبك قبل تلقي إنجيريكس بي.

قد يحصل إغماء (خاصة لدى المراهقين) بعد، وحتى قبل، كل عملية حقن بواسطة إبرة. لذلك بلغ الطبيب أو الممرضة إذا أنت أو طفلك أغمي عليكم عند إعطاء حقنة سابقة.

بالمشابه للقاحات أخرى، من الجائز أن لا يكون إنجيريكس بي ناجعاً تماماً في حمايتك من التهاب الكبد B. هناك عدة عوامل، مثل تقدم في العمر، الجنس، الوزن الزائد، التدخين وبعض المشاكل طويلة الأمد، تقلل من إستجابتك المناعية للقاح. إذا كان ينطبق عليك أحد هذه العوامل، من الجائز أن يقرر طبيبك أن يجري لك فحص دم أو أن يعطيك مقدار دوائي إضافي من إنجيريكس بي للتأكد من أنك محمي.

التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخرأً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام طبيبك أو الصيدلي عن ذلك.

يمكن إعطاء إنجيريكس بي في نفس الوقت الذي يتم فيه إعطاء معظم اللقاحات الروتينية الأخرى. سيتأكد طبيبك أن اللقاحات تحقق بشكل منفصل وفي أجزاء مختلفة من الجسم.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين أنه من الجائز أن تكوني حاملاً أو تخططين للحمل، إستشيري الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

السيارة وإستعمال الماكينات

من غير المرجح أن يؤثر إنجيريكس بي على قدرتك على السيارة أو استعمال الماكينات. لكن، لا يجوز السيارة أو استعمال الماكينات إذا لم تكن على ما يرام.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي إنجيريكس بي على صوديوم

يحتوي إنجيريكس بي على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملغ) للمقدار الدوائي، أي أنه يُعتبر خالٍ من الصوديوم.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

يُعطى إنجيريكس بي 20 مكغ:

- بالحقن في عضلة الذراع العلوية
- بالحقن تحت الجلد إذا تحصل لك كدمات بسهولة أو إذا كان لديك مشاكل نزف

يُعطى إنجيريكس بي 10 مكغ:

- بالحقن في عضلة الذراع العلوية لدى الأطفال والمراهقين
- بالحقن في عضلة الفخذ لدى الرضع والأطفال الصغار
- بالحقن تحت الجلد إذا تحصل لك كدمات بسهولة أو إذا كان لديك مشاكل نزف

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

ستتلقى سلسلة حقن من إنجيريكس بي. بمجرد الإنتهاء من سلسلة الحقن يمكنك توقع حماية طويلة الأمد ضد التهاب الكبد B.

يجب الخض قبلاً من الاستعمال.

مشاكل كلوية وغسيل الكلى

إنجيريكس بي 20 مكغ

- أشخاص أبناء 16 وما فوق

إذا كان لديك مشاكل في الكلى أو كنت مُتعالج بغسيل الكلى، من شأن طبيبك أن يقرر تطعيمك بواسطة مقادير دوائية إضافية من اللقاح.

من شأن طبيبك أيضاً أن يقرر أن يجري فحص دم للتأكد من أنك محمي من التهاب الكبد B.

إنجيريكس بي 10 مكغ

إذا كان لطفلك مشاكل في الكلى أو إذا كان متعالجاً بغسيل الكلى، من شأن طبيبك أن يقرر بإجراء فحص دم أو أن يعطي مقادير دوائية إضافية من اللقاح للتأكد من أن طفلك محمي.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

يجب المراقبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إنجيريكس بي قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًّا منها.

ردود فعل تحسسية

يجب مراجعة الطبيب حالاً إذا كان لديك رد فعل تحسسي. الأعراض قد تشمل:

- إنتفاخ في الوجه

- ضغط دم منخفض

- صعوبة في التنفس

- إزرقاق الجلد

- فقدان الوعي.

تبدأ هذه الأعراض عادةً سريعاً جداً بعد إعطاءك الحقنة. راجع الطبيب على الفور إذا حدثت بعد معادرة العيادة. بالنسبة لـ إنجيريكس بي 20 مكغ، الوتيرة بالنسبة لردود الأفعال هذه هي حتى 1 من كل 10,000 مقادير دوائية من اللقاح.

أعراض جانبية أخرى تشمل:

أعراض جانبية شائعة جداً

قد تظهر في أكثر من 1 من كل 10 مقادير دوائية من اللقاح:

- صداع (بلغ عن هذا العرض بالنسبة لإنجيريكس بي 10 مكغ وقد يظهر في أكثر من 1 من كل 10 مقادير دوائية من اللقاح)
- ألم وإحمرار في منطقة الحقن
- الشعور بارهاق
- سخط.

أعراض جانبية شائعة

قد تظهر في حتى 1 من كل 10 مقادير دوائية من اللقاح:

- صداع (بلغ عن هذا العرض بالنسبة لإنجيريكس بي 20 مكغ وقد يظهر في حتى 1 من كل 10 مقادير دوائية من اللقاح)
- نعاس
- غثيان أو نقيؤات
- إسهال أو وجع بطن
- فقدان الشهية
- سخونة مرتفعة
- شعور عام غير جيد
- إنفاس في منطقة الحقن
- ردود فعل في منطقة الحقن مثل كتلة صلبة.

أعراض جانبية غير شائعة

قد تظهر في حتى 1 من كل 100 مقادير دوائية من اللقاح:

- دوار
- ألم في العضلات
- أعراض شبيهة بالإنفلوانزا.

أعراض جانبية نادرة

قد تظهر في حتى 1 من كل 1,000 مقادير دوائية من اللقاح:

- إنفاس الغدد
- شرى، طفح وحكة
- آلام في المفاصل
- شعور بالوخز مثل الدبابيس والإبر.

أعراض جانبية نادرة جداً

قد تظهر في حتى 1 من كل 10,000 مقادير دوائية من اللقاح:

- الميل للإصابة بسهولة ونزيف غير منقطع في حال حدوث جرح ضغط دم منخفض
- التهاب في الأوعية الدموية
- إنفاس ماجي في الوجه، حول منطقة الفم والحنجرة لديك (angioneurotic oedema)
- عدم القدرة على تحريك العضلات (paralysis)
- التهاب الأعصاب (neuritis) التي قد تسبب فقدان أو قلة الشعور، يشمل التهاب مؤقت للأعصاب، الذي يسبب ألم، ضعف وشلل في الأطراف وفي أحيان متقاربة قد يتقدم للصدر والوجه (متلازمة غilan-Barier)، مرض عصب العين (optic neuritis) والتصلب المتعدد
- مشاكل في تحريك ذراعيك أو رجليك (neuropathy)
- التهاب الدماغ (encephalitis)
- مرض الإعتلال الدماغي (encephalopathy)
- تلوث حول الدماغ (التهاب سحايا الدماغ – meningitis)
- اختلالات (تشنجات)

- فقدان حساسية الجلد لللائم أو للمس (hypoesthesia) • نتوءات بنفسجية أو مائلة إلى الحمرة-بنفسجية على الجلد (lichen planus)
 - بقع حمراء أو بنفسجية على جلدك (arthritis)
 - تصلب وألم في المفاصل (arthrosis)
 - ضعف العضلات.
- قد تحدث لدى الرضع الذين ولدوا خدجاً (في الأسبوع 28 من الحمل أو قبل) فوacial أطول من المعتاد بين التنفسات خلال 2-3 أيام بعد الولادة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى

النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجا رؤية الأطفال و/أو الرضع ، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب التسوس بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في البراد (ما بين 2 حتى 8 درجة مئوية). لا يجوز التجميد.
- لا يجوز الاستعمال في حال تجمد اللقاح.
- يجب التخزين في العلبة الأصلية للحماية من الضوء.
- لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو للقمامة المنزلية. استشر الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الاستعمال. تساعد هذه التدابير في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة إلى المركب الفعال أيضاً:

Sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, aluminium (as aluminium hydroxide), water for injection.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
إنجيريكس بي هو سائل أبيض عكر للحقن متوفّر في قنينة أو محقنة جاهزة للاستعمال.
- إنجيريكس بي 20 مكغ – أحجام العلب:
قنينة: 100، 50، 25، 10، 1 محقنة جاهزة للاستعمال: 100، 50، 25، 10، 1
إنجيريكس بي 10 مكغ – أحجام العلب:
قنينة: 100، 50، 25، 10، 1 محقنة جاهزة للاستعمال: 50، 25، 10، 1، 1 من الجائز لا تسوق كافة أحجام العلب.
- صاحب الإمتياز: چلاكسو سميثكلاين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيت تكفا.
- المنتج: چلاكسو سميثكلاين بيولوجيكاليس. S.A، ريكنسارت، بلجيكا.
- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
إنجيريكس بي 10 مكغ: 055-06-26267-00
إنجيريكس بي 20 مكغ: 035-60-25829-00
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم تحريرها في كانون الأول 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

العلامات التجارية بملكية أو بامتياز مجموعة شركات GSK.
© 2023 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

Eng B PT V4C

The following information is intended for healthcare professionals only:


Shake before use.

Upon storage, the content may present a fine white deposit with a clear colourless supernatant. Once shaken the vaccine is slightly opaque.

The vaccine should be inspected visually for any foreign particulate matter and/or abnormal physical appearance prior to administration. In the event of either being observed, do not administer the vaccine.


The entire contents of a mono-dose container must be withdrawn and should be used immediately.

Instructions for the pre-filled syringe



Hold the syringe by the barrel, not by the plunger.

Unscrew the syringe cap by twisting it anticlockwise.



To attach the needle, connect the hub to the Luer Lock Adaptor and rotate a quarter turn clockwise until you feel it lock.

Do not pull the syringe plunger out of the barrel. If it happens, do not administer the vaccine.

Disposal

Any unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.