

كساريلتو 2.5 ملغ

أقرص مطلية

يحتوي كل قرص على:

ريفاروكسابان 2.5 ملغ (Rivaroxaban 2.5 mg)

المواد غير الفعالة ومسببات الحساسية في المستحضر: انظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك، لا تعطه للآخرين، لأنه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

بطاقة معلومات السلامة للمتعالج

بالإضافة للنشرة، تتوفر للمستحضر كساريلتو 2.5 ملغ بطاقة معلومات حول السلامة للمتعالج.

تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة حول السلامة التي يتوجب عليك معرفتها قبل بدء العلاج وخلال العلاج بكساريلتو 2.5 ملغ والتصرف وفقها. يجب قراءة بطاقة المعلومات حول السلامة للمتعالج والنشرة للمستهلك بتمعن قبل بدء استعمال المستحضر. يجب حفظ البطاقة لقراءتها بتمعن ثانية إذا دعت الحاجة.

(1) لم أعد هذا الدواء؟

كساريلتو، بمشاركة حمض أسيتيل ساليسيليك (المعروف باسم أسبيرين) أو بمشاركة حمض أسيتيل ساليسيليك وكلوبيدوجريل، مخصص لمنع أحداث التخثر العصيدي (أحداث تخثر) لدى متعاليين كبار بعد متلازمة تاجية حادة (مجموعة من الحالات التي تشمل نوبة قلبية وذبحة صدرية غير مستقرة، التي هي نوع لألم شديد في الصدر) ولديهم زيادة في مؤشرات قلبية معينة في فحوص الدم.

كساريلتو، بمشاركة حمض أسيتيل ساليسيليك (المعروف بالاسم أسبيرين)، مخصص لمنع حوادث التخثر العصيدي (حوادث تخثر) لدى مرضى كبار يعانون من مرض في الشرايين التاجية أو من مرض شرياني محيطي مصحوب بأعراض حيث إنهم معرضون لخطورة أكبر لحصول حوادث إقفارية.

الفصيلة العلاجية: ينتمي كساريلتو 2.5 ملغ إلى فصيلة أدوية تسمى مضادات التخثر، ويعمل عن طريق تقليل قابلية تشكل خثرات دموية وذلك بواسطة حصر العامل الضالع في مسيرة التخثر (عامل 10a).

(2) قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) لـ ريفاروكسابان أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. لقائمة المركبات غير الفعالة، انظر البند 6 "معلومات إضافية".
- كنت تعاني من نزف متزايد.
- وُجد لديك مرض أو حالة في عضو بالجسم يزيدان من خطورة حدوث نزف جدي (مثل: قرحة في المعدة، رض أو نزف في الدماغ، اجترت مؤخراً عملية جراحية في الدماغ أو في العينين).
- كنت تتناول أدوية لمنع الخثرات الدموية (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أبيكسابان أو هيبارين)، عدا حالات الانتقال من علاج بمضاد تخثر واحد إلى آخر أو عندما تتلقى هيبارين عن طريق قنطرة في الوريد أو في الشريان لإبقائه مفتوحاً.
- كنت تعاني من متلازمة تاجية حادة وقاسيت في السابق من نزف أو خثرة دموية في الدماغ (سكتة دماغية).
- كنت تعاني من مرض الشرايين التاجية أو من مرض شرياني محيطي وحدث لديك في الماضي نزف دماغي (سكتة دماغية) أو كان لديك انسداد في الشرايين الصغيرة التي تزود أنسجة الدماغ العميقة بالدم (سكتة جوية) أو إذا كانت لديك خثرة دموية في الدماغ (سكتة دماغية إقفارية، ليست جوية) في الشهر السابق.
- كنت تعاني من مرض كبدي الذي يؤدي إلى زيادة الخطورة لحدوث نزف.
- كنت حاملاً أو مرضعة.

لا تتناول كساريلتو 2.5 ملغ واحك لطبيبك إذا انطبقت عليك إحدى الحالات الموصوفة أعلاه.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول كساريلتو 2.5 ملغ.

لا يجوز استعمال كساريلتو 2.5 ملغ بمشاركة أدوية معينة التي تقلل من تخثر الدم مثل پراسوجريل أو نيكاجريلور، عدا حمض أسيتيل ساليسيليك (أسبيرين) وكلوبيدوجريل.

استعمال كساريلتو 2.5 ملغ يتطلب الحذر الخاص

- إذا كنت معرضاً لخطورة متزايدة لحصول نزف الأمر الذي يمكن أن يحدث في إحدى الحالات التالية:
 - مرض كلوي خطير، لأن الأداء الوظيفي لكليتك قد يؤثر على كمية الدواء التي تعمل في جسمك.
 - كنت تتناول أدوية أخرى لمنع الخثرات الدموية (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أبكسابان أو هيبارين)، عندما تنتقل من مضاد تخثر واحد إلى آخر أو عندما تتلقى هيبارين عن طريق قنطر وريدي أو شرياني لإبقائه مفتوحاً (أنظر البند 2 "إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى...").
 - اضطرابات نزف
 - ضغط دم مرتفع جداً، غير متوازن بواسطة علاج دوائي.
 - أمراض في المعدة أو في الأمعاء التي قد تسبب نزف، مثل: التهاب الأمعاء أو المعدة، أو التهاب المريء الناتج، مثلاً، عن مرض الارتداد المريئي - المعدي (مرض ترتفع فيه الحموضة من المعدة إلى المريء) أو أورام الموجودة في المعدة، أو في الأمعاء أو في الأعضاء التناسلية أو في المسالك البولية.
 - مشاكل في الأوعية الدموية لشبكية العين (retinopathy).
 - مرض رئوي تتوسع فيه القصبات الهوائية وتمتلى بإفرازات قيحية (bronchiectasis) أو نزف رئوي سابق.
 - تجاوزت عمر 75 سنة.
 - كنت تزن أقل من 60 كلغ.
 - إذا وُجد لديك مرض الشرايين التاجية مع فشل قلبي خطير مصحوب بأعراض.
- إذا وُجد لديك صمام قلب اصطناعي.
- إذا علمت بأنك تعاني من مرض باسب متلازمة أضداد الشحميات الفوسفورية (اضطراب في الجهاز المناعي الذي يؤدي إلى خطورة زائدة لحدوث خثرات دموية)، احك لطبيبك وهو سيقدر فيما إذا كانت هناك حاجة لتغيير العلاج.

في حال كانت إحدى الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، احك للطبيب قبل تناول الدواء. سوف يقرر الطبيب فيما إذا كان يجب علاجك بـ كساريلتو 2.5 ملغ وإذا كنت تحتاج متابعة حثيثة.

- إذا كان الطبيب يظن بأنك معرض لخطورة زائدة لتطوير قرحة في المعدة أو الأمعاء، فمن الجائز أن يعطيك أيضاً علاجاً لمنعها.

إذا خُطت لك إجراء عملية جراحية أو إجراء غزوي

- من المهم جداً تناول كساريلتو 2.5 ملغ قبل وبعد العملية الجراحية أو الإجراء الغزوي، بالضبط في الأوقات التي حددها لك الطبيب.
- إذا كان هناك تدخل للقنطر أو حقنة داخل العمود الفقري (مثلاً لتخدير فوق الجافية أو تخدير شوكي أو لتسكين الألم) في عملتك الجراحية:
 - من المهم جداً تناول كساريلتو 2.5 ملغ قبل وبعد الحقنة أو إزالة القنطر، بالضبط في الأوقات التي حددها لك الطبيب.
 - راجع الطبيب المعالج فوراً إذا كنت تعاني من خدر أو ضعف في الرجلين أو من مشاكل في الأمعاء أو في المثانة البولية بعد زوال مفعول المخدر، لأن ذلك يحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

الأطفال والمراهقون

الدواء غير مخصص للأطفال ولمراهقين دون عمر 18 سنة. لا تتوفر معلومات كافية حول الاستعمال لدى الأطفال والمراهقين.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

- إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص، إذا كنت تتناول:
- أدوية معينة مضادة للتلوثات الفطرية (مثل: فلوكونازول، إيتراكونازول، فوريكونازول، بوساكونازول)، عدا تلك المخصصة فقط للدهن على الجلد.
 - أقرص تحتوي على كيتوكونازول لعلاج متلازمة كوشينج - حالة يُنتج فيها الجسم فائض من الكورتيزول.
 - أدوية معينة لعلاج التلوثات الجرثومية (مثل: كلاريثروميسين، إريثروميسين).
 - أدوية معينة مضادة للفيروسات لعلاج التلوث بفيروس الأيدز (HIV) (مثل: ريتونافير).
 - أدوية أخرى مضادة للتخثر (مثل: إنوكسافارين، كلوبيدوجريل أو مضادات فيتامين K مثل: وارفارين وأسينوكومارول، پراسوجريل وتيكاغريلور [أنظر البند 2 "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء"]).
 - أدوية مضادة للالتهاب ومسكنة للألم (مثل: نابروكسين أو حمض أسيتيل ساليسيليك [أسبيرين]).
 - درونيدارون، دواء لعلاج النيبض غير المنتظم.
 - أدوية معينة لعلاج الاكتئاب (مثبطات انتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين [SSRIs] أو مثبطات لإعادة امتصاص السيروتونين ونورإيبينفرين [SNRIs]).
- هذه الأدوية قد تؤدي إلى زيادة تأثير كساريلتو 2.5 ملغ. سيقدر طبيبك فيما إذا يعالجك بـ كساريلتو 2.5 ملغ وفيما إذا كانت هناك حاجة لخضوعك لمراقبة طبية حثيثة.

كذلك، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

- أدوية معينة لعلاج الصرع (مثل: فينيتوين، كاربامازيبين، فينوباربيتال).
- سانت. جونس وورت، مستحضر نباتي لعلاج الاكتئاب (العرن المثقوب).

- ريفامبيسين (مضاد حيوي). هذه الأدوية قد تسبب انخفاضاً في تأثير كساريلتو 2.5 ملغ. سيقرر طبيبك فيما إذا يعالجك بـ كساريلتو 2.5 ملغ وفيما إذا كانت هناك حاجة لخضوعك لمراقبة طبية حثيثة.

استعمال الدواء والغذاء

بالإمكان تناول كساريلتو 2.5 ملغ مع أو بدون طعام.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا تتناولي كساريلتو 2.5 ملغ إذا كنت حاملاً أو مرضعة. إذا كان هناك احتمال بأن تصبحي حاملاً، فعليك استعمال وسيلة منع حمل موثوق بها أثناء تناول كساريلتو 2.5 ملغ. إذا أصبحت حاملاً أثناء فترة تناول الدواء، توجهي فوراً للطبيب الذي سيقرر بخصوص استمرار العلاج.

السياقة واستعمال الماكينات

قد يسبب كساريلتو 2.5 ملغ دوام (عرض جانبي شائع) أو إغماء (عرض جانبي غير شائع) (أنظر البند 4 "الأعراض الجانبية"). لا يجوز السياقة، ركوب الدراجة، استعمال المعدات أو تشغيل ماكينات أثناء استعمال كساريلتو 2.5 ملغ في حال كنت تتأثر من هذه الأعراض.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي الدواء على لاكتوز وصيديوم. إذا قيل لك من قبل الطبيب بأنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، راجع الطبيب قبل أن تبدأ بتناول كساريلتو 2.5 ملغ. يحتوي الدواء على أقل من 1 ميليومول صوديوم (23 ملغ) في كل قرص وبالتالي يعتبر "خالياً من الصوديوم" بجوهره.

3) كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب دائماً. عليك الاستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

- الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الدوائية الاعتيادية هي عادة: قرص واحد من كساريلتو 2.5 ملغ مرتين في اليوم. يجب تناول كساريلتو 2.5 ملغ في نفس الساعات تقريباً من كل يوم (مثلاً، قرص واحد في الصباح وقرص واحد في المساء).
- لن يُعطى لك كساريلتو 2.5 ملغ كدواء منفرد بحد ذاته. سوف يوصيك الطبيب أيضاً بتناول أحد الأدوية التالية:
 - حمض أسيتيل ساليسيليك الذي يعرف باسم أسبيرين أو
 - حمض أسيتيل ساليسيليك سوية مع كلويدوجريل.

سيرشذك الطبيب بخصوص الجرعة الدوائية الواجب عليك تناولها من الأدوية الإضافية (الجرعة الدوائية الموصى بها عادة هي بين 75 ملغ إلى 100 ملغ من حمض أسيتيل ساليسيليك مرة في اليوم أو جرعة دوائية يومية ذات 75 ملغ حتى 100 ملغ من حمض أسيتيل ساليسيليك سوية مع جرعة دوائية يومية قدرها 75 ملغ من كلويدوجريل).

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب بدء العلاج بـ كساريلتو 2.5 ملغ بعد متلازمة تاجية حادة بأسرع ما يمكن وذلك بعد تحقيق استقرار المتلازمة التاجية الحادة، أبكر ما يمكن 24 ساعة بعد دخول المستشفى وفي الوقت الذي عادة يتم فيه إيقاف العلاج بمضاد التخثر الذي يعطى بواسطة حقنة. سيرشذك طبيبك متى تبدأ العلاج بـ كساريلتو 2.5 ملغ إذا شُخص لديك مرض الشرايين التاجية أو مرض الشرايين المحيطية. سيقرر طبيبك بخصوص فترة العلاج.

إذا كنت تستصعب بلع القرص بشكله الكامل، تحدث مع طبيبك حول طرق أخرى لتناول كساريلتو 2.5 ملغ. بالإمكان سحق القرص وخلطه مع الماء أو مهروس التفاح، مباشرة قبل تناوله. إذا دعت الحاجة، سيقوم طبيبك بإعطائك كساريلتو 2.5 ملغ المسحوق عن طريق أنبوب تغذية للمعدة. لا تتوفر معلومات بخصوص الشطر/المضغ.

إذا تناولت جرعة دوائية أكبر فعليك التوجه فوراً إلى الطبيب المعالج. إن تناول كساريلتو 2.5 ملغ أكثر من اللازم يزيد الخطورة لحدوث نزف.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إن تناول الدواء في نفس الوقت من كل يوم، يساعدك على تذكر تناوله.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، فلا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية. تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء فإن هذا الأمر قد يزيد من خطورة الإصابة بسكتة أو بنوبة قلبية إضافية أو الوفاة نتيجة مرض يتعلق بقلبك أو بالأوعية الدموية لديك.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال كساريلتو 2.5 ملغ قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

مثل الأدوية المشابهة الأخرى لتقليل تشكل الخثرات الدموية، فإن كساريلتو 2.5 ملغ قد يسبب حدوث نزف الذي قد يشكل خطراً على الحياة. النزف الشديد قد يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم (صدمة). في بعض الحالات قد يكون النزف خفيفاً.

يجب التوجه إلى الطبيب فوراً إذا كنت تعاني من أحد الأعراض الجانبية التالية:

علامات لنزف:

- نزف دماغي أو داخل الجمجمة (الأعراض يمكن أن تشمل صداع، ضعف في جانب واحد، تقيؤ، اختلاج، انخفاض مستوى الوعي وتصلب الرقبة. هذه حالة طبية طارئة خطيرة، يجب البحث عن علاج طبي فوري!).
 - نزف مطول أو متزايد.
 - ضعف غير عادي، إرهاق، شحوب، دوام، صداع، انتفاخ مجهول السبب، ضيق تنفس، ألم في الصدر أو ذبحة صدرية (angina pectoris).
- سيقرر طبيبك فيما إذا كانت هناك حاجة لمراقبة حثيثة أو تغيير في العلاج.

علامات لرد فعل جلدي خطير:

- طفح شديد ومنتشر على الجلد، حويصلات أو تقرحات في النسيج المخاطي، مثلاً في الفم أو العينين Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis).
 - رد فعل للدواء الذي يؤدي إلى طفح، سخونة، التهاب أعضاء داخلية، شذوذ في الدم وحدوث مرض جهازى (متلازمة DRESS).
- إن وتيرة هذه الأعراض الجانبية هي نادرة جداً (حتى مستعمل 1 من بين 10,000 مستعمل).

علامات لرد فعل تحسسي خطير:

- انتفاخ الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحنجرة؛ صعوبات في البلع؛ شرى وصعوبات في التنفس؛ هبوط مفاجئ لضغط الدم.
- إن تواتر ردود الفعل التحسسية الخطيرة هو نادر جداً (ردود فعل استهدافية، بما في ذلك صدمة استهدافية؛ قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 10,000) وغير شائعة (وذمة وعائية وذمة تحسسية؛ قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 100).

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة (Common) (أعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين 10):

- انخفاض في خلايا الدم الحمراء الذي قد يؤدي لحدوث شحوب، لضعف أو لضيق في التنفس
- نزف في المعدة أو في الأمعاء، نزف في الأعضاء التناسلية والبولية (يشمل دم في البول ونزف طمئي متزايد)، رعاف، نزف في اللثة
- نزف إلى داخل العين (يشمل نزف من بياض العين)
- نزف إلى داخل نسيج أو تجويف في الجسم (نزف دموي داخلي موضعي، رضح)
- سعال دموي
- نزف من الجلد أو من تحت الجلد
- نزف بعد عملية جراحية
- تسرب دم أو سائل من جرح عملية جراحية
- انتفاخ في الأطراف
- ألم في الأطراف
- خلل في الأداء الوظيفي الكلوي (يمكن الكشف عنه بواسطة الفحوص التي تُجرى من قبل الطبيب)
- سخونة
- آلام في البطن، صعوبات في الهضم، غثيان أو تقيؤ، إمساك، إسهال
- ضغط دم منخفض (أعراض ذلك يمكن أن تكون دوام أو إغماء عند انتقالك إلى وضعية الوقوف)
- انخفاض عام في القوة والحيوية (ضعف، إرهاق)، صداع، دوام
- طفح، حكة في الجلد
- فحوص الدم يمكن أن تشير إلى ارتفاع في إنزيمات كبدية معينة

أعراض جانبية غير شائعة (Uncommon) (أعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين 100):

- نزف داخل الدماغ أو داخل الجمجمة (انظر أعلاه، علامات لنزف)
- نزف إلى داخل مفصل الذي يسبب ألم وانتفاخ
- قلة الصفيحات الدموية (عدد منخفض من الصفيحات الدموية، هي خلايا التي تساعد على تخثر الدم)
- ردود فعل تحسسية، تشمل ردود فعل تحسسية في الجلد
- خلل في الأداء الوظيفي للكبد (يمكن الكشف عنه بواسطة الفحوص التي تُجرى من قبل الطبيب)
- فحوص دم يمكن أن تشير إلى ارتفاع في البيليروبين، في إنزيمات معينة للبنكرياس أو الكبد أو عدد الصفيحات الدموية
- إغماء
- شعور عام غير جيد
- نبض متسارع
- جفاف الفم
- شرى (urticaria)

أعراض جانبية نادرة (Rare) (أعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين 1,000):

- نزف إلى داخل العضل
- ركود صفراوي (قلة تدفق الصفراء)، التهاب الكبد (hepatitis) الذي يشمل تضرر خلايا الكبد (التهاب الكبد الذي يشمل تضرر الكبد)
- اصفرار الجلد والعينين (يرقان)
- انتفاخ موضعي
- نزف دموي داخلي موضعي (ورم دموي) في منفرج الرجلين نتيجة تعقيد لإجراء قلبي يُدخل فيه قثطر إلى شريان في الرجل

أعراض جانبية نادرة جداً (Very rare) (أعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين 10,000):

- تراكم الحمضات، نوع من خلايا الدم المحببة البيضاء التي تسبب التهاباً في الرئتين (الالتهاب الرئوي البوزيني).

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (لا يمكن تقييم الشيوع من المعلومات المتوفرة):

- فشل كلوي بعد نزف شديد
- نزيف في الكلى، يكون مصحوباً أحياناً بوجود الدم في البول، ما يؤدي لانعدام قدرة الكلى على العمل كما ينبغي (اعتلال الكلى المرتبط بمضادات التخثر).
- ضغط زائد في عضلات الرجلين أو الذراعين بعد نزف، الذي يسبب ألم، انتفاخ، تغيرات حسية، خدر أو شلل (متلازمة الخيز بعد حدوث نزف)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيف يخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقير بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يُمنع التخزين فوق 25 درجة مئوية.

• الأقرص المسحوقة

تكون الأقرص المسحوقة مستقرة في الماء أو في هريس التفاح حتى 4 ساعات.

- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة المهملات في البيت. قم باستشارة الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. إن ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, hypromellose 5 cP, hypromellose 15 cP, magnesium stearate, macrogol 3350, titanium dioxide, sodium lauryl sulfate, ferric oxide yellow.

كل قرص من كساريلتو 2.5 ملغ يحتوي على 35.7 ملغ لآكتوز مونوهيدرات.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

أقراص مطلية مستديرة، لونها أصفر فاتح، محدبة من كلا الجانبين ومعلّمة بـ "BAYER" من جانب واحد و- "2.5" مع مثلث في الجانب الثاني. تتوفر الأقراص ضمن لويحات (بليستر) ضمن علب ذات 14، 56، 60، 168 قرصاً. قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

- **صاحب الامتياز وعنوانه:** باير إسرائيل م.ض.، شارع هاحراش 36، هود هشارون 4527702.
- **اسم المنتج وعنوانه:** باير أي.جي.، ليفركوزن، ألمانيا أو باير HealthCare Manufacturing S.r.l.، ميلانو، إيطاليا.
- تم تحريرها في أيلول 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.
- أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 151-87-34048-00، 151-87-34048-01، 151-87-34048-02، 151-87-34048-03
- لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.