

مولتاك

أقراص مطلية 400 ملغم

المادة الفعالة

يحتوي كل قرص مطلي على درونيدارون (كميدروكولوريد) 400 ملغم

Dronedarone (as hydrochloride) 400 mg
معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء: معلومات الحساسية في المستحضر: انظر الفقرة 2
معلومات إضافية: انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".

احفظ هذه النشرة بمعنى حق تهنئتها.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لأجلك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حاليهم الطيبة مشابهة لحالتك.

(1) لأى غرض مخصوص الدواء؟

الدواء مخصوص لعلاج الرجفان الأذيني بعد استعمال نظم قلب طبيعي (نظم جيبى).
الفصيلة العلاجية: مستحضر مضاد للانقباض لتنظيم نظم القلب.

قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كت تعاني من اضطرابات في القلب العصبي في القلب التي تتجلى بنظم قلب بطيء يحثويها الدواء (انظر الفقرة 6)

- إذا شعر بالدوار، إذا وجد لديك نظم ضربات القلب فبالإمكان استعمال مولتاك أو شعور بالدوار، إذا وجد لديك نظم ضربات القلب جيماً (أقل من 50 خفقة بال دقيقة)

- التخطيط الكهربائي للقلب (ECG) يدل على مشكلة في القلب المسمّاة "إطالة مقطع QT" (فوق 500 جزء من الألف من الثانية)

- كت تعاني من رجفان أذيني مزمن (رجفان متواصل لفترة 6 أشهر على الأقل) وأنفذ قرار بعد استخدام النظم الجيبى بتوسيع نظم القلب

- كت تعاني من عدم استقرار (الاختناق) في ضغط الدم، الذي من شأنه أن يؤدي إلى توقف دم شريانى غير كاف لأعضاء الجسم

- كت تعاني أو عانت في الماضي من قصور في القلب الذي يمكن أن يتجلّى بوعنة في الرجلين، صعوبات في التنفس عند الاستلقاء أو النوم أو ضيق في التنفس أثناء الحركة

- حجم الدم المتفاق من القلب بكل إنقباض متخفض جداً (اضطراب في وظيفة الطبلين الأذينيين)

- تناول أيهودارون في الماضي وطورت أمراض جانبية روثوية أو كبدية مشاكل في نظم القلب، الإكتناب، أذونية بعد زراعة الأعضاء (انظر فقرة "التفاعلات بين الأدوية")

- كت تعاني من مشاكل خطيرة في الأداء الوظيفي الكبدي تناول أيهودارون في الأداء الوظيفي الكبدي

- كت تناول بايجاتران (منع تشكيل خثارات دموية) (انظر فقرة "التفاعلات بين الأدوية")

- كت في فتره الحمل إذا إنطبخت إحدى تلك الحالات، فلا يجوز استعمال مولتاك.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- كت تعاني من مشكلة التي تؤدي إلى إنقباض نسب البوتاسيوم أو المغنيزيوم في الدم، يجب معالجة هذه المشكلة قبل بدء استعمال مولتاك

- تجاوزت عمر 75 سنة كت تعاني من حالة صعب فيها الوعاء الدموي الذي يزود الدم لعضلة القلب صليباً (وضيقاً) (مرض مرض كولي تانى)

- أثناء العلاج بالدواء، إحكام للطبيب إذا: أصبح الرجفان الأذيني لديك مزمناً خلال العلاج بمولتاك - يجب التوقف عن العلاج - مولتاك

- كت تعاني من إنفاس في راحتي القدمين أو في الرجلين، صعوبات تنفسية عند الاستلقاء أو النوم، ضيق في التنفس أثناء ممارسة النشاطات أو زيادة في الوزن (هذه علامات وأعراض انحسار القلب)

- إحكام للطبيب فوراً إذا كنت تطور إحدى العلامات أو الأعراض التالية لمشكلة في الكبد:
ألم أو انتزاع في منطقة المعدة (طن)، فقدان الشهية للطعام، غثيان، تقيؤات، أسفلار الجلد أو الجزء الأسفل في العينين (بركان)، لون أحمر من المعتاد للبول، إلخ (خاصة بمشاركة أغراض إضافية الموصوفة هنا). حكة قبل تناول مولتاك

- كنت تعاني من ضيق في التنفس أو سعال جاف، إحكام للطبيب الذي يفحص رئتيك إذا ما ذكرت أنا فنياً بانتropic عليك (أو في حالة الشك)، الرجاء استشارة الطبيب أو الصيدلي

الفحوص والمتابعة:

أثناء استعمال مولتاك يمكن للطبيب أن يجري لك فحوص لتوضيح وضع الطبي وتأثير الدواء عليه.

من شأن الطبيب أن يفحص النشاط الكهربائي لقلبك بواسطة جهاز التخطيط الكهربائي (القلب) (ECG)

يرسل الطبيب لإجراء فحص دم يتعلق بوظائف الكبد قبل بدء العلاج بـ مولتاك وأثناء العلاج

إذا كنت تتناول أدوية مضادة لتشكل خثارات الدم، مثل وارفارين، سيرسلك الطبيب لإجراء فحص دم يسمى INR، ليتحقق فيما إذا كان الدواء يعمل جيداً

من شأن الطبيب أيضاً أن يجري فحوص دم إضافية. قد تتأثر نتيجة إحدى الفحوص، لفحص شفاط الكلوي (سبس الكلرياتينين في الدم) من مولتاك. سأذن طبلك بالحساب

هذا الأمر عند فحص نتائج فحص الدم ويستعمل قيمة أخرى من أجل القيمة «الطبيعية»

من شأن الطبيب أن يجري لك فحص للرئتين في حالات مميتة هناك حاجة للتوقف عن العلاج بـ مولتاك.

الرجال آخرين الذين يتناولون مولتاك:

الأطفال والمهارقون: لا يوصى باستخدام مولتاك لدى أطفال ومهارقون دون عمر 18 سنة.

التفاعلات بين الأدوية: إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضطرابات غذائية، إحكام للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

من شأن طبلك أن يوصي باستخدام دواء ضد تشكيل الخثارات الدموية، بما يتاسب مع وصفك.

مولتاك وأدوية أخرى يمكن أن يؤثر الواحد على الآخر ويبيّن عن ذلك أعراض جانبية جدية. من شأن الطبيب أن يغير المقدار الدوائي للأدوية الأخرى التي تتناولها.

لا يجوز تناول الأدوية المنشطة سوية مع مولتاك.

أدوية أخرى مستعملة لعلاج اضطرابات نظم القلب مثل: فليكاينيد، بروپافينون، كينديدين، بيزوبرافيد، دوتيفيلين، سوتالول، مولتاك، بروپافارون.

أدوية لعلاج التلوثات الفطرية مثل: كيتوكونازول، فوريكونازول، إيتراكونازول أو يوسوكونازول

أدوية من فصيلة مضادات الافتاك ثلاثية الحلقة (العلاج الإكتناب)

أدوية من فصيلة الفينوتيازينات (التهدة)

بيبيديلين للامتصاص التالفة عن الفم

تيليتوريسين، إريتروميسين أو كلاريتريوميسين (مضادات حيوية لعلاج التلوثات)

ترفيدين - لعلاج المرضية

نيفازورون - لعلاج الإكتناب

سيزابيريد - لعلاج ارتداد الطعام والحموضة من المعدة إلى الفم

ريتنيافير - لعلاج ثلث الإيدز

بابيجاتران - لمنع تشكيل خثارات دموية

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول إحدى الأدوية التالية:

أدوية لعلاج ضغط الدم المرتفع، للألم في الصدر الناتج عن مرض قلبي أو لمشاكل أخرى في القلب مثل: فياراميل، ديلاتازير، نيفيتاين، ميتورپلول، بروپرانولول أو دیوكوكسین

أدوية لخفض الكوليسترول في الدم مثل: سيميفاستاتين، لوفاستاتين، أتورفاستاتين أو روسبافاستاتين

مضادات تناول الطعام مثل وارفارين، بيريوكسان، إيدوكسان، أبيكسابان وآبيكسابان

أدوية لعلاج المرض: نيفوباربيتال، كاربارامبين أو فينيتاكين

أدوية لمنع رضض متزدوج: سيريلوموس، إيفيريلوموس، سيلوكسيپورين

مستحضر ثباتي لمنع الإكتناب - سانت جون وورت (St. John's Wort) (هيبريريكوم)

ريفامپينيس - للسل

استعمال الدواء والطعام:

يجب تناول قرص واحد في الصباح مع الطعام وقرص واحد في المساء مع الطعام.

لا يجوز شرب عصير الچرب فوراً أثناء تناول مولتاك، لأن ذلك يمكن أن يرفع نسبة المادة الفعالة، درونيدارون، في الدم، وأن يرفع احتمال حدوث أعراض جانبية.

المادة الفعالة، درونيدارون، في الدم، وأن يرفع احتمال حدوث أعراض جانبية.

الحمل والإرضاع:

استثنى الطيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء خلال فترة الحمل والرضاعة،
لا يجوز تناول مولاتك إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، عتقددين بأنه من الجائز أن تكوني
في فترة الحمل أو خططين للحمل، لا يجوز تناول مولاتك إذا كنت في فترة الحمل أو إذا كنت في فترة الحمل أو إذا كنت في سن الخصوبة ولا تستعملين وسائل ناجحة لمنع الحمل
إذا أصبحت حاملة أهلاً لاستعمال مولاتك، توقيفي عن تناول الأقراص وراحجي الطبيب فوراً
إذا لم يعرف فيما إذا كان مولاتك ينتقل إلى حليب الأم، عليك إشارة الطبيب ليقرر فيما إذا
عليك استعمال مولاتك أو الإضار، عليك إشارة الطبيب ليكون للأمراء.
استثنى الطيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء خلال فترة الحمل والرضاعة.

السيادة وإستعمال الماكبات:
لا يؤثر مولتك عادة على القدرة على السيادة أو على السيادة أو إستعمال الماكبات قد تتأثر من معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

مولتاك يحتوي على الكتوز.
لكتوز عبارة عن نوع من السكر. إذا قيل لك من
لسكرات معينة، توجه لطبيبك قبل بدء إستعماله

٣) حیفیہ إسعمال الدواع

- طريقة التناول:

- قبل الذهاب إلى العمل، امسح العينين بقطن ماء الصلوة.
- أو الصيادي إذا مكث في الماء، اغسل العينين بالماء.
- إذا كنت تحتاج للانتقال من علاج بـ أميدورون (دواء آخر لعلاج اضطرابات نظم القلب) إلى العلاج بـ موتلان، يجب إجراء التدليل بحذف المقدار الدوائي وطريقة العلاج بـ يهودان من قبل الطبيب فقط.
- المقدار الدوائي الضروري عادة هو قرص واحد من موتلان 400 ملغم مرتين في اليوم.
- قرص واحد في الصباح مع وجة الفطور
- قرص واحد في المساء مع وجة العشاء
- إذا كنت تعتقد بأن الدواء أقوى مما ينبغي أو أضعف مما ينبغي، احك للطبيب أوصيتك عن ذلك

يجيب بلغ القرص ب Skylake الكامل مع الماء أثناء وجود الطعام. لا تتوفر معلومات بخصوص سحق/شطر/مضخة القرص.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا تناولت بخطأ مقداراً دوائياً أكبر:

توجه مباشرة إلى طبيبك أو إلى غرفة الطوارئ القريبة. أحضر عليه الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء:
إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول مقداراً دوائياً في وقت التناول المحدد بالقائم، لا يجوز في أي حال من الأحوال تناول مقدارين دون وابعين مما للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي.

إذا وقفت عن تناول الدواء:
• لا تتوقف عن إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا تزورت لديك أستشارة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

كما يكمل دواء، إن استعمال مولاتاك قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين لا تنتهي من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أي منها.

بلغ عن الأعراض الجانبية التالية أثناء استعمال هذا الدواء:

- يجبر على الامتناع عن الممارسة الجنسيّة.
- من المجاز أن تحتاج الممارسة الجنسيّة طبارة
- أعراض جانبية شائعة جداً (يعني أن تظهر لدى أكثر من مستعمل 1 من بين 10)
- صور القلب. لوحظ هذا العرض في الأبحاث السريرية، بنفس نسبة الحدوث لدى متلاعجين تلقوا مولاتاك أو متريلاتين، لكنه لم يتم تحديدها.
- في رأسيات الماء، أو الرجلين، سواد عصبي، اضطرابات في التنفس أثناء الاستقلاء أو النوم، ضيق في التنفس، أثناء القائم بنشاط، زيادة في الوزن.

أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100):

- كثرة الإسهالات والتقيؤات الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل في الكلى
- نظم قلب بطيء

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000)
- مرض رئوي إلتهابي (بما في ذلك تندب وسمكبة الرئة). علامات ذلك تشمل ضيق في التنفس أو سعال غير متوج للبلغم

- اعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):
 - مشاكل في الكبد بما في ذلك ضرر كبدى يشكى خطرا على الحياة. العلامات تشمل: ألم أو عدم راحة في منطقة المعدة (البطن)، فتقان الشهبة والغثيان، غثيان، تقيؤات، إسقفار الحبل أو الجزء الأبيض في البوليني (يرقات)، بول بلون داكن أكثر من المعتاد.
 - إرهاق (خاصة بمشاركة عارض اضافي موسومة هنا). حكة
 - رد فعل تحسسي يشمل إنفصال في الوجه، الشفتين، الفم، اللسان والحنجرة
- اعراض جانبية إضافية:
 - تغيرات فينتائج فحص دم واحد: نسبة الكرياتينين في الدم
 - تغير في نتيجة فحص التخطيط الكهربائي لقلب (ECG) (QTc Bazett prolonged) (QTc Bazett prolonged)
- اعراض جانبية شائعة:
 - مشاكل في الجهاز الهضمي مثل: إسهال، غثيان، تقيؤ وألم في البطن
 - الشعور بإرهاق
 - مشاكل في الجلد مثل طفح أحمر
 - تغير فينتائج حوصن الدم المستعملة لفحص وظائف الكبد
- اعراض جانبية غير شائعة:
 - مشاكل جلدية أخرى مثل إحمرار الجلد أو إكزema (احمرار، حكة، الشعور بحرق أو حوصلات)

- تزايد حساسية الجلد للتعرض للشمس
- تغير في حالة التدفق
- اعراض جانبية نادرة:
- فقدان حاسة التذوق
- التهاب في جدار واءه دموي (بما في ذلك التهاب الأوعية الكاسر للكربيلات البيض)

إذا ثقافتكم بأحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبى لم يذكر في هذه المنشورة، عليكم استشارة الطبيب.

بالإمكان التنبيه عن أعراض جانبية لوزارته الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (العنوان: www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى التموزج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفية الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء

تجنب التسمم يحب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابة الأطفال بالتسمم.
لا تنسى التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إسعمال الدواء بعد إقصاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة/اللوحة (بليستر). يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. التخزين: يجب التخزين دون 30 درجة مئوية.

۶) معلومات اضافی

يحتوي مولتاك بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Crospovidone (type A), maize starch, lactose monohydrate (41.65 mg), poloxamer 407, hypromellose, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica, macrogol 6000, titanium dioxide (E171), carnauba wax.

**كيف يbedo الدواة وما هو محتوى العلبة:
الأدواء، وعدها، فوائض علبة ابرقة (الاستهانة)**

واحد و- ٤١٤٢ في الجانب الثاني.
الأعراض ضمن عيوب (بليسترات) من PVC/Aluminum ذات 10، 14، 20، 28، 30، 50، 55، 60، 65، 70، 75، 80، 85، 90، 95.

هذه النشرة لا تحتوي كافة المعلومات عن المستحضر. إذا توفر لديك أي سؤال
ليست كافة أحجام العلبة مسوقة.

أول ممکن وائقاً من أمر ما، الرجاء مراجعة الطبيب.
صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: سانوفي إسرائيل م.ض، مجمع چرين وورك، ص.ب. 47.

تم إعدادها في كانون الثاني 2024 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
قم بطبعه أو حفظه على الأجهزة المحمولة. رقم الإصدار: 1424232977.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.