

## עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

### **קורסובה**

תמייסה להזרקה 50 מיקרוגרם / 1 מ"ל

#### **החומר הפעיל ורכיביו:**

כל 1 מ"ל תמייסה מכילים 50 מיקרוגרם דיפליקפאליין.

חומרם בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 6.  
**קרא בעיון את העلون עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה.**

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

#### **1. למי מיועדת התרופה:**

קורסובה מיועדת לטיפול בגרדBINONI עד חמור הקשור למחלת כליות כרונית בחולים מבוגרים המטופלים בהמודיאליה.

#### **קבוצה Terapeutic products:**

קורסובה מכילה את החומר הפעיל דיפליקפאליין.

קורסובה פועלת בגידים בגין הנקראים קולטני קאפה-אופיאידים (opioid-kappa-opioids), אשר מעורבים בשלייטה בתוחשת הגרד. באמצעות עירור קולטנים אלו על גבי תא עצב ותאי חיסון מחוץ למוח, קורסובה מקלה על תוחשת הגירוד הנגרמת על ידי מחלת כליות כרונית.

החומר הפעיל, דיפליקפאליין, אינו חוצה את מחסום הדם-מוח (מחסום טבעי בין כלי הדם למוח), מה שמחית את הסיכון לתופעות לוואי.

#### **2. לפני השימוש בתרופה:**

##### **אין להשתמש בתרופה אם:**

- הנך רגיש (אלרגי) לדיפליקפאליין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

## **ażhorot miyadot haengutot leshimush batraophah:**

לפני הטיפול בקורסובה ספר לרופא או לאחות אם:

- יש לך עלייה ברמות האשlagen בدم
- יש לך או הייתה לך חולשת לב או הפרעה בקצב לב
- יש לך פעילות יתרה של מחסום הדם-מוח (כגון סרטן במוח או מערכת העצבים המרכזית, או מחלת מערכת העצבים המרכזית כגון טרשת נפוצה או דמנציה), כיון שגם עלולה להעלות את הסיכון לתופעת לווואי
- אתה בן 65 שנים ומעלה, כיון שיש יותר סיכוי שהתרופה תגרום לך לנמנום אם אתה עושה שימוש בתרופות שיכולות להעלות את הסיכון לנמנום או סחרחות כגון:
- תרופות אשר מאטות את הפעולות המוחית כמו אלו אשר עוזרות להפרעות שינה וחרדה
- תרופות אשר מטפלות באלהריה, צינון, בחילות ו/או הקאות, הנקראות אנטיביוטמיים עם השפעה מרידימה (סדייבית)
- משככי כאבים חזקים הנקראים משככי כאבים אופיאידים ספר לרופא שלך אם אתה נוטל מהתרופות המציגות מעלה.

## **ילדים ומתבגרים**

קורסובה אינה מומלצת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

אין מידע על השימוש ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

## **איןטראקטזיות/תגובה בין תרופתיות:**

אם אתה לוקחת, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

## **הירין והנקה**

אם את בהירין או מניקה, עשוי להיות בהירין או מתכנתה הירין, התיעוץ עם הרופא או הרוקח לפני ההתחלת הטיפול בתרופה.

קורסובה לא נזכרה על נשים בהירין. לא ידוע האם קורסובה עלולה להזיק לתינוק שטרם נולד. הרופא שלך ידוע איתך האם עלייך להשתמש בקורסובה במהלך ההריון.

לא ידוע האם קורסובה יכולה לעבור לחלב אם. אם את מניקה, הרופא שלך ייעץ האם יש להפסיק להניקה או לעצור את הטיפול בקורסובה, בהתחשב ביתרונות של הנתקת התינוק ומתן קורסובה לך, האם.

## **נהיגה ושימוש במכוניות**

קורסובה עלולה לגרום לשחרחות ישנות אשר יכולות לפגוע ביכולת שלך להגיב. אין נהוג או להפעיל מכוניות אם היכולת שלך להגיב פחתה או אם אין לך מחי ההשפעה של קורסובה על היכולת שלך להגיב.

**מידע חשוב בוגע לחלק מהמרכיבים של התרופה**  
התרופה מכילה נתרן בכמות של פחות מ-23 מ"ג ל-1 מ"ל ולכן נחשבת נטולת-נטרן.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתקסیر תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינן ואופן הטיפול בתקסיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

הרופא שלך יקבע את המנה של קורסובה המתאימה עבורך בהתאם על משקל הגוף שלך. התרופה תינתן כזריקה תוך ורידית ע"י רופא או אחות בסיום טיפול הדיאליזה דרך הצינור שמחבר אותך למכונת הדיאליזה. אין לעבור על המנה המומלצת.

#### משך הטיפול

קורסובה תינתן לך שלוש פעמים בשבוע. מספר זה עולה ארבע פעמים בשבוע במקרה של קבלת טיפול בדיאליזה ארבע פעמים בשבוע. לא מומלץ לקבל יותר מארבע מנות של קורסובה בשבוע גם אם מספר טיפול הדיאליזה בשבוע הוא יותר מארבעה.

אם טיפול בדיאליזה לא הושלם, הרופא שלך יחליט אם עדיף לך לקבל את קורסובה לאחר הטיפול שלא הושלם או לחכות עד לטיפול הדיאליזה הבא. אם פספסת טיפול בדיאליזה, המנה הרגילה של קורסובה תינתן לך בטיפול הדיאליזה הבא שלך.

מצופה שהגירוד יפחת לאחר טיפול של 2-1 שבועות בקורסובה.

#### מטופלים עם תפקוד כבד מופחת:

לא נדרשת התאמת מינון עבור מטופלים עם ירידה קלה או בינונית בתפקוד הגוף.

קורסובה אינה מומלצת למטופלים עם ירידה חמורה בתפקוד הגוף, מכיוון שהשימוש לא נבדק במטופלים אלו.

אם נטלת בטיעות מינון גבוהה יותר הדבר מעלה את התרחשויות תופעות לוואי המפורטו בסעיף 4. עליך לדבר עם הרופא שלך אם אתה חושב שזה חיל עליך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנר זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקורסובה עשוי לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואין. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות הלואין הבאות דוחו בחולים המקבלים תרופה זו

תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שמופיעות ב-10-100 משתמשים מתוך 100

- נמנום
- הפרעה תחושתית בעור כגון עקצוץ, דקירה, צריבה או חסור תחושה, ירידה בתחושה או ברגישות

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) - תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 1000

- סחרחות

- כאב ראש
- שינויים במצב הנפשי (ὔירנות וצלילות דעת), כולל בלבול
- בחילה, הקאה
- שלשול

**אם הופעה תופעת לוזאי, אם אתה סובל מטופעת לוזאי שלא צינה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

#### דיווח על תופעות לוזאי

ניתן לדוח על תופעות לוזאי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוזאי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוזאי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

#### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי קר תמנע הרעליה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין לשימוש בתרופה אחריה תאריך התפוגה (EXP) המופיע על גב האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

**תנאי אחסון:**

יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25°C.

#### 6. מידע נוסף:

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Acetic acid (for pH adjustment), sodium acetate trihydrate (for pH adjustment), sodium chloride, water for injections

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:  
קורסובה היא תמיסה שקופה וחסרת צבע ללא חלקיקים (4.5 Hc). התרופה מסופקת בבקבוקן זכוכית עם פקק גומי, סגור אלומיניום ומכסה פלסטיק כחול.
- האריזה כוללת 3 או 12 בקבוקונים. יתרכן שלא כל גדיי האריזה משווים.
- בעל הרישום וכותבתו: צט בע"מ, רח' החרש 4, הוד השרון, ישראל

- שם היצרן וכתובתו:

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France  
100–101 Terrasse Boieldieu  
Tour Franklin La Défense 8  
92042 Paris La Défense Cedex  
France

- מספר רישום התרופות בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:  
173-72-37475-99

עלון זה נערך בתאריך 08/2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה מנוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.