



עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

## ונטולין תמייסה לשאיפה

תמייסה לשאיפה לאינהלציה עם נבולייזר (מכשיר אינהלציה)

חומר פעיל:

סאלבוטאמול (כסולפאט) 5 מ"ג/מ"ל  
salbutamol (as sulfate) 5 mg/ml

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוספת".  
קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

### 1. למה מיועדת התרופה?

ונטולין תמייסה לשאיפה מיועדת לשימוש במבוגרים, מתבגרים וילדים.  
ונטולין תמייסה לשאיפה מיועדת לשימוש לטיפול בעת התקף חריף שלعروית סمفונוֹת (ברונוכוספָּזִום) כרונית אשר אינה מוגיבה לטיפול המקביל וכן לטיפול באסתמה חריפה חמורה.

#### קבוצה רפואיית:

מרחיבי סمفונוֹת מהירiy פעללה, אגוניסט סלקטיבי של רצפטורי בטא-2, בעל פעילות קצרת טווח.

ונטולין תמייסה לשאיפה מכילה את החומר הפעיל סאלבוטאמול המשתייך לקבוצה של תרופות הנקראות מרחיבי סمفונוֹת מהירiy פעללה.  
• מרחיבי סمفונוֹת עוזרים לדרכי האויר בריאות להישאר פתוחות, דבר המקל על כניסה ויציאת אויר.  
• הם עוזרים להקל על לחץ בבית החזה, צפצופים ושיעול.

### 2. לפני השימוש בתרופה

#### אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לסאלבוטאמול סולפאט או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).

יש להשתמש בוונטולין תמייה לשאייה לפי הצורך ולא באופן סדר.

#### ażeroth miyadot haengutot li shimirah b'tarofa

#### lafni htipol boontolin tmyeh le shaiya, sefer lrofia am:

- האסתמה שלך פעילה (לדוגמה, יש לך תסמניהם תכופים או התלקחות כמו קוצר נשימה שגורם לקושי בדיבור, באכילה או בשינה, שיעול, צפופים, לחץ בבית החזה או יכולת גופנית מוגבלת), עליך לספר על כך מיידית לרופא אשר עשוי להתחיל או לעלות מינון של תרופה הנינתה לשטייה באסתמה שלך כמו קורטיקוסטרואיד בשאייה.
- יש לך לחץ דם גבוה.
- יש לך סוכרת.
- יש לך פעילות יתר של בלוטת התריס.
- יש לך היסטוריה של בעיות לב כמו דופק לא סדר, דופק מהיר או תעוקת חזה.
- אתה משתמש בתמייה אחרת למכתיר אינה�zie כמו איפראטרופיים ברומייד, יש לוודא כי האדים לא נכנסים לעיניך. ניתן למנוע זאת על ידי שימוש בפייה במקום מסיכת פנים או שימוש במקפוי מגן.
- אתה נוטל נגוזות קסנתין (כמו תאופילין) או סטרואידים לטיפול באסתמה.
- אתה נוטל משתנים, המשמשים לעיתים לטיפול בחץ דם גבוה או במחלת לב.
- נטלת תרופות אחרות המשמשות להקלת על גודש באף (כמו אפדרין או פסואדואפדרין) או תרופות אחרות המשמשות לטיפול באסתמה.

#### aintraekziot/tgbohot b'in tarofiot

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. יש לידע במיוחד את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות לדופק לא סדר או מהיר (במיוחד מקבוצת חוסמי בטא כגון פרופרנולול).
- תרופות אחרות לאסתמה שלך.

#### hiron v'hinika

אם את בהירyon או מניקה, חשוב שיתכן שאתה בהירyon או אם אתה מתכוון להרות, התייעצֵי עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה זו.

#### nigga v'shimirah b'mekonot

לא סביר שוונטולין תמייה לשאייה תשפייע על יכולתך לנוהג או להשתמש בכלים או במכוונות כלשהם.

#### midu chob ul chalak mhamarkeibim shel tarofa

ונטולין תמייה לשאייה מכילה 0.1 מ"ג/מ"ל בנזאלקוניום כלורייד (benzalkonium chloride) בכל יחידת מינון.

בנזאלקוניום כלורייד עלול לגרום לצפופים וקשה נשימה (ברונכוספאזם), בייחוד אם יש לך אסתמה.

#### 3. Citzd tshatmesh b'tarofa?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

יש להשתמש בתרופה רק בשאייפה מכשיר אינהלאציה, אסור להזריק או לבלווע אותה. מכשיר האינהלאציה מייצר אדים עדינים אותם אתה שואף פנימה דרך מסכת פנים או פיריה. ודא שאתה יודע כיצד להשתמש בו כיאות. אם אתה נתקל בבעיות, היועץ ברופא, באחות או ברוקח.

אל תאפשר לתרופה או לאדים המיצרים על ידי מכשיר האינהלאציה להיכנס לעיניך. השתמש במכשיר האינהלאציה בחדר מאוורר היטב מפני שחלק מהאדים ישחררו לאוויר ועלולים להרושאך פנימה על ידי אחרים. ודא שאתה יודע איך, متى ובכמה תמיסה להשתמש.

הרופא המטפל יכול להתחיל את הטיפול ולנטר קלינית את השימוש הביתי במכשירי אינהלאציה ובתרופות המיעודות לשאייפה באינהלאציה לטיפול אקטואי באסתמה בילדים ובמבוגרים.

השתמש רק במכשיר אינהלאציה שהומלץ על ידי הרופא והשagh על יליך בזמן שהם משתמשים במכשיר האינהלאציה.

פונה לקבלת עזרה רפואיית דחופה אם התרופה לשימוש באינהלאציה אינה משפיעה, גם אם ישנה הטבה לפך זמן קצר לאחר השימוש בתרופה שנרשמה לך.

ספר לרופא בהקדם האפשרי אם נראה לך שהתרופה שלך אינה פועלת עליך כרגע (לדוגמא אם אתה זוקק למינון גבוהה יותר של התרופה כדי להקל על בעיות הנשימה שלך או השימוש בשארך שלך לא יוצר הקללה הנמתחת לפחות 3 שעות) כיון שייתכן כי האסתמה שלך מחייבת ואולי תצטרך תרופה אחרת.

אם אתה משתמש בוונטולין תמיסה לשאייפה יותר מפעם מפעם בשבוע לטיפול בתסמיini האסתמה שלך, לא כולל שימוש מניעתי לפני פעילות גופנית, זה מצביע על אסתמה שאינה נשלטת היטב וזה עלול לגרום את הסיכון להתקפות חמורות של אסתמה (החמרה של האסתמה) שייתכן ויריה להם סיבוכים חמורים שיכולים להיות מסכני חיים או אפילו קטלניים. عليك לפנות לרופא בהקדם האפשרי כדי לבחון את הטיפול שלך באסתמה.

אם אתה משתמש בתרופה אנטידלקטיבית לריאות באופן יומי-יומי לדוגמא "קורטיקוסטרואיד בשאייפה", חשוב להמשיך להשתמש בה באופן סדרי, אפילו אם אתה מרגיש יותר טוב.

שייתכן כי הרופא רשם לך טיפול לסירוגין (להתקחוות קצרות אקריאוות) או טיפול רציף בוונטולין תמיסה לשאייפה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

**טיפול לסירוגין (Intermittent treatment)**

- **מבוגרים ומתבגרים בני 12 שנים ומעלה – 0.5 מ"ל עד 1 מ"ל של ונטולין תמיסה לשאיפה עד 2.5 מ"ג סאלבוטאמול).** חלק מהמתופלים עשויים לצרור עד 2 מ"ל (10 מ"ג סאלבוטאמול).
- **ילדים בני 18 חדשים עד 12 שנים – 0.5 מ"ל עד 1 מ"ל של ונטולין תמיסה לשאיפה עד 5 מ"ג סאלבוטאמול).**

יתacen שהרופא אמר לך לדל את ונטולין תמיסה לשאיפה עם תמיסתמלח סטרילית (סלין) לפני השימוש בה במכשיר אינהציה. זכור לעקוב אחרי הוראות הדילול.

#### **טיפול רציף (Continuous treatment)**

1 עד 2 מ"ג של סאלבוטאמול לשעה. ניתן להגיע למנה זו על ידי דילול של 1 או 2 מ"ל של ונטולין תמיסה לשאיפה ל-100 מ"ל עם תמיסתמלח (סלין) סטרילית לייצור תמיסת המכילה 50 או 100 mikrogram/m"ל של סאלבוטאמול, לשאיפת האדים ממכשיר אינהציה מתאים.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

#### **איך להשתמש בתרופת**

1. הכן את מכשיר האינהציה למילוי.
2. מדוד את הכמות הנכונה של ונטולין תמיסה לשאיפה והכנס אותה לקערית מכשיר האינהציה.
3. הוסף את הכמות הנכונה של תמיסתמלח (סלין) סטרילית (וזא כי הרופא הנחה אותך בכמות שצריך להשתמש).
4. הנח את המכסה על קערית מכשיר האינהציה ונער אותה בעדינות כדי לערוב את התוכלה.
5. הרכב את מכשיר האינהציה והשתמש בו על פי ההנחיות.
6. לאחר השימוש השLR כל תמיסה שנותרה בקערית מכשיר האינהציה. נקה את מכשיר האינהציה בדרך המומלצת.

#### **אם נטלה בטיעות מינון גבוה יותר**

אם נטלה מינון גבוה יותר ממה שהיה צריך, דבר עם הרופא בהקדם האפשרי.

התופעות הבאות עלולות להתרחש:

- הלב שלך יפעם מהר יותר מהרגיל
- אתה תרגיש רעד
- פעילות יתר (היפראקטיביות).

טיפולות אלה חולפות בדרך כלל במשך שעות ספורות.

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בעלILD מן התרופת, פנה מיד לרופא או לחדר מيون של בית חולים והבא אריזת התרופת איתך.

#### **אם שכחת ליטול את התרופת**

אם שכחת ליטול תרופת זו בזמן המועד, קח אותה ברגע שאתה נאכرا. אולם, אם זה הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שנשכחה. אל טיפול מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.

יש להתמודד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעיצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זוקק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

#### 4. תופעות לוואי

אם נשיםתר או הצפוצים חמירים מיד לאחר נטילת תרופה זו, הפסיק להשתמש בה מיד, וספר לרופא בהקדם האפשרי. כמו בכל תרופה, השימוש בוונטולין תמייה לשאייפה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול אף אחת מהן.

תופעות הלוואי הבאות עלולות להופיע עם תרופה זו:

תגובהות אלרגיות (אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10,000 אנשים) אם יש לך תגובה אלרגית, הפסיק לקחת ונטולן תמייה לשאייפה ונפה לרופא מיד. סימנים של תגובה אלרגית כוללים: התנפחות של הפנים, השפתיים, הפה, הלשון או האגרון אשר עלולים לגרום لكשי בלייה או קשי נשימה, פריחה מוגדרת, תחושת עילפון וסחרורות והתמוטטוות.

##### פנה לרופא בהקדם האפשרי אם:

- אתה מרגיש שלבר פുם מהר יותר או חזק יותר מהרגיל (דפיקות לב). תופעה זו בדרך כלל אינה מזיקה, ולרוב חולפת לאחר שהשתמשת בתרופה במשך זמן מה.
  - ייתכן שתרגיש שהדופק שלך לא סדיר או שהוא פുם פעימה נוספת.
  - תופעות אלה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים.
- אם אחות מתופעות אלה מופיעות אצלך, פנה לרופא בהקדם האפשרי. **אל תפסיק להשתמש בתרופה זו אלא אם נאמר לך לעשות כן.**

ספר לרופא אם יש לך אחת מתופעות הלוואי הבאות אשר עלולות גם הן להופיע במהלך השימוש בתרופה זו:

תופעות לוואי שכיחות אלה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים:

- תחושת רعد
- כאב ראש.

תופעות לוואי שאינן שכיחות אלה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 100 אנשים:

- גירוי בפה ובגרון

- התכווצויות שריריות.

#### **תופעות לוואי נדירות**

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 1,000 אנשים:

- רמה נמוכה של אשלגן בدم
- זרימת דם מוגברת לגפיים (התרחבות פריפריאלית).

#### **תופעות לוואי נדירות מאוד**

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10,000 אנשים:

- שינויי בדפסי השינה ושינויים בהתנהגות, כמו חוסר מנוחה והתרגשות יתר.

#### **תופעות הלואין הבאות עלולות גם להופיע אך שכיחותן אינה ידועה:**

- כאב בבית החזה בגלל בעיות לב כמו תעוקת חזח (אנגינה). ספר לרופא, לאחות או לרוקח אם זה מתחרש. אל תפיסך להשתמש בתרופת זו אלא אם נאמר לך לעשות כן.
- מצב הקריי "חמצת לקטית" (Lactic acidosis) אשר עלול לגרום לכabi בטן, נשימת יתר (היפרונטילציה), קוצר נשימה, כפות רגלים וידים קרות, דופק לא סדיר או חששות צמא.

אם אתה חושב שתרופה זו אינה פועלת מספיק טוב עבורך  
אם נראה לך שהתרופה שלך אינה פועלת כראוי, פנה לרופא בהקדם האפשרי. ניתן כי בעית הנשימה שלך מחמירה וייתכן שאתה צריך תרופה אחרת. אל טיפולמנה נוספת של ונטולין תמיישה לשאיפה אלא אם הרופא הורה לך על כך.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואין חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

#### **דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המくん לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה ל קישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

#### **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידים וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-25°C. יש לאחסן את הבקבוק בקרטון החיצוני כדי להגן מפני אור.
- אל תשאיר תמיישה במכשיר האינהילציה לאחר שסיימת את הטיפול.

- לשימוש עד חודש ימים מפתיחת הבקבוק לראשונה ולא יותר מאשר תאריך התפוגה של התכשיר.
- לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה, יש לרשום על גבי אריזת הקרטון את תאריך הפתיחה במקום המועד.
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביונית. התייעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

## 6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:  
Benzalkonium chloride solution, sulfuric acid dilute and purified water.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:  
ונטולין תמיסה לשאייה מגיעה בבקבוק זכוכית צבע ענבר המכיל 10 מ"ל או 20 מ"ל.  
התמיסה נטולת צבע עד צבע צהוב בהיר.  
ייתכן שלא כל גדרי האריזות משוקרים.
- בעל הרישום: גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.
- יצרן: גלקסו אופריזנס (אנגליה) בע"מ, ברנרד קאסל, אנגליה.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 021-31-21046
- לשם הפשתות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בפברואר 2024.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינותו של קבוצת החברות של GSK.  
© 2024 קבוצת החברות של GSK או הזכיין שלה.

Ven RS PT v10